

**L'ARTE DI
CURARSI, E DI
GUERIRSI DA SE
MEDESIMO NELLE
PIÙ COMUNI, E...**

Daniel 1728-1813 Langhans





11-6-11 5

12-1-a 29/

7

L' A R T E

DI CURARSI, E DI GUERIRSI

DA SE MEDESIMO.

7



L' A R T E
DI CURARSI, E DI GUERIRSI
DA SE MEDESIMO

NELLE PIU' COMUNI, E PIU' GRAVI MALATTIE
DI DANIELE LANGHANS
DOTTORE DI MEDICINA,

Pensionario della Città, e Repubblica
di **BERNA.**

TRADUZIONE DAL FRANCESE.


*Promptissima fit curatio ab eo, qui probe
agritudinem agnoverit.*

Galen. 12. Meth. Cap. ult.

TOMO PRIMO.



IN VERCELLI 1770.



A spese di **MICHEL ANGELO MORANO**
Librajo vicino S. FRANCESCO in TORINO.

AVVERTIMENTO
DEL TRADUTTORE FRANCESE



 Inutile il far quì parola del
merito di quest' Opera , o della
celebrità dell' Autore di essa ,
mentre le lodi , ch' io darei al
Sig. Langhans , non accresce-
rebbero punto la fama , ch' egli si è giu-
stamente acquistata , nè migliore si rende-
rebbe il suo Libro da quanto sarei per dire
in suo favore .

Per un pregiudizio fatale all' umanità , molte persone malamente prevenute contro i Medici non vogliono chiamargli a curare le loro malattie . L' antipatia , che hanno per li Professori di quest' arte , proviene assai sovente dalle declamazioni de' Ciarlatani , o dai rigiri di una certa classe d' uomini , che non sapendo tenersi ne i limiti loro prescritti , senza titolo per esercitare , senza dottrina per curare le malattie interne , gelosi dell' altrui merito , sempre schiavi de' pregiudicj , tratti di continuo fuori di strada da una ridicolossissima

ma presunzione , non dividono neppur cogli Empirici il tenue vantaggio di poter applicare , qualche volta felicemente , que' mezzi , onde hanno l' imprudenza di servirsi .

Per poco che si rifletta sopra l' imperizia di queste scimmie dei Medici , si conoscerà la necessità di ricorrere ad uomini istruiti , i quali e per dovere del loro stato , e per elezione si sieno per tempo applicati all' Arte , che professano : ma coloro nonpertanto , che malgrado queste ragioni persistessero in non voler Medici dattorno , potrebbero essi forse mettere la lor confidenza in gente , che si regola senza verun principio colla mera pratica acquistata a spese della vita de' Cittadini ? Il pensare così fattamente non sarebb' egli una pazzia ? E non sarebbe forse meglio studiare il proprio temperamento , prendere alcune nozioni delle malattie , rendersi famigliari i rimedj più usati per combatterle , diventare , per dir tutto in una parola , Medico di se medesimo , anzichè affidare la propria vita a uomini ignoranti ? Ora tutte queste cognizioni si troveranno unite nella presente Opera , la quale siccome per questo espresso fine fu dell' Autore composta , così pel medesimo motivo è stata da me tradotta .

Il

Il Sig. Langhans scrivendo in Berna ha messo in capo del suo Libro un certo numero di preparazioni officinali, ch' egli ha inventate, e che fa comporre sotto i suoi occhi. Convien credere, che una lunga sperienza abbia autorizzato questo Medico a consigliarne l'uso, e poichè alcuni pochi rimedj officinali bastano a curare ogni specie di malattia, si giudichi quanto semplice sia il metodo di questo Pratico, e quanto sieno superflui i medicamenti composti, de' quali è tanto carica la Farmacia.

La difficoltà di procacciarsi le composizioni Elvetiche non deve riuscir d'ostacolo all'Arte di guerirsi da per se stesso, conciossiachè il Sig. Langhans ha sempre avuto l'attenzione di sostituire ai rimedj da esso composti altri semplici, facili, ed a portata di tutti. Così in vece delle goccioline febrifughe sedative, egli vuole che si adoperino le goccioline sudorifiche di Sthall, ai diapasmi si deve sostituire il vescicatorio fatto col lievito e colle mosche cantaridi, alla polvere emetica l'Ipecacuana, &c. La polvere temperante di Sthall potrebbe altresì usarsi in cambio della polvere sedativa, la canfora sola polverizzata nel modo che si sa agguaglierebbe la polvere di

canfora sudorifica , e i sali di Glauber , d' Epson , di Seignette , o il Cremor Tartari produrrebbero l' istesso effetto , che il sale glaciale , usati negli stessi casi , e nella stessa dose .

La polvere emetica del Sig. Langhans si può dare fino a 40. grani , ma qui avverta il Leggitore di non prendere abbaglio : la detta polvere non è già l' emetico ordinario , otto o dieci grani del quale produrrebbero effetti funestissimi , ma è senza dubbio un miscuglio , in cui entra in dose proporzionata il tartaro emetico , o qualunque altro emetico . Per supplirvi , oltre l' Ipecacuana indicata dal Sig. Langhans , si ponno prendere tre grani di tartaro emetico , stemperargli in una foglietta d' acqua , e dare questa bevanda in tre volte , avvertendo di farvi bere sopra , e negl' intervalli dell' acqua tiepida . In tal guisa uno si renderà padrone del rimedio , che si proseguirà , o si lascerà , secondochè più o meno l' infermo avrà evacuato . La sciarappa , e la polvere cornachina servirebbero pure in vece della polvere purgativa e lassativa : si dà la prima droga in polvere ai fanciulli dai quattro grani fino agli otto , mescolati col doppio di cinnabro artificiale , ed agli adulti dai 15. grani
ai

ai 20. e fino a 25. sola , o combinata , con la preparazione medesima . La dose della polvere cornachina è la stessa che quella della polvere purgativa .

Quanto ad alcune altre composizioni di un uso meno frequente , chi vorrà assolutamente averle , potrà indirizzarsi allo stesso Sig. Langhans ; ma , come abbiám osservato , sarà facile il sostituirvi i rimedj cogniti , che questo prudente Medico ebbe cura d' indicare .



I M P R I M A T U R .

*Fr. Joseph Hyacinthus Cappelli Sac. Th.
Mag. Ord. Præd. Provicarius Gen.
S. Officii Vercell.*

V. Th. Cimma pro Præf. R. Schol.

V. Si permette la stampa

NOVAREPTI per la gran Cancell.

PREFAZIONE

DELL' AUTORE.


 Oggetto, ch'io mi ho prefisso in quest' Opera, si è d' insegnare tanto a' viaggiatori, quanto agli abitanti della campagna, che non si trovano in situazione di consultare un Medico, un metodo sicuro per conservare la loro salute, e liberarsi nel modo più spedito e più efficace da quelle malattie, nelle quali possono cadere..

I motivi, che m' inducono a pubblicarla, sono que' medesimi, che indussero, non ha molto, il Dottor Tissot a dar in luce un Trattato delle Malattie infiammatorie, voglio dire la moltitudine di Medici ignoranti, che inondano il paese degli Svizzeri, e che non sapendo per la maggior parte nè leggere nè scrivere, possono giustamente essere riguardati come il flagello dell' umanità, l' imbarazzo, in cui si ritrovano spesso un Podestà, un Curato, e mille altre persone, allorchè cadono inferme, ed il rischio, che

corrono i viaggiatori di perdere la salute .

Mi sono studiato di descrivere tutte le Malattie nella più chiara e più metodica maniera , che ho potuto , schivando que' termini proprj della nostr' Arte , che avrebbero potuto imbarazzar forse il Leggitore , ed ho aggiunto a ciascun Libro una Tavola, per mezzo della quale si ritroverà prontamente quanto potrà essere necessario a ciascuno .

Nella prima parte io tratto delle Febbri, e delle Malattie infiammatorie , che più d' ordinario si osservano nel paese degli Svizzeri , e nelle altre contrade di Europa , e vò indicando i mezzi ed i rimedj , che i buoni Medici reputano per più sicuri e più efficaci , e che io medesimo da dodici anni in quà son solito adoperare tanto nello Spedal Generale , quanto nelle cure particolari , che mi accade intraprendere nella Città .

Parlo nella seconda delle Malattie del Capo , del petto , e del basso ventre , nella terza di quelle della cute , del grasso , e della linfa : nella quarta delle Malattie delle femmine , e de' fanciulli , dalla loro infanzia fino al tempo , in cui hanno finito di fare tutti i denti . Quello ,

lo , che principalmente m' indusse a farlo , si è primieramente il vivo desiderio di giovare alle donne , le quali sì prima , che dopo del parto vengono trattate tanto malamente , che ne muore ogni anno un gran numero , e che quelle , che pur la scappano , rimangono pel rimanente de' loro giorni afflitte da' mali periodici : ed in secondo luogo il numero grande di fanciulli , che per trascuraggine , o per gli accidenti cagionati dallo spuntar de' denti perdon la vita , perchè non si somministrano loro que' soccorsi , ond' hanno bisogno .

Disse di sopra che uno de' principali motivi , pe' quali mi son mosso a comporre quest' Opera , fu la quantità di Ciarlatani , ond' è inondato il paese degli Svizzeri . E' questo un male di tanta importanza , ch' io deggio ragionarne alquanto diffusamente , se non per altro , almeno per mettere i Leggitori in istato di conoscergli bene . Cotesti pretesi Medici sono per la maggior parte uomini , che dopo aver passata oziosamente la lor gioventù si mettono giunti che sono in età matura a seguitare per pochi mesi un qualche Medico del Contado , il quale insegna loro a cavar sangue , ad ammini-

strare un purgante , un sudorifico , o altro simil rimedio, cui indistintamente adoperano nelle Malattie degli uomini e degli animali . Dopo essersi fatti ricevere mediante una somma di danaro nel Collegio di Chirurgia , se ne partono muniti delle loro patenti , e fanno credere a' contadini , che se non fossero stati trovati capaci , non si sarebbe loro permesso di curare gl' infermi , e meno ancora di farsi aggregare al Collegio . Per accreditarsi anche più si lasciano poi di quando in quando uscir di bocca qualche parola latina , e questo basta perchè i contadini si persuadano , che colui , il quale lor parla , è un uomo dotto , e perito nell' arte sua , mentre però gli avvelena co' rimedj , che male a proposito applica loro . Tra ducento Empirici di questa specie , che noi abbiamo , potrei nominarne per lo meno centonovanta , che operano nel modo suddetto . Non v' è cosa più funesta per un paese , di questa moltitudine di Ciarlatani , perciocchè ammazzano essi coll' ignoranza loro assai più persone , che non ne farebbero perite quando si fossero abbandonate alla propria loro condotta nelle loro malattie .

Suole il nostro Governo da molti anni
in

In quà , ogniquaivolta regna nel paese una qualche grave malattia , inviare i suoi Medici ordinarj a curare gl' infermi , od a procurar loro i soccorsi , onde abbisognano : ma egli renderebbe un maggior servizio alla società , se cacciasse via tutti i Chirurghi del Contado , o non permettesse loro di medicare gli ammalati , salvo sotto certe condizioni , che dovrebbe loro prescrivere . Osservandosi una simile condotta non solamente verrebbe a risparmiarsi ogni anno una spesa non mediocre , ma si salverebbe altresì la vita ad una quantità grande di ottimi sudditi . Che se pure non si vuole scacciargli , io gli consiglio almeno di non medicare gli ammalati secondo altri principj , che gl' indicati da me in quest' Opera , come quelli , che sono approvati e seguiti da tutti que' Medici , che Dio per bene della società ha fatto nascere .

Sono alcuni , che quando lor si discorre di tali regolamenti , ardiscono goffamente rispondere , che ognuno è padrone di conciare la propria pelle come più gli aggrada , Potrebbe un tal detto tollerarsi , ove non si trattasse , che di un semplice particolare ; ma certamente un Sovrano non deve amar troppo , che si concì la

pelle de' suoi sudditi in maniera , che si levi loro il grasso , o che se ne facciano perire ogni anno delle migliaia .

Una di queste due cose ha da essere , o che noi osserviamo un metodo nello studio della Medicina , che acquistiamo successivamente le nostre cognizioni , e finalmente che vediamo e pratichiamo noi medesimi ciò , che altri videro e praticarono prima di noi , o che nulla facciamo di tutto questo . Se la cosa è per se stessa indifferente non occorre più avere nè Scuole , nè Professori : non vi è alcuno , senza nemmeno eccettuare il più rozzo contadino , che non possa diventare da per se solo un Boerhaave , o un Newton , e ciò posto sarebbe una pazzia lo spendere nello studio della Medicina la miglior parte della vita . Ecco generalmente in qual guisa pensano gli uomini . Uno Speciale passa per Medico , perchè fa preparare alcuni rimedj , che il Medico gli ha chiesti . Un Barbieri , o semplice Flebotomista verrà spesso preferito al Medico più esperto , perchè l' infermo riguarda la cavata di sangue come una pruova della cognizione , che si ha dell' interna struttura dell' uman corpo , e s' immagina che il Medico non conosce
così

così bene la di lui malattia , come la conosce il Chirurgo . Vi sono parecchi luoghi , ne' quali perfino il Boja passa per Medico , perchè si crede che l' esercizio del suo mestiere l' abbia messo in grado di poter conoscere il corpo dell' uomo , e di rimediare alle malattie , che lo affliggono . Si guarda un' antica donna come un' esperta Matrona , perchè partorì felicemente molti figliuoli , ed un' altra come versatissima nella Medicina , perchè sa comporre un unguento , oppure estrar dell' acqua da una pianta .

Egli è vero , che tanto è incerta la Medicina , e soggetta per modo a non preveduti accidenti , che può talvolta avvenire , che un ignorantissimo Barbiere la indovini nell' applicazione de' rimedj da esso ordinari , ma deesi pur anche confessare , che quanto più un Medico conosce la struttura del corpo umano , la natura delle malattie , e le qualità de' rimedj che adopera , tanto più egli è instato di recar sollievo , e di restituire la salute agli ammalati , che prende a curare .

Non è egli forse una disavventura gravissima quella di un uomo , che passando in villa i suoi giorni cade all' improvviso
in-

infermo di malattia perniciosissima, e trovandosi circondato da ignoranti non riceve soccorso, o è costretto procacciarselo da una Città discosta? All' incontro quale consolazione non farà la sua, e quella de' suoi congiunti, se potrà per mezzo del Libro, ch' io do alla luce, essere curato metodicamente, e ricevere que' soccorsi, che gli son necessarj? Lo stesso può dirsi de' viaggiatori.

Pochi son que' Gentiluomini, Podestà, Parrochi, &c. i quali dovendo astretti da' loro affari passare in villa la metà dell' anno, non si prevedano de' rimedj, onde possono in un caso premuroso aver di bisogno; ma quanti sono coloro, che sappiano poi distinguere i buoni dai cattivi, e far uso di quelli, che loro convengono? La ragione di ciò è primieramente, ch' essi non conoscono il loro male, e in secondo luogo, che ignorano la maniera di curarlo. S' eglino avranno il mio Libro, e conosceranno i rimedj, che in esso ho indicati nel primo Capitolo, e de' quali potranno munirsi ogni anno, saranno in istato in caso di necessità di curarsi da loro stessi, e di curar pure coloro, che ad essi appartengono. E siccome i detti rimedj costano assai poco, sarà loro
fa-

facile il rinnovare ogni anno con picciolissima spesa la lor Spezieria di campagna .

Tale è la caparbieta de' Contadini Svizzeri , sì ricchi , che poveri , che quand' anche venissero accertati che questo o quell' altro rimedio può guerirgli essi , e i loro figliuoli dalle malattie , le quali potrebbero lor sopraggiungere nel corso dell' anno , non vogliono contuttociò comperrarlo . Pure temono essi la morte , e bramano di tutto cuore di guerire . Quando non hanno Chirurgo , corrono dal Curato , lo consultano sul loro male , e gli chiedono que' rimedj , de' quali credono aver bisogno . Il Curato dà loro i suoi consigli , e vi aggiugne i rimedj , che crede convenirsi al loro stato , tuttochè anch' egli lo ignori . Se poi l' ammalato non prova alcun sollievo , ricorre ad un Chirurgo di qualche villaggio , il quale a caro prezzo gli vende le sue medicine , senza però sapere se lo guerirà , o no . Non farebb' egli meglio , che il Curato compentrasse la presente Opera , e i rimedj in essa indicati , e che in simili occasioni gli vendesse ai ricchi , e gli donasse ai poveri ? In mancanza del Curato può trovarsi in un villaggio più d' uno in istato
di

di curare l' infermo , purchè non sia privo di buon senso, e sappia leggere.

Coloro , che averanno il mio Libro , vi ritroveranno senza fatica le malattie , alle quali soggiacciono . Altro non deono far da principio , se non esaminare , se quello , che si sentono , è una febbre , o un' altra malattia . Se è la febbre , principia essa da un qualche ribrezzo , o tremito , a cui succede un ardente calore . Eglino ritroveranno nel terzo Capitolo la natura di quelle , dalle quali sono affaliti . Riguardo alle altre malattie , non dovranno far altro , che consultare la Tavola , per conoscere quelle , dalle quali è per l' ordinario accompagnato il male , che hanno . Per esempio hanno essi un violento mal di capo ? Cerchino questa parola , e vedranno se il detto mal di capo è cagionato da febbre , da impurità contenute nello stomaco , o da ristagno di sangue nel cervello . Hanno essi male allo stomaco ? Cerchino altresì questa parola , e conosceranno incontanente la natura di quello , che provano .

Nella descrizione , ch' io do delle malattie , insegno agli ammalati due sorte di rimedj . Indico loro prima quelli , che io medesimo faccio comporre , e poi insegno

segno loro il modo di preparargli , affinchè sia libero ad essi il valersi di quelli , che io indico nel Capitolo primo , o il prepararsegli da lor medesimi , in caso che abbiano il comodo di farlo .

E' impossibile , che la presente Opera non riesca di un gran soccorso a molti in caso di malattia . Pure io prevedo , che i Barbieri delle Ville , i Chirurghi , gli Operatori , ed altri simili Ciarlatani condanneranno i rimedj , e i metodi da me indicati , come perniciosi ed imperfetti , e persuaderanno gli ammalati , ch' essi hanno qualche cosa di meglio da dar loro . In questo caso , io gli priego di rileggere attentamente questa Prefazione , e son certo che distingueranno senza fatica l' impotente dall' uomo onorato . S' egli accadesse , che coloro , de' quali favello , ritrovassero nell' Opera mia qualche imperfezione , o falsità , gli supplico di farmene avvisato , ch' io ne conserverò loro eterna gratitudine . Ma essi avranno sufficiente prudenza per non farlo : loderanno anzi la mia dottrina , e quando poi qualche infermo domandi loro cosa pensano del mio metodo , gli risponderanno , che questo è buono e salutifero , ma che vi si potrebbero aggiugnere molte cose ,
ch' essi

eh' essi appresero dalla speranza , e delle
 quali sperimentarono in somigliante caso
 l' efficacia , comechè sappiano benissimo ,
 che quanto propongono è altrettanto inu-
 tile , quanto sarebbe in un carro una quin-
 ta ruota . Ma essi parlano così per gua-
 dagnarli la confidenza dell' ammalato , e
 giungono finalmente a fargli credere non
 esservi al mondo chi meglio di loro possa
 consigliarlo e guerirlo . Per mantenerlo
 poi vieppiù in questo errore , raddop-
 piano le loro attenzioni , gli fanno visite
 frequentissime , gli vantano le cure pro-
 digiose , che hanno fatte , e dopo avergli
 empiuto il capo di simili novelle , giunge
 l' impudenza loro perfino a censurar la
 condotta de' Medici più sapienti , e lo
 assicurano , che molti sarebbero gueriti
 dalle lor malattie , se gli avessero con-
 sultati . L' ammalato ascolta con ammira-
 zione il Ciarlatano , e ringrazia Dio di
 averglielo fatto conoscere , persuaso , che
 costui gli ha da prolungare per dieci an-
 ni almeno la vita . Cangiano intanto le
 circostanze , e questa cieca confidenza non
 dura , se non infino a tanto che una leg-
 ger malattia rapisce via la metà della fa-
 miglia . L' Empirico allora , vedendo che
 il male si rende più grave e più complica-
 to ,

cato , prega l' infermo di far chiamare un Medico , con cui egli possa venire a consulta , per convincerlo della bontà del metodo da esso seguito , ma in sostanza , per nascondere l' abbaglio preso , a fine di potere poi dire , che se lo avessero lasciato fare , l' infermo sarebbe guerito . Giunge il Medico , il Chirurgo se gli accosta , lo trae in disparte , e gli dice , che suo malgrado egli ha assunta la cura dell' ammalato , ma che non essendo Medico non ha voluto più lungamente attenersi ai proprj lumi , che frattanto ha ordinati all' infermo alcuni rimedj innocenti , ch' egli con impazienza lo è stato attendendo pel desiderio , che ha di vederlo risanato , persuaso per altro , che il Sig. Medico ha abilità bastante per trarlo d' imbroglio . Il Medico adunque prescrive all' ammalato i rimedj , che crede possano sollevarlo , il Chirurgo ne commenda la bontà , ma come se non gli credesse sufficienti , ne ordina pure alcuni altri , indifferenti veramente per loro stessi , affinchè l' ammalato si dia a credere , che l' ha guerito egli . Se il misero poi muore , l' Empirico dice tosto , che ciò è avvenuto , perchè ha preso qualche cosa di troppo caldo , o di troppo freddo .

do. Tale si è la condotta di coloro, che imprendono a curare gli ammalati, senz'aver acquistate le necessarie cognizioni. Chi vorrà conoscergli legga soltanto la mia Prefazione, e rimarrà tosto convinto, che si può saper radere, cavar sangue, applicar un clistere, e comporre un medicamento, senza esser per questo un buon Medico.

Se il mio Libro non è così perfetto, come dovrebbe esserlo, posso nondimeno accertare, che nulla contiene, che sia contrario alle regole della buona Medicina, o che uno si possa pentire di aver praticato. Ebbi nel comporlo la mira di rendermi utile a' miei Nazionali, e questo mi ha costretto a passare sotto silenzio parecchie cose, ch' erano superiori al loro intendimento. Vi sarà forse chi si maraviglierà, ch' io abbia osato pubblicarlo dopo quello, che ci ha dato il Dottor Tissot sopra le febbri: ma già ne aveva io terminata una gran parte prima che questi avesse cominciato il suo, come può farne fede il Sig. Fellenberg, Presidente del Collegio di Medicina della Città di Berna.

IN-

INDICE

de' Capitoli contenuti nel Tomo Primo.

PARTE PRIMA.

Capitolo I.	<i>Della natura , e della proprietà de' rimedj, de' quali si parla in quest' Opera: del peso , e della dose , in cui hanno a prendersi .</i>	Pag.	1
Cap. II.	<i>Del reggimento , che si deve osservare nelle Febbri ardenti , &c.</i>		8
Cap. III.	<i>Delle Febbri in generale , e della loro divisione .</i>		13
Cap. IV.	<i>Del corso delle Febbri Calde , e del modo , con cui si terminano .</i>		14
Cap. V.	<i>Delle Febbri Calde in generale , e della loro divisione .</i>		18
Cap. VI.	<i>Della Sete , che accompagna le Febbri Calde .</i>		24
Cap. VII.	<i>Degli accidenti , che sopravengono alla bocca , ed al palato nelle Febbri Calde .</i>		26
Cap. VIII.	<i>Del mal di capo , che accompagna le Febbri Calde .</i>		27
		Cap.	

•(XXIV)•

Cap.	IX. Della <i>Veglia</i> , o <i>fia difficoltà di dormire , che va unita alle Febbri Calde .</i>	29
Cap.	X. Del <i>Delirio</i> , da cui sono accompagnate le <i>Febbri Calde .</i>	30
Cap.	XI. Del <i>Letargo</i> , che accompagna le <i>Febbri Calde .</i>	32
Cap.	XII. Del <i>Flusso di ventre</i> , che accompagna le <i>Febbri Calde .</i>	34
Cap.	XIII. Del <i>Singbiozzo</i> , del <i>Vomito</i> , e dei <i>Mali di cuore</i> , che accompagnano le <i>Febbri Calde .</i>	36
Cap.	XIV. Dell' <i>Inquietudine</i> , e dei <i>mali di stomaco</i> , che accompagnano le <i>Febbri Calde .</i>	39
Cap.	XV. Delle <i>Debolezze</i> , e degli <i>Svenimenti</i> , che accompagnano le <i>Febbri Calde .</i>	41
Cap.	XVI. Delle <i>Convulsioni</i> , e de' <i>Moti convulsivi</i> , che s'aggiungono nelle <i>Febbri Calde .</i>	42
Cap.	XVII. Del <i>Sudore</i> , e del <i>Freddo</i> , che accompagnano le <i>Febbri Calde .</i>	45
Cap.	XVIII. Della <i>Febbre Catarrale semplice .</i>	47
Cap.	XIX. Della <i>Febbre Catarrale maligna .</i>	Pag. 49
		Cap.

○(XXV)○

Cap.	XX. Della Febbre Migliare , e delle Migliari .	53
Cap.	XXI. Della Febbre Migliare , che sopraggiunge alle Puerpere .	58
Cap.	XXII. Della Rosolia .	62
Cap.	XXIII. Del Vajuolo .	68
Cap.	XXIV. Della Febbre Scarlati- na , e della Febbre Orticata .	77
Cap.	XXV. Della Rispola , o sia Infiammazione della Cute .	80
Cap.	XXVI. Della Febbre Petec- chiale .	82
Cap.	XXVII. Delle Febbri Putride .	84
Cap.	XXVIII. Delle Febbri intermit- tenti , e Fredde .	87
Cap.	XXIX. Delle Febbri continue .	91
Cap.	XXX. Dell' Infiammazione del Cervello , o sia della Frenesia .	95
Cap.	XXXI. Della Infiammazione degli Occhi .	98
Cap.	XXXII. Dell' Infiammazione del- la Gola , e degli Orecchi .	100
Cap.	XXXIII. Della Pleurisia .	106
Cap.	XXXIV. Dell' Infiammazione del Polmone , o sia Pe- ripneumonia .	113
Cap.		

o(XXVI)o

Cap.	XXXV. <i>Dell' Infiammazione dello Stomaco .</i>	Pag. 116
Cap.	XXXVI. <i>Dell' Infiammazione degli Intestini .</i>	118
Cap.	XXXVII. <i>Dell' Infiammazione del Diafragma .</i>	119
Cap.	XXXVIII. <i>Dell' Infiammazione del Fegato e della Milza .</i>	120
Cap.	XXXIX. <i>Dell' Infiammazione delle Reni .</i>	121

P A R T E S E C O N D A .

Capitolo I.	<i>Rimedj per le Malattie indicate in questa seconda Parte .</i>	Pag. 122
Cap.	II. <i>Del Mal di Capo .</i>	126
Cap.	III. <i>Della Melancolia , e della Mania .</i>	132
Cap.	IV. <i>Della Rabbia .</i>	136
Cap.	V. <i>Della Letargia .</i>	138
Cap.	VI. <i>Dell' Apoplessia .</i>	140
Cap.	VII. <i>Dei Catarri , delle Flussioni , e del Catarro soffocante .</i>	146
Cap.	VIII. <i>Delle Convulsioni , e dei Moti Convulsivi .</i>	147
Cap.	IX. <i>Dell' Epilepsia , ovvero Mal Caduco .</i>	152
Cap.	X. <i>Della Vertigine .</i>	153
	Cap.	

o(XXVII)o

Cap.	XI. Dello Svenimento o De-	
	liquio .	Pag. 155
Cap.	XII. Del Mal di denti , e delle	
	Malattie delle Gen-	
	give .	156
Cap.	XIII. Del Tintinio d' orecchio ,	
	e della Sordità .	162
Cap.	XIV. Della Raucedine .	163
Cap.	XV. Della Tosse .	165
Cap.	XVI. Della Emoptisia , o sia	
	Sputo di sangue .	173
Cap.	XVII. Dei Tumori Cistici del	
	Polmone .	175
Cap.	XVIII. Della Polmonia .	177
Cap.	XIX. Dell' Asma , o sia difficoltà	
	di respirare .	181
Cap.	XX. Della Palpitazione di cuore .	186
Cap.	XXI. De' Polipi , e delle Concre-	
	zioni Polipose ; che si	
	formano nel cuore .	188
Cap.	XXII. Della Debolezza , e dello	
	Sconvolgimento di Stoma-	
	co .	190
Cap.	XXIII. Del Vomito di sangue .	196
Cap.	XXIV. Della Diarrea , e del Flusso	
	di ventre .	200
Cap.	XXV. Della Dissenteria .	202
Cap.	XXV. Del Flusso Celiaco .	207
Cap.	XXVII. Della Lienteria .	208
Cap.	XXVIII. Del Male della Collera .	
Cap.	XXIX. Della Stitichezza .	212
	Cap.	

o(XXVIII.)o

Cap.	XXX.	<i>Della Passione Iliaca .</i>	213
Cap.	XXXI.	<i>Della Colica .</i>	217
Cap.	XXXII.	<i>De' Vermini ,</i>	223
Cap.	XXXIII.	<i>Della Timpanitide .</i>	226
Cap.	XXXIV.	<i>Delle Ostruzioni del Fe-</i> <i>gato , e della Milza .</i>	229
Cap.	XXXV.	<i>Dell' Itterizia .</i>	233
Cap.	XXXVI.	<i>Del Flusso Epatico .</i>	238
Cap.	XXXVII.	<i>Del Calcolo , e della Re-</i> <i>nella delle Reni , e della</i> <i>Vescica .</i>	240
Cap.	XXXVIII.	<i>Del Calcolo della Vesci-</i> <i>cchetta del Fiele .</i>	249
Cap.	XXXIX.	<i>Delle Emorroidi cieche .</i>	251
Cap.	XL.	<i>Del Flusso Emorroidale ec-</i> <i>cessivo .</i>	252
Cap.	XLI.	<i>Del ritardo , e della sop-</i> <i>pressione del Flusso Emor-</i> <i>roidale , e delle Malat-</i> <i>tie , che ne provengono .</i>	254
Cap.	XLII.	<i>Del Flusso Emorroidale</i> <i>scieroso .</i>	257
Cap.	XLIII.	<i>Del Pisciasangue .</i>	258
Cap.	XLIV.	<i>Dei Sudori , che accom-</i> <i>pagnano il Flusso Emor-</i> <i>roidale .</i>	260
Cap.	XLV.	<i>Della Ritenzione d' Orina .</i>	
Cap.	XLVI.	<i>Del Piscialatte .</i>	267
Cap.	XLVII.	<i>Della Incontinenza d' Orina .</i>	270

Cap.

o(XXIX)o

Cap. XLVIII. *Di alcune Malattie della
Verga .*

272

Cap. XLIX. *Delle Malattie Nervose ,
o Ippocondriache .*

277

Fine dell' Indice .



TEMOI-

TEMOIGNAGE EN FAVEUR

*Du Livre intitulé : L' Art de se traiter , & de
se guérir soi-même dans les Meladies les
plus ordinaires , & les plus dangereuses ,
par M. LANGHANS .*

Extrait du journal Etranger. Septembre 1762.

„ Cet Ouvrage est divisé en deux Volumes :
„ Dans le premier , l' Auteur traite des Fie-
„ vres , & des Inflammations du sang : dans
„ le second , des Maladies de la Tête , de
„ la Poirrine , du Ventre , des Nerfs , &
„ du Scorbut . M. Langhans s' est sur-tout at-
„ taché à décrire d' une maniere exacte & lu-
„ mineuse les principales Maladies , & les re-
„ medes qu' elles demandent ; de forte qu' au
„ moyen de ce seul Ouvrage un Malade pour-
„ roit très bien s' administrer lui-même , sans
„ avoir besoin de recourir au Médecin . L' Au-
„ teur , l' un des meilleurs élèves du celebre
„ M. de Haller , est au nombre des premiers
„ Médecins Pensionnaires de la Ville & Repu-
„ blique de Berne , & s' est déjà acquis une
„ réputation distinguée . “

L' AR-

TESTIMONIANZA.

IN FAVORE

Del Libro intitolato : *L' Arte di curarsi ,
e di guerirsi da se medesimo nelle più
comuni , e più gravi malattie di*
DANIELE LANGHANS .

Estratta dal Giornale straniero , Settembre 1762.

„ Quest' Opera è divisa in due Tomi . Nel
„ primo , l' Autore tratta delle Febbri e delle
„ Infiammazioni del sangue , nel secondo ,
„ delle Malattie del Capo , del Petto , del Ven-
„ tre , de' Nervi , e dello Scorbuto . Il Sig.
„ Langhans si è specialmente applicato a de-
„ scrivere in modo chiaro ed esatto le malat-
„ tie principali , e i rimedj , che queste esi-
„ gono ; dimanierachè mediante questo solo li-
„ bro un ammalato potrebbe ottimamente cu-
„ rarsi da per se stesso , senz' aver bisogno di
„ ricorrere al Medico . L' Autore , che è uno
„ de' migliori allievi del celeberrimo Sig. de
„ Haller , è in oggi altresì uno de' primi Me-
„ dici Pensionarj della Città , e Repubblica di
„ Berna , e si è di già acquistata una ben di-
„ stinta riputazione . “

L' A R T E

DI CURARSI, E DI GUARIRSI DA SE

Nelle più comuni, e più gravi malattie.

o) ————— (o)

P A R T E P R I M A .

DELLE FEBBRI, E DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE.

o) ————— (o)

C A P I T O L O I.

Della natura, e delle proprietà de' Rimedj,
de'quali si parla in quest'Opera, e del peso,
e della dose, in cui deonfi prendere.

Num. 1.

Polvere. Febbrifuga seſſativa.

QUesta polvere è risolutiva, e dolcificante, propria per prevenire la infiammazione, e la putrefazione degli umori, e per rilassare la tensione troppo grande delle fibre; e conseguentemente riesce utilissima in tutte le febbri, e le altre malattie, che provengono dalla tensione troppo grande delle fibre, o dalla corruzione degli umori. Ad un fanciullo di due, o tre anni può darsene 6. grani infino a 8. ; dai tre anni fino ai quattro 8. in 10. grani; dai quattro anni fino ai sei 10. in 12. grani; dai sei anni fino ai tredici un grano di più per ciascun anno; e ad una persona adulta da 30. fino a 40. grani, o in una chicchera di Tè leggerissimo, e tepido, o in acqua d' orzo, o in qualsivoglia altra bevanda

A

tra bevanda



2
tra bevanda rinfrescante . Secondo la natura della malattia , a cui è adattata , può prendersene tre , quattro , cinque volte il giorno , ed anche più . Costa 8. batz , o sia Soldi 3. denari 4. di Francia ogni mezz' oncia .

Essenza Febrifuga Elvetica , detta anche Spirito di Gletscher , o delle Ghiacciaje .

Num. 2. **Q**uesto Spirito è un rimedio attivo , e risolutivo , composto di varj sali , e varie acque rinfrescative , ed attenuanti , atte a prevenire la corruzione degli umori , è conseguentemente utilissimo in tutte quelle febbri , nelle quali si tratta di attenuare , e di risolvere . Opera per via delle urine , e de' sudori . E' soprattutto efficace per la melanconia , e pei vapori isterici ; nelle due specie di apoplezia ; nella soffocazione , e nell' asma provenienti da un flegma spesso , e vischioso . Può darsene ad un fanciullo dai cinque anni fino agli otto 10. in 12. goccioline per volta ; dagli otto anni fino ai quindici 12. in 15. goccioline : e ad un uomo maturo 60. in 80. goccioline . Secondo la natura della malattia se ne può prendere tre , quattro volte al giorno , ed anche più , ma in una porzione fredda , affinchè il caldo non lo faccia svaporare . Ma dopo averlo preso conviene berci sopra qualche cosa di caldo . Si vende 6. batz. 2. Kr. ogni mezz' oncia .

Polvere di Canfora sudorifica .

Num. 3. **E'** Questa Polvere un rimedio di assai forza , ed assolutamente necessario in tutte le febbri maligne , ed infiammatorie , per la

per la virtù, che ha di distaccare le parti corrotte del sangue, e di evacuarle per mezzo della traspirazione; d'incidere, ed attenuare quelle, che sono troppo spesse, cosa assai comune nella pleurisia. La dose per un fanciullo di sei mesi è di due grani; per un fanciullo d'un anno, e mezzo di 4. grani; dai due anni fino ai tre di 4. in sei grani; dai tre anni fino ai cinque di 5. in 8. grani; dai cinque agli otto anni di 8. in 10. grani; dagli otto anni ai dodici di 10. in 15. grani: dai quindici anni fino ai trentaquattro se ne può prendere un grano di più per ciascun anno, e per una persona matura dai 30. fino ai 35. grani. Bisogna prenderla sempre in qualche cosa di tepido, secondochè esige la febbre, o la malattia, che si ha. Costa 11. batz. un quarto d'oncia.

Gocciola Febrifughe sedative.

Num. 4. **Q**uesto rimedio è assolutamente necessario, non solamente nella maggior parte delle febbri, che sono accompagnate da una tensione di nervi violenta, e da un flusso di ventre, ma in altre malattie ancora, per esempio nella soppressione de' mestruj, nei dolori cagionati nelle membra da difetto di traspirazione, nei mali di capo provenienti da acrimonia, e da ripienezza di stomaco. Se ne possono prendere tante gocciola, quanti grani di polvere di Canfora, in qualche licore rinfrescativo, o nel Tè, fino a tre, e quattro volte il giorno, secondo la natura della malattia. Queste gocciola costano 13. batz il quarto d'oncia.

Polvere Emetica.

Num. 5. **Q**uesta Polvere è il più sicuro, e il più efficace vomitivo, che dar si possa a' fanciulli, ed agli adulti, senza correr verun rischio. La dose per un fanciullo di sei mesi è di 3., 4., 5. grani, per un fanciullo di un anno di 5. grani fino ad otto; per un altro d'un anno e mezzo di 8. in 10. grani; da un anno e mezzo fino ai quattro e mezzo di 12. grani fino a 16.; dai sei anni fino ai sette e mezzo di 14. fino a 18. grani; dai dieci fino ai quindici anni di 24. fino a 25. grani; dai quindici anni fino ai trenta, quaranta, e cinquanta di 25. fino a 40. grani. Per le persone deboli, ed attempate la dose è di 10. grani fino a 20. in brodo leggiero, in acqua tepida, o nel Tè. Se la prima dose non opera in capo ad un' ora, si aggiungeranno nella seconda alcuni grani, e si beverà sovente acqua tepida in copia, o del Tè non troppo carico. Chi è di temperamento debole, o è soggetto ad Emorragie, o ha il polmone ulcerato, non deve far uso di Emetico. Questa Polvere costa 15. batz ogni quarto d'oncia.

Polvere Purgativa, e Lenitiva.

Num. 6. **Q**uesta Polvere è attenuante insieme e purgativa, e può darli per conseguenza in tutti que' casi, ne quali si richiede la purga. Uccide, e scaccia i vermini di qualsivoglia specie, che nello stomaco, o negli intestini si generano; fa uscire in pezzi la Tenia, lunga talvolta più di 30. braccia. Si da agli adulti

adulti nell' acqua , nel Tè , o nel brodo chiaro;
ed ai fanciulli nel Cioccolatte . La dose per un
fanciullo di due anni fino a quattro è di 5.
grani fino a 10. ; di quattr'anni fino a otto
di 10. fino a venti grani; di otto anni fino a
dodici di 20. fino a 25. grani; di tredici anni
fino a quindici di 25. fino a 40. grani . Un
adulto può prenderne 40. , 80. , 90. grani per
volta , quando è forte , e difficile a purgare .
Ogniquale volta si va del corpo , convien bere
del brodo liscio , o del Tè leggerissimo . Co-
sta 5. batz il quarto d' oncia .

Gocciolo Annodine per la Podagra , ec.

Num. 7. **Q**uesto rimedio è uno de' migliori ,
e de' più utili , che si conoscano ,
mentre in un batter d'occhio libera un uomo
dai più atroci dolori , e da molte altre gravi
malattie . La dose è la stessa , che quella delle
Gocciolo febrifughe sedative , delle quali si è
parlato sotto il Num. 4. , e si piglia nello stes-
so modo . Costa 32. batz il quarto d' oncia .

Essenza corroborativa contro li dolori

Matricali .

Num. 8. **Q**uest' Essenza è sommamente effica-
ce per tutte le malattie matrica-
li , per la debolezza di nervi , i deliquii , e le
emorragie , che ne risultano . Le adulte possono
prenderne da 15. fino a 30. grani in una volta
in un piccol bicchiere d' acqua , o di Tè , e re-
plicar la dose tre volte , e più il giorno , secon-
do l' esigenza de' casi . Costa 12. batz , e 8. Kr.
il quarto d' oncia .

A a

Sala

Sale Glaciale .

Num. 9. **Q**uesto Sale è un purgante molto dolce , che si può dare con ottima riuscita nelle febbri calde , che richieggono una pronta purga , e che si mescola con una parte di nitro ben raffinato . Un adulto può prenderne un' oncia in una volta nell' acqua tepida ; e i soggetti gracili , e di mezza età possono prenderne mezz' oncia , che costa 2. batz .

Impiastro Vesicatorio .

Num. 10. **B**enchè questo Impiastro , come quasi tutti gli altri , che portano questo nome , composto sia colle Mosche cantaridi , ha nondimeno sopra di essi il vantaggio di calmare , mercè la sua balsamica qualità , il dolore . Secondocchè esigono le circostanze , si può , quando la persona è adulta , distendere sopra un pezzetto di tela larga come la mano , e dargli quasi la spessezza della costa d' un coltello ; ma prima di applicarlo alla parte , conviene lavar questa con aceto , e con vino . Dopo che l' impiastro ha fatto elevare sopra la pelle una vesica di sufficiente grandezza , il che accade d' ordinario in capo a sei , o a ott' ore , bisogna levarlo via , togliere la cuticola , e dopo che ha suppurato , asciugarla mattina e sera con un panno lino , e coprir la piaga con un foglio di carta grigia , che si ungerà ben-bene di buttiro fresco , o liquefatto . Se si vuole , che la piaga suppurì per qualche tempo , si mescolerà col buttiro qualche poco dell' impiastro ; se no , si ungerà soltanto di buttiro fresco , o vi si applicherà sopra l' impiastro descritto

scritto al Num. 11. Accade talvolta, che le Cantaridi, che sono di una natura sommamente corrosiva, e volatile, mescolandosi col sangue, producono una stranguria, o sia difficoltà di urinare. In tal caso bisogna toglier via l'impia-
stro, quando è troppo forte; ma spesse volte cessa di per se stessa la stranguria con bere del decotto di bismalva, o sia altea, o di camomilla. Costa quest'impiastro 6. batz la mezz'oncia.

Impiastro rinfrescativo, ed attenuante.

Num. 11. **Q**uest' Impiastro ammolisce tutti i tumori, che sono in procinto di ulcerarsi, e gli fa in poco tempo venire a maturità, massime quando si ha l'avvertenza di metterci sopra il cataplasma caldo, ed emolliente, di cui si parla nel Cap. IV. §. 7. Spesso accade, che il tumore si apre quando si toglie via l'impiastro per rinnovarlo. Guarisce pure tutte le piaghe provenienti da scottatura, o da strumento da taglio, da puntura, ec. In questo caso non si ha da far altro, che asciugare ogni mattina la piaga con un panno lino ben netto, oppure con filaccia, ed appressar l'uno all'altro i labbri della piaga; o se si vuole che si rimargini più presto, si farà scaldare in un cucchiajo alquanto di Balsamo vulnerario, nel quale si bagnerà un poco di filaccia, che si metterà nella piaga; si applicherà l'impiastro sopra, e si avvertirà di legarlo bene, affinchè l'aria non dia sulla piaga. Quest' impiastro costa 5. batz la mezz' oncia.

A 4.

Balsamo.

Balsamo Vulnerario.

Num. 12 **I**L Balsamo, di cui si tratta, è quello, che ho indicato nel precedente Articolo, e costa 4. batz il quarto d' oncia.

Polvere Febbrifuga contro le febbri fredde.

Num. 13 **Q**uesto rimedio è il più sicuro, e il più efficace, che adoperar si possa in tutte le febbri fredde; per prevenire l' infiammazione delle parti esterne, il granchio, la paralisi, e la debolezza de' nervi, &c. Può darsene ad un adulto 60. in 80. grani in una volta in acqua, o in brodo chiaro, o in altro simile veicolo, e replicar la dose quattro o sei volte il giorno. Se ne possono anche prendere dall'età di un anno fino a quella di sessanta, o settanta tanti grani, quante sono le goccioline, che si prendono dell' Essenza febbrifuga, di cui parlai al Num. 2., nel modo, che indicherò parlando delle malattie, nelle quali non si può assolutamente omettere questo rimedio. Costa 6. batz il quarto d' oncia.

o)-----o

CAPITOLO II.

Del veggimento, che si deve osservare nelle Febbri ardenti ec.

§ 1.

E' Opinione generalmente ammessa, che tutte le febbri continue, qualunque siasi la loro specie, riscaldano il sangue, e gli umori, gli condensano, e finalmente gli corrompono, ogniquale volta l' infermo adopera rimedii impropri, o non tiene una regola conveniente. Egli
adunque

adunque procurerà di prevenire cotali accidenti uniformandosi a quella, che sono per preferirvergli.

§. 2.

UNO degli articoli più importanti delle regole si è la pulizia, tanto riguardo alla camera, quanto riguardo ai panni lini che si usano. Quanto alla camera, si deve avvertire di aprirla mattina, e sera nella state, e solo dopo il mezzodì quando fa freddo, per farle ricever l'aria; ma perchè questa non riesca nociva all'infermo, si chiuderanno le cortine del letto, e si coprirà il medesimo come si potrà meglio. Rispetto al letto, ed ai panni lini, l'infermo muterà spesso di camiscia, e si rifàrà ogni giorno il di lui letto, o per lo meno si riacconcerà, per impedire, che non riasorbisca l'umido, che il sudore gli ha fatto contraere. Ogni giorno pure dovrà vuotarsi l'orinale, e la seggetta, lavando ogni cosa diligentemente con acqua fresca. Spesse volte non bastano queste precauzioni nelle febbri maligne per conservare la pulizia, massime quando bassa è la camera, e picciola, in tal caso bisogna adacquarla più volte il giorno con acqua, ed aceto, principalmente quando l'ammalato si duole di sentir troppo caldo, o di mal di capo. Puossi altresì profumare mattina, e sera con bacche di ginepro, o con mastice.

§. 3.

Minore non dev' essere l'attenzione, che si userà per ciò, che concerne gli alimenti, e le bevande. Bisogna non solamente che sieno di natura tale, che possono conservare all'in-

A 2

fermo

fermo le forze per tutto il tempo, che dura la malattia, ma ancora diminuire il male, e fradigarlo affatto. Perciò gli si prescriverà una dieta rinfrescativa, dissolutiva, ed attenuante, e propria a prevenire la corruzione degli umori; imperciocchè tutti gli alimenti caldi, e soggetti a corrompersi, come sono per esempio la carne, le uova, ec. sono per esso altrettanti veleni, e deono per conseguenza essergli interdetti. Gli alimenti, che gli si consentono, sono tutte le frutta agrette, come pomi corti, ciriege agre, prugne, fragole, pesche; l'acqua d'orzo, di riso, la semola fatta con l'acqua, ed un poco di sale, ec. Verso la declinazion della febbre, ed anche qualche tempo dopo, quando l'infermo principia a rimettersi in forze, oltre le dette cose, si possono a lui dare varie radici, e varj legumi; per esempio degli spinacci, della lattuca, del fuc di piselli, dei cavoli, ec. Le bevande deono altresì essere di tal natura, che calmino l'ardor de'la febbre, ed impediscano la putrefazione degli umori. Ecco la migliore bevanda, che si può prescrivere in tutte le febbri continue, dal principio fino al fine; essa si fa quasi dappertutto nel modo stesso. Si fa bollire in una pinta e mezza d'acqua due pugilli e mezzo d'orzo mondato fino alla diminuzione del terzo; si vuota quindi l'acqua in un altro vaso, e vi si mettono dentro otto o dodici cucchiari di aceto, ed altrettanti di miele, o di zucchero, e se ne dà di tempo in tempo un bicchiere tiepido all'in-

in-

infermo, per farlo sudare. Si può, ove si voglia, mettere del sugo di limone in vece dell' aceto, e raddolcirlo coll' zucchero. Alcuni fanno bollire delle ciriege nere secche, o delle brugne nell' acqua, e la beono tepida; altri mettono in detta acqua di ciriege, o nell' acqua comune, che fanno alquanto scaldare, tanto vitriolo dolce, o spirito di zolfo, o di sal marino, quanto basta per darle un gusto agretto, e ne fanno l'ordinaria loro bevanda; e per vero dire, questa vale quanto la precedente, purchè se ne beva spesso, avendo quelle qualità medesime, che hanno i rimedj, che si adoperano in somiglianti sorti di febbri..

§. 4.

Questa medesima regola, rispetto agli alimenti, e alle bevande, tanto si confa alle febbri terzane e quartane, quanto alle febbri continue. Puossi nondimeno dare all' infermo alternativamente nella giornata, e massime nel tremito, del Tè fatto con cinque parti di camomilla, ed una di centaurea..

§. 5.

Nelle febbri continue dichiarate l' ammalato non deve prendere altro alimento, nè bere, che acqua d' orzo, di riso, di vena, latte sfiorato, acqua di Selz, o altra somigliante, che indicherò a suo luogo..

§. 6.

Sonovi molte altre precauzioni da osservarsi nelle febbri, le quali non sono di minore importanza delle già accennate rispetto alla

A 6.

dieta..

diera . 1. L' infermo deve starsene in riposo , e soprattutto non parlare , essendo sommamente a lui contrario lo strepito . 2. Devè pure , quando non fuda , star levato una o due ore del giorno , massime quando si sente la gola riscaldata . 3. In caso che dorma la notte , si avvertirà di non isvegliarlo sotto qualsivoglia pretesto , e si aspetterà per dargli quello , di che può aver di bisogno , che si risvegli da per se stesso . 4. Tostochè principia la malattia , si deve sminuire l' alimento dell' infermo , e soprattutto non dargli nulla , che possa riscaldarlo , ma continuare il reggimento , che di sopra accennai . Alcuni giorni dopo cessata la febbre , si accrescerà il suo cibo , e gli si darà a colezione qualche cucchiajo di vino repido mescolato con eguale porzione d' acqua . Sia il vino , sia un alimento troppo sostanzioso , sono assolutamente nocivi nelle febbri continue , che nascono dalla mala disposizione de' visceri , anche quando sono cessate . 5. In qualunque specie di febbre , quando il calore è violento , bisogna guardarsi dal troppo coprire l' infermo , affinchè non si riscaldi maggiormente . Anzi è meglio ch' egli sia coricato sur un pagliariccio , o materazzo di crini , e non troppo coperto , che non sopra un materazzo di lana , o di piume , mentre questo non fa altro , che riscaldarlo , ed indebolirlo colla forte traspirazione , che produce .

CAPITOLO III.

Delle Febbri in generale , e della loro divisione .

§. 1.

Sotto nome di febbre s'intende in generale un agitazione straordinaria della massa del sangue , la quale è accompagnata da un tremito più o meno violento , a cui succede calor eccessivo .

§. 2.

Ad alcuni suole sopraggiungere la febbre calda in un subito , e si manifesta per via del tremito , e del calore : in altri , e questi fanno il maggior numero , si annunzia parecchi giorni prima con diversi sintomi , i più ordinarij de' quali sono la stanchezza , la languidezza , i dolori nelle membra , nelle reni , e nel filo del dorso , i mali di capo , le nausea , e qualche volta il vomito ; l' inquietudine e l' agitazione nel sonno , la malinconia , e la tristezza , il flusso di ventre , o la stitichezza ; le convulsioni , massime ne' fanciulli prima ch' esca loro il vajuolo .

§. 3.

Possono in generale tutte le febbri ridursi alle seguenti tre classi . Pongo nella prima le febbri continue , o fredde , che terzane , e quartane si appellano , o semplici sieno , o sieno doppie , nella seconda tutte le febbri calde continue ; e nella terza le febbri efliche ed ostinate .

§. 4.

Le febbri fredde sono così dette , perchè ogni accesso viene accompagnato da un tremito
vior

violento, in tutto il corpo; e dopo che questo tremito, come pure il caldo, ed il sudore, che gli vengono dietro, hanno durato qualche tempo, cessano esse per ricominciar di bel nuovo indi ad alcune ore, o ad alcuni giorni.

§. 5.

LE febbri calde son quelle, che mai non cessano del tutto, ma che avendo acquistate tutte le loro forze, diminuiscono alquanto verso lo spuntar del giorno: Possono collocarsi in questa classe tutte le febbri calde, infiammatorie, maligne, e contagiose. E siccome queste sono per loro natura assai diverse le une dalle altre, così esiggon rimedj diversi.

§. 6.

LENTE, ed eriche si chiamano quelle febbri, che durano più di un mese, e consumano, ed essiccano tutta l'abitudine de' corpi nel mentre; che tolgono all'infermo tutte le forze. Queste sono o semplici, o prodotte dall'acrimonia, e dalla dissoluzione del sangue, o provengono dal vizio de' visceri, come nella polmonia a cagion d'esempio.

o)-----o)

C A P I T O L O I V.

Del corso delle Febbri calde, e del modo, con cui si terminano.

§. 1.

Tutte la febbri, sì calde, che fredde, principiano da un tremito, la di cui forza, e durata non è sempre la stessa. In tutte le febbri continue, o calde, eccettuata la catarrale, pa-

passato che è una volta il freddo, più non ritorna; ma è seguito da un eccessivo calore, che dura sino al fine della febbre, e va sempre crescendo. Se poi nel corso d'una febbre calda, che già è durata più giorni, il tremito ricomincia, egli è questo un pessimo segno, ed annunzia o una infiammazione interna, o una migliare, o un' espulsione cutanea, o una postema in qualche parte del corpo, che non tenderà molto a crepare. Tra le febbri fredde, e le calde vi è questo divario, che ogni nuovo acceso delle prime è sempre accompagnato dal tremito.

§. 2.

IL primo calore, che succede al tremito nelle febbri calde è assai tollerabile, ma cresce la sera, e si sminuisce all'accostarsi del giorno. Quanto meno da un giorno all'altro si sminuisce questo calore, tanto è più forte, e pericolosa la febbre, e più violenti sono i sintomi della medesima.

§. 3.

IPiù comuni sono il tremito, il freddo, il calore, la frequenza del polso, l'acceleramento del respiro, la sete, l'aridità della lingua, e del palato, la lividezza, le fessure, e le piccole ulcere, che vi si formano, il mal di capo, la veglia, l'agitazione, e l'inquietudine; le nausea, i mali di cuore, lo stomaco affannato, la stitichezza, o il flusso di ventre, e i tormini; la difficoltà di urinare, o l'incontinenza di urina; i sudori abbondanti, il delirio,

e le

e le convulsioni. Quanto più è violenta la tagione della febbre, tanto è maggiore il numero de' suoi sintomi. I più leggieri si manifestano in sul principio, i forti nel crescere, e i più forti nel vigore del male ..

§. 4.

Tutte le febbri osservano un certo periodo prima di giungere alla loro maturità, e di finire. Le più forti durano d'ordinario 7., 9., 11., 14., 21. giorno e più, e in questo intervallo sopravviene una crisi, o un cambiamento, che si termina colla morte, o colla guarigione dell'ammalato. In queste forti di giorni la febbre è nel suo maggior grado di violenza.

§. 5.

Le crisi ordinarie delle febbri si fanno per via de' sudori, delle orine, del secesso, o del flusso di sangue del naso. Se ne fanno talvolta per via di tumori, che vengono in certe parti glandulose, come sarebbe nel collo, nell'anguinaja, nelle ascelle, o in simili altri luoghi del corpo ..

§. 6.

Questa crisi non è altro, se non uno sforzo, che fa la natura, e l'arte per discacciare la materia febbrile, ed è perfetta, o imperfetta. E' perfetta, quando la febbre cessa, e l'infermo ricupera a poco a poco la salute: è per l'opposto imperfetta, quando la febbre continua, o sopraggiugne qualche altra malattia. Per esempio sopravviene in alcuno dei giorni accennati al §. 4. un sudore copioso per-

uno

tutto il corpo, e l' orina depone una feccia bianchiccia; la febbre però non cessa, anzi va crescendo, se non sopraggiunge un' emorragia, o un flusso violento di ventre. Lo stesso è della crisi di una febbre calda rispetto al sangue, che vien dal naso; per quanto egli sia copioso, non cessa però la febbre. Se poi all' incontro l' infermo non perde, che alcune gocce di sangue di un rosso chiaro, e pallido, egli è in generale un segno infallibile, che il sangue è disciolto, e vicino a corrompersi, e che la malattia è mortale. I segni, che annunziano un' emorragia di naso salutare, sono la gravezza del capo, un dolor nella fronte, la rossezza degli occhi, i frequenti sternuti, e il doppio batter del polso. Un' orina torbida, e bianchiccia prima della crisi annunzia la durata della febbre, e questa è anche più lunga, quando l' orina è rossa, e torbida.

§. 7.

Si possono annoverare fra le crisi salutiferi i tumori, che vengono in certe parti glandulose del corpo, de' quali dissi nel §. 5., benchè per lor medesimi sieno d' un grave incomodo. Quando per questa via deve farsi la crisi, è preceduta da un nuovo accesso di febbre, dal freddo, e dal tremore, da un dolor lancinante nel sito, in cui principia a gettarsi la materia febbrile, dalla rossezza, e dall' enfiagione. Tostochè uno si avvede di questi sintomi, bisogna applicar sul tumore il seguente cataplasma per farlo maturare, e poi tagliarlo.

Si

Si prendono tre , o quattro pugni di mollica di pan bianco , due , o tre di camomilla , di bismalva , o di tasso barbasso , si riducano in polve , e si facciano bollire insieme nel latte , o nell' acqua : ridotto il tutto così a guisa di polriglia ; se ne distenda la metà sopra un pezzo di tela , e si applichi sul tumore , soprapponendovi poscia una benda per impedire , che non cada . Convieni rinnovare questo cataplasma , quando è freddo , finchè la postema sia del tutto matura , e si apra da per se stessa , o per mezzo di una cipolla bianca , cotta sotto la cenere , che se le mette sopra ; ovvero si forerà colla lancetta . Forata la postema , se ne farà uscir dolcemente la materia , e si applicherà poi sulla piaga un impiastro rinfrescativo per impedire , che l' aria non la tocchi . La piaga si medicherà mattina , e sera , finchè sia interamente saldata . In caso , che rimanga in sul principio qualche materia nella postema , si mescolerà coll' impiastro qualche droga maturativa , dopo averla prima lavata con acqua di salvia tepida , cui si metterà qualche cucchiajo di miele , e due volte tanto di mirra polverizzata , quanto può capirne sopra la punta di un coltello .

o)-----o)

C A P I T O L O V.

*Delle Febbri calde in generale ,
e della loro divisione .*

§. I.

Tutte le febbri calde continue , o sieno esse febbri calde infiammatorie , o maligne or-
di-

dinarie, ed accompagnate da espulsioni cutanee; hanno tra loro questo di comune, che tutte sono febbri continue, e calde, la cura delle quali richiede certe precauzioni, e le principali di queste consistono: 1. In attenuare, rinfrescare, e calmare il troppo grande ardor del sangue con rimedj, e pozioni dissolutive, e rinfrescative. 2. In diminuire la massa del sangue con cava-
te di sangue dal braccio, o dal piede. 3. In attenuare, ed evacuar la materia, che nutre, e mantiene la febbre, per via de' purganti, de' sudorifici, e degli emetici. 4. In osservare per tutto il corso della malattia la dieta indicata nel Cap. II. 5. in calmare i sintomi, che talvolta sopraggiungono pendente la febbre.

§. 2.

HAvvi nel principio di tutte le febbri calde continue più, o meno di condensamento, e d' infiammazione nel sangue, e per conseguenza richieggono esse indistintamente rimedj rinfrescativi, ed attenuanti. Ogniquale volta pertanto sopraggiunge alcuna delle febbri da me accennate nel Cap. III. §. 1. e 2., convien to-
sto, 1. lasciare l'ordinaria regola di vita, ed appigliarsi a quella, che prescrissi nel Cap. II., 2. far uso dell' acqua cotta, e della pozione, di cui parlai nello stesso Capitolo al §. 3., oppure dello sciero di latte repido. 3. mettervi di due in due ore una presa dell' Essenza febbrifuga Elvetica menzionata nel Cap. I. num. 2. o della polvere sedativa, di cui ho parlato in esso Capitolo al num. I., e bervi ogni volta
sopra

sopra alcune chicchere di Tè tepido. Verso la sera, e la notte ancora, quando l'infermo non dorme, si può, in cambio della detta Essenza, e polvere, dargli di due in due ore cinque, o sei cucchiari, ed anche più, del latte rinfrescativo seguente. Piglisi quanto si può colla mano di mandorle, si gettino nell'acqua bollente per poterle pelare, e si pestino in un mortajo finchè si riducano in poltiglia; vi si aggiunga, se si vuole, una mezz'oncia di semenze di meloni, e pestata ogni cosa insieme, vi si versi sopra una mezza pinta d'acqua tepida, ovvero d'acqua di fior di tiglia, di ciriegio, o altr'acqua distillata rinfrescativa: si coli il tutto a traverso una tela, e se si vuole, si addolcisca con un poco di zucchero bianco. In caso, che il calore sia violento, e la pelle secca, ed infiammata, si può a questo latte aggiugnere il quarto d'un oncia della polvere febrifuga sedativa accennata nel Cap. I. num. 1., farlo intiepidire, e darne all'ammalato di due in due ore. Durante tutto il tempo, che lo adopera, gli si darà la notte per dissetarlo dell'acqua d'orzo tutta pura, senza miele, e senz'aceto, ovvero dell'acqua di fior di tiglia. Parlo quì di un adulto, mentre ai fanciulli, ed ai giovani si da del suddetto latte quanto essi ne vogliono. Si proseguirà a praticare questo rimedio finchè più piccola diventi la febbre, dopo del che si sminuirà la dose, o se ne piglierà men sovente.

§. 3.

POchissime sono quelle febbri calde, che non richieggano fin dal principio la cavata di sangue, tanto a cagione della pletora, o sia soverchia abbondanza del medesimo, che ne impedisce la circolazione, quanto a cagione della violenza del male. Nell' uno, e nell' altro caso la cavata di sangue è assolutamente necessaria per prevenire l' infiammazione, ed accelerare la guarigione dell' infermo. Se la febbre è violenta, ed accompagnata dai sintomi accennati nel Cap. IV. §. 3., o il soggetto è pletorico, bisogna principiare dal cavargli sangue dal braccio; o dal piede, e se è adulto la cavata di sangue dev' essere di una libra in circa. Se l' indomani la febbre non si è diminuita, e se il sangue è molto infiammato, il che si conosce da una certa cotica bianca, che si forma sulla di lui superficie, conviene reiterare la cavata di sangue fino a tre, o sei volte, avvertendo però di farla ogni volta minore di un quarto dell' antecedente, e di lasciar passare il tremite. Generalmente la mattina è il tempo più proprio per la cavata di sangue, mentre verso quel tempo suole d' ordinario diminuire la febbre. Quando non si è cavato sangue all' infermo prima del quinto, o sesto giorno, non bisogna più farlo, ma regolarfi come ho detto nel §. 2. ed aspettare pazientemente, che cessi la febbre.



§. 4.

LA terza precauzione , che si deve avere nelle febbri calde , si è di attenuare , e cavar fuori la materia febbrile colla purga , o col vomito nel principio della malattia , o co' sudori . Quanto alla purga , è assolutamente necessario , sia nel principio , sia in tutto il corso della febbre , che l' infermo abbia il ventre libero , ed evacui di quando in quando . Ciò si può ottenere col mezzo di un clistere emolliente ; che si prepara nella seguente maniera . Se adulto è il soggetto , si prenda la quarta parte di una pinta d' acqua tiepida , quattro o sei cucchiari d' olio d' olivo ; o di mandorle dolci , e mezzo cucchiaro di sale ; o veramente due pugilli di camomilla , e di bismalva , o sia altea , che si fan bollire in una mezza pinta d' acqua fino alla consumazione della metà , e quando l' acqua è tiepida , vi si mette dentro il sale e l' olio . Succede alcuni giorni prima che principj la febbre , che l' ammalato per stitichezza ha il ventre gonfio e teso ; e molte impurità negl' intestini : in tal caso , oltre il detto clistere , bisogna dargli la mattina due oncie di buona manna in due bicchieri di siero di latte , o d' acqua , oppure una presa di sal glaciale , di cui si è parlato al n. 9. Se poi la stitichezza continuasse nel corso della febbre , si reitererà il suddetto clistere , per evitare che i vapori e le impurità contenute nel basso ventre non aumentino la febbre , l' affanno , e il mal di capo .

§ 5.

IN caso che l' infermo abbia , prima che principj la febbre, o nel momento medesimo , in cui si manifesta , delle nausea ; dei rutti , e degli sforzi di vomito , gli si darà la mattina , che è il tempo , in cui si scema la febbre , una presa della polvere emetica indicata nel Cap. I. n. 5. , avvertendo , come dissi , di fargli ber sopra quantità d' acqua d' orzo , o d' acqua comune tiepida . Un' ora in circa dopo egli prenderà una presa della polvere febrifuga sedativa nell' acqua tiepida , per finire di evacuare le materie , che possono esser rimaste nello stomaco . Indipendentemente dai sopradetti rimedj , conviene cavargli sangue l' indimani , tostocchè si vedrà sminuita la febbre .

§. 6.

Tutti i sudorifici , massime quelli , che composti sono di materie calde , non vagliano nulla nelle febbri , delle quali parliamo , se non si adoperano a proposito , e con le precauzioni di sopra accennate . Possono soprattutto diventar nocivi in sul principio delle febbri , prima che si sia attenuata la materia febbrile , perchè agitano più , o meno il sangue , e ne fanno svaporare la linfa , prima che la parte più densa abbia avuto il tempo di attenuarsi . I migliori sudorifici onde si possa in queste febbri far uso , sono le pozioni calde , che accennai nel Cap. II. §. 3. , e gli attenuanti , quali sono la polvere febrifuga sedativa del Cap. I. num. 1. , e lo spirito glaciale dello stesso Capitolo

pitolo num. 2. Nei vajuoli maligni, che retrocedono, o che stentano ad uscire, si può dare all' infermo per due giorni consecutivi la mattina, e nella bevanda, che gli si dà solitamente, una presa della polvere di Canfora del Cap. I. num. 3. in vece della polvere sedativa.

§. 7.

LA quarta cosa, che dissi nel §. 2. di questo Capitolo doverfi fare, e che si deve con somma accuratezza praticare in tutte le febbri, è la dieta, la quale ha da essere affatto conforme in ogni suo punto a quella, che prescrissi nel Cap. II.

§. 8.

LA quinta si riduce a rimediare a que' sintomi, che sopraggiungono nel corso della maggior parte delle febbri, e che d' ordinario sono pericolosissimi. Ne parlerò più diffusamente ne' Capitoli seguenti.

O, ————— (o

CAPITOLO VI.

Della Sete, che accompagna le febbri calde.

§. 1.

LE febbri calde sono generalmente accompagnate da un' ardentissima sete, la quale è prodotta dal difetto di escrezione della saliva, e dell' umore pituitoso destinato ad umettare la bocca, ed il palato. E' un ottimo contrassegno il sentirsi poco alterato nelle febbri calde, e l' aver la bocca, ed il palato umido, come lo è cattivissimo all' incontro l' averlo asciutto, ed arido, comechè non si abbia sete.

§. 2.

§. 2.

IL miglior rimedio per calmar la sete, e rinfrescar la bocca, è l'acqua di fontana, in cui si sieno fatte bollire varie erbe rinfrescative, attenuanti, e dolcificanti, tanto affinchè più facilmente si mescoli col sangue, quanto per rinfrescarlo, lavarlo, e prevenire la corruzione degli umori.

§. 3.

Possuno adoperarsi per dissetar l'ammalato tutte le diverse pozioni, che indicai nel Cap. II. §. 3. Coloro, che ne hanno i mezzi, possono prendere due o tre oncie di tamarindi, ed altrettante d'orzo mondato, e far cuocere il tutto in una pinta e mezza d'acqua finchè sia consumata la metà, passarla a traverso di una stamigna, e mettervi dentro tre o quattr' oncie di siroppo rosato, o di Crespino, o sia Berberis, per darle un gusto acidetto. O veramente facciasi stemperare in una pinta d'acqua calda un' oncia di tartaro preparato, e si radolcisca poscia con siroppo di limone, o con zucchero. Questa pozione è altresì molto propria a togliere le ostruzioni. L'infermo farà uso nella notte del latte di mandorle indicato nel Cap. V. §. 2.

§. 4.

SI può riguardare la sete, che accompagna le febbri calde, come un male necessario, mentre costringe l'infermo a ber sovente, ed a riparare così l'umidità de' vasi, che la violenza del calore, e la fermentazione del san-

B

gue

gue vanno consumando . Egli deve ber sovente , e tiepido , e se potesse berne alcune pinte ogni giorno , non farebbe se non meglio . E' anche meglio bere tiepido che freddo , perchè così la pozione s' infinua più presto ne' vasi , rilassa le fibre , attenua , e discioglie gli umori , che si sono condensati .

o) ————— (o

CAPITOLO VII.

Degli Accidenti , che sopravengono alla bocca , ed al palato nelle Febbri calde .

§. 1.

Questi accidenti , come già dissi nel Cap. IV. §. 3. sono l'aridità , la rossezza , e l'infiammazione della bocca e del palato , una pituita bianca , o nera , che apre la lingua e i denti ; delle fisure , e delle ulcerette nella lingua , che a poco a poco si recano all' esofago , che rendono sommamente difficile l'inghiottire ; e talvolta pure l'infiammazione , e l'ulcerazione dell'ugola , e delle gavigne , o amigdale ,

§. 2.

Irimedj atti a dissipare questi sintomi sono tutte le pozioni , che ho accennate nel precedente Capitolo per estinguere la fete , con le quali deve l'infermo gargarizzar sovente , e lavarsi la bocca . In caso che vi sieno delle fisure , faccianfi cuocere alcune rape nell'acqua finchè sieno divenute molli , raddolciscasi la dett' acqua con miele , vi si mettano alcuni cucchiari d'aceto , e poi se ne lavi spesso la bocca ; oppure si pigli un bianco d'uovo sbattuto ,

tuto, e vi si aggiungano alcuni cucchiari d' acqua e di mel rosato. O veramente si metta un cucchiaro di semi di cotogni nell' acqua tepida: per distaccarne la mucosità, e poi vi si stemprino dentro alcuni cucchiari di robbo di diamoron, o di Crespino, e se ne bagni spesso la lingua. Se poi l' ugola è infiammata, e gonfia, fate bollire un manipolo di foglie di rose in una pinta d' acqua, fatevi disciogliere dentro un' oncia di nitro; aggiugnereci un bicchiere di miele e di aceto, e servitevene spesso per gargarizzare. Accennerò nel Capitolo delle infiammazioni della gola il modo di guèrre le ulcere dell' ugole, e delle gavigne.

o)—————(o

C A P I T O L O V I I I.

Del mal di Capo, da cui sono accompagnate le Febbri calde.

§. 1.

IL mal di capo, benchè ordinariissimo nelle febbri calde, non lascia però di tormentar molto l' ammalato finchè dura. La cagione più comune di esso è la troppo grande dilatazione de' vasi del cervello pel sangue, che vi concorre. Talvolta è prodotto dai vapori, che si sollevano dallo stomaco; e in questo caso è accompagnato dalla nausea, e dagli sforzi di vomito. Spesse fiate ancora è cagionato da un' ostinata stitichezza di ventre.

§. 2.

NEl primo caso convien ricorrere alla emissione di sangue dal piede, come dissi nel

B 2

Cap.

Cap. V., per diminuire il valume del sangue, che è concorso al cerebro, e trarlo alle estremità inferiori. Sono altresì molto buoni i pediluvj tiepidi, ma non si deono praticare, salvo quando la febbre è in diminuzione. Vi si può aggiugnere il clistere accennato nel Cap. V. al §. 4. Ecco alcuni topici, che si possono usare in simil caso. Fate bollire nel latte della mollica di pan bianco fintantochè si riduca in foggia di poltiglia, chiudetela fra due pezzi di tela, ed applicatela sul capo, avvertendo di rinnovarla di quando in quando. Se poi il mal di capo continua, pigliate del lievito quanto ne capisce la mano, impastatelo con un mezzo cucchiajo di sale, la metà meno di pepe, e due cucchiari d' aceto, avviluppate il tutto in un panno lino, ed applicatelo durante una notte sul capo. Se questo rimedio non opera, si applicheranno alle tempie dell' infermo due sanguisughe per estrarne cinque o sei oncie di sangue.

§. 3.

IN caso che il mal di capo proceda da impurità contenute nello stomaco, si darà all' ammalato uno de' vomitivi indicati nel Cap. V. §. 6. Se è cagionato da stitichezza, si osserverà il metodo accennato nel §. 4. di detto Capitolo.

§. 4.

NEi mali di capo accompagnati dai sintomi, che annunziano un' emorragia di naso, di che ho parlato del Cap. IV. §. 6.,

fi

si farà fiutare all' infermo del latte, o dell' acqua calda per dilatare con questo fumo i vasi, ed affrettare lo scolorimento del sangue, di cui è minacciato.

o) ————— (o

CAPITOLO IX.

Della Veglia, o sia difficoltà di dormire, che va unita alle Febbri calde.

§. 1.

LA difficoltà di dormire, che va unita alle febbri calde, è generalmente prodotta dal calore, e dall' agitazione del sangue, che corre al capo, e distende i vasi del cerebro. Quando essa dura lungo tempo, è talvolta seguita dal delirio, e dall' infiammazione delle meningi.

§. 2.

OLtre le precauzioni già indicate nel Cap. V. sonovi molti altri rimedj sì esterni, che interni, i quali convien praticare in questo caso. 1. Si raderà il capo dell' infermo, e vi si applicherà sopra il topico accennato nel precedente Capitolo §. 2. 2. Si coglierà il tempo, in cui si è scemata la febbre, per fargli mettere tra le gambe dell' acqua tiepida, e queste se gli freggeranno poscia con un pezzo di flannela calda. 3. Gli si darà la sera il Clistere accennato nel Cap. V. §. 4. e la notte il latte di mandorle, di cui nel §. 2. di esso Capitolo, aggiungendovi mezz' oncia, o un' oncia di seme di papavero, ed avvertendo di fargli bere sopra la pozione agitata, di cui parlai, per

impedire che non sopravenga un flusso di ventre.

§. 3.

BAsta qualche volta per conciliare il sonno il far alzare l'infermo nel corso della giornata, quando egli non suda, o il farlo mutar di letto, o l'appendere nella camera un vaso pieno d'acqua, facendo in modo che questa cada a gocciola a gocciola in un piatto, che vi si sottopone.

o) ————— (o

CAPITOLO X.

*Del Delirio, da cui sono accompagnate
le Febbri calde.*

§. 1.

IL Delirio è un sintoma non men frequente, che è pericoloso nelle febbri calde, e procede o dal trasporto del sangue al cervello, o dalla infiammazione delle meningi.

§. 2.

TRe sono le specie di delirio. Il primo, che è il più comune, e il meno pericoloso, è quello, in cui l'infermo, quando la febbre è nella maggiore sua forza, rimane per qualche tempo senza poter far uso della propria ragione, senza poter pensare, nè raziocinare. Il secondo è la frenesia complicata colla febbre calda; imperciocchè hayvi un'altra specie di frenesia senza febbre. Il terzo è una specie di rabbia o di furore. Il primo ha luogo sovente nelle febbri calde, quando si trascura di cavar sangue all'infermo in sul principio, o quando egli

egli pratica rimedj troppo caldi . Il terzo è quello , in cui l' infermo sembra dormire cogli occhi aperti , comechè non dorma punto , mentre parla e discorre inconsideratamente .

§. 3.

E Cco i segni ordinarij , che annunziano il delirio nelle febbri calde . L' infermo contro il suo solito risponde con alterezza ed insolenza alle interrogazioni , che gli si fanno ; getta via le coperte , che ha indosso , e se ne sta sempre coricato sul ventre . La di cui voce diventa chiara in un subito , e sonora , chiara pure e limpida è la sua orina , e la perde senza accorgersene . Ha gli occhi vivaci , rossi , e scintillanti ; se gl' indebolisce l' udito , la sua orina piglia un color pallido , &c. .

§. 4.

PEr calmare i delirj leggeri , che sono i più comuni , si adoperano i rimedj , che ho prescritti nel precedente Capitolo contro la difficoltà di dormire . Quanto alla frenesia , si applicherà sulla nuca del collo dell' infermo , tra le due omoplate , o sul polpaccio delle gambe un impiastro vescicatorio largo quanto uno scudo , e più , se è un adulto , dopo aver prima lavata con aceto la parte . La mattina seguente assai per tempo si toglierà via l' impiastro , si aprirà colle forbici la vescica , che si farà sollevata , e dopo tolta l' epiderma , si coprirà la piaga con una foglia di cavolo fresco , o di lattuca , unta di buttiro fresco , e senza sale . In case che l' impiastro non abbia estrat-

to abbastanza di serosità, o che la piaga torni a rimarginarsi prima che cessi il delirio, si applicherà un altro impiastro, oppure si mescolerà col buttiro tanto d'unguento quanto sarà necessario, e dopo averlo disteso ben bene sulla foglia di cavolo, si applicherà sulla piaga. Altro più non si dovrà fare, che medicarla; e perciò dopo averla asciugata mattina e sera con un pezzo di tela cruda, si distenderà un poco di buttiro sopra una foglia di cavolo, o veramente vi si applicherà sopra l' impiastro accennato al n. 11.

§. 5.

Consistendo principalmente la cura di questa specie di delirio nel calmare l'infiammazione delle meningi, nell'attraere il sangue alle estremità inferiori, e nel diminuire l'eccessiva tensione de' vasi, conviene, tuttochè fin dal principio della febbre si sia cavato sangue all' infermo, aprirgli di nuovo la vena, oppure, dopo che avrà riposato, applicargli alle tempie alcune sanguisughe, o fargli delle scarificazioni alle spalle, e sopra la nuca, e fregargli di due in due ore i piedi con una flanella calda insinattanto che diventino molto rossi e cocenti.

o) ————— (o

CAPITOLO XI.

Del Letargo, che accompagna le Febbri Calde.

§. I.

Tutte le febbri calde sono accompagnate da un letargo, il quale indebolisce ordina-

ariamente l'ammalato in cambio di aggiugnere-
gli forza , e che è un pessimo contrassegno ,
tanto in sul cominciare , quanto in sul finire
della malattia , come quello , che comprova la
ripienezza de' vasi , e la distensione delle fibre
del cervello . Un simile letargo è adunque pe-
ricolossissimo ne' primi giorni di una febbre cal-
da , quando è alternativamente accompagnata
dal freddo e dal calore , quando l'ammalato
suda copiosamente in alcune parti del corpo ,
e quando prima che la febbre diminuisca, man-
da fuori un' orina torbida ed oscura . Questo
letargo è facile a distinguerfi da quel sonno
salutifero , e fortificante , in cui cade l'infer-
mo dopo il decremento della febbre , nel qual
mentre ha il respiro dolce e facile , eguali le
pulsazioni del polso , la traspirazione calda
ed impercettibile per tutto il corpo , e l'orina
cotta e spessa .

§. 2.

Ecco i rimedj , che si deono usare contro
questo pericoloso sintoma . 1. Si adopereran-
no i rimedj , e le pozioni agrette , delle quali
ho parlato nel Cap. V. 2. Quelli , che ac-
cennai nel Cap. IX. contro la difficoltà di
dormire . 3. Si darà all' infermo una presa
della polvere di Canfora del Cap. I. n. 3. e
in oltre un bicchiere di ottimo aceto , che gli
si farà fiutare sovente . 4. Quando si è ommesso
di cavargli sangue , o quando se glien' è cavato
poco in principio della febbre , e nulla opera-
no nè i rimedj , nè il clistere , nè i pediluvj ,

B. 5.

nè

nè le fregagioni , nè l' impiastro di lievito , onde parlai di sopra , bisogna cavargli otto o dodici oncie di sangue dal braccio.

●)—————(●

CAPITOLO XII.

Del Flusso di ventre , che accompagna le Febbri calde .

§. 1.

Dissi di sopra , succedere bene spesso , che una febbre calda , quando è pervenuta al suo maggior grado di forza , si termina fortunatamente con un flusso di ventre . Ma quando questo sopraggiunge nei primi giorni della febbre , prima ch' essa abbia fatto il suo corso , indipendentemente dalla debolezza , e dalla nausea , che l' accompagnano , senza che perciò si sminuisca la febbre , egli ha questo di pericoloso , massime nelle febbri calde accompagnate dalle migliali , del vajuolo , o da altra somigliante malattia , che fa retrocedere , e rientrare nella massa del sangue la materia morbifica .

§. 2.

Questo accidente viene per l' ordinario prodotto da una materia acre contenuta negl' intestini , che non si ebbe l' avvertenza di evacuare nel principio della malattia . Talvolta pure proviene ne' soggetti di stomaco debole , dal cattivo uso fatto delle pozioni agrette , e rinfrescative , che portano via la mucosità dello stomaco , e la fanno passare negl' intestini . Spesso altresì è cagionato dal freddo
preso

preso dall' ammalato mentre sudava , per cui si è interotta la traspirazione .

§. 3.

Ogniqualvolta sopraggiunge questo sintoma prima del tempo , in cui la febbre è solita terminarsi , bisogna tosto dar all' infermo un clistere d' acqua d' orzo tutto pura , e senza sale , ovvero di linseme per rintuzzare l' acrimonia delle materie contenute negli intestini .

2. Gli si darà per bevanda , in vece dell' acqua cotta agretta , dell' acqua d' orzo pura , ovvero si farà bollire in una pinta d' acqua un pugillo di corno di cervo ben preparato fino alla diminuzione della metà , e se gliene darà a bere quanto egli vorrà . 3. Si procurerà di mantenere l' infermo in un sudor dolce , ed in una insensibile traspirazione per agevolare la escrezione degli umori contenuti negli intestini . Perciò gli si darà ogni ora qualche cucchiario della seguente pozione , e gli si farà bere sopra dell' acqua d' orzo , o di corno di cervo tiepida . Prendete un quarto di pinta d' acqua di fior di sambucco , mezz' oncia d' occhi di gamberi preparati , il quarto d' un' oncia d' antimonio sudorifico , e di zucchero bruciato quanto stimerete a proposito . Se non avete le dette droghe , dategli , come dissi nel Cap. I. n. 3. la polvere di Canfora sudorifica in vece della polvere febrifuga sedativa del Cap. V. §. 2. Cessato che sarà il flusso di ventre , l' infermo si governerà nel modo prescritto nel Cap. V. Se poi proseguisse , gli si darà una

B 6.

presa

presa delle goccioline anodine del Cap. I. n. 7. nella sua acqua cotta, o nella sua bevanda, dopo che avrà presa la polvere di Camfora. Gli si applicherà sul ventre una salvietta calda, oppure un cataplasma di camomilla, di bismalva, o di Tasso barbaffo, che si farà bollire nel latte con della mollica di pan bianco finchè tutto sia ridotto in poltiglia, o veramente non si farà altro che far bollire nel latte del linseme pesto. Sono alcuni che prendono della Teriaca di Venezia, e l'applicano sul ventre, dopo averla distesa sopra una pelle, coprendola poscia con una salvietta calda. Deesi pure avvertire di fregare continuamente i piedi all'ammalato con un panno lino caldo.

§. 4.

IN caso che il flusso di ventre accompagna-
to sia da nausea, e da' mali di cuore, o che si dubiti che le impurità dello stomaco sieno passate negl' intestini, si darà tosto all' infermo nella sua acqua cotta d'orzo una presa della polvere emetica del Cap. I. n. 5.

o) ————— (o

C A P I T O L O X I I I.

Del Singbiozzo, del Vomito, e dei mali di cuore, che accompagnano le Febbri calde.

§. 1.

Potendo questi sintomi procedere da varie
cagioni, conviene attentamente esaminar-
gli, per addattarvi i convenienti rimedj. Pri-
ma di tutto è da vederli, se sono sopraggiunti
in sul cominciare, o in sul crescere, o nello
stato

stato della febbre . In secondo luogo bisogna conoscere a fondo la natura e la qualità della febbre , e considerare se questi sintomi non sono alle volte prodotti della retrocessione delle migliari , del vajuolo , o di somigliante altra espulsione .

§. 2.

SE questi sintomi sopraggiungono in sul principio della febbre , e se l' ammalato sente nella regione dello stomaco un ardore , e certi pugnimenti , che mai non sentì , egli è segno che vi è dell' infiammazione , e che la materia artritica e morbifica è stata ripercossa , e che per conseguenza provengono da acrimonie contenute nello stomaco ; onde in questo caso convien dargli , se è adulto , 30. in 40. grani di polvere d' Ipecacuana , e 10. grani di sale ammoniaco nell' acqua tiepida , oppure una presa della polvere emetica del Cap. I. n. 5.

§. 3.

Accade talora , che questi sintomi , che sopravengono nel principio , ed anche nello stato della febbre , sono cagionati dalle impurità contenute nello stomaco , e in tal caso si può tosto dare all' infermo un legger vomitivo . Se si manifestano nell' aumento , e nello stato di una febbre maligna , accompagnata da qualche espulsione cutanea , si ha luogo di credere , che la materia febbrile è ancor mescolata col sangue , e cogli umori , che incontra della difficoltà per uscire , o che si è gettato sullo stomaco . In simile contingenza si deono tosto

toſto adoperare i rimedj più efficaci per procurarne la evacuazione innanzichè abbia cagionata un' infiammazione nei viſceri. Queſti rimedj ſono 1. la polvere di Canfora del Cap. I. n. 3. di cui ogni mattina ſi daranno due preſe all' infermo , facendogli ber ſopra varj bicchieri d' acqua d' orzo tiepida . Dal meriggio in poi gli ſi preſcriverà la ſteſſa regola , che in ſul principio della febbre , e verſo la ſera gli ſi darà una preſa delle goccioline febrifughe ſedative del Cap. I. n. 4. nell' acqua corta che ſuol bere , o 40. goccioline ſudorifiche di Stahl , con 10. goccioline anodine di Hofman . 2. Gli ſi applicherà ſulla nuca , o ſulle tempia l' impiatro veſcicatorio del Cap. I. n. 10.

§. 4.

SE accade nelle febbri maligne , o nel vaiuolo , che i ſintomi ſuddetti ſieno prodotti dalla ripercuſſione della materia morbiſica , e che le puſtule ſi abbaffino e divengano nere , ſi darà per un paio di giorni all' infermo della polvere di Canfora meſcolata con la polvere febrifuga del Cap. I. n. 13. nella ſua bevanda . Queſto è il ſolo rimedio , che poſſa guarirſi dall' infiammazione , e dalla morte , ond' è minacciato .

§. 5.

PUÒ talvolta ſuccedere in coloro , che ebbero qualche attacco di podagra , di paralifiſia , di Reumatifmo , o di calcolo , o che ſono ſoggetti ai vermini , che la febbre , da cui

cui sono affaliti, cagioni loro dei mali di cuore, dei vomiti, &c. quando la materia morbifica si fissa nello stomaco. Di questi diversi accidenti si discorrerà a suo luogo.

o)-----o

CAPITOLO XIV.

Dell' Inquietudine, e dei mali di stomaco, che accompagnano le Febbri calde.

§. 1.

PArechie son le cagioni, che possono nelle febbri calde produrre violenti dolori di stomaco, ai quali si dee comunemente il nome di Cardialgia. Provengono essi in principio delle febbri dai muchi e dalle impurità, che si formano nello stomaco, ed allora l' infermo è soggetto a' mali di cuore, ed a' vomiti, i quali calmano per qualche tempo il dolore. In questo caso se gli dee dare l' emetico del Cap. XIII. §. 2.

§. 2.

SE provengono dalla retrocessione delle migliari, o della materia morbifica, si terrà il metodo, che prescrissi in detto Cap. XIII. §. 3. Si darà in ogni ora all' ammalato del brodo d' orzo, di tritello, o di vena senza sale, e la notte l' emulsione del Cap. V. §. 2. la quale non può se non esser utile, quando i dolori provengono dalla infiammazione dello stomaco.

§. 3.

Questi dolori provengono talvolta dall' eccessivo uso, che si è fatto di rimedj conti-

tinenti, molto nitro, o sal terrestre. In tal caso basterà il dare spesso all' infermo dell' acqua d' orzo ben calda per attenuar le materie contenute nello stomaco, ed evacuarle per scello.

§. 4.

Niente è più atto a calmare queste spezie di dolori, quando durano lungo tempo, di un cataplasma di farina di vena con latte, o di quello accennato nel Cap. XII. §. 3. che si applicherà sella regione dello stomaco, soprapponendovi una salvietta calda.

§. 5.

L' Ansietà, o inquietudine, che prova l' infermo nel principio delle febbri calde, provien per lo più da un sangue crasso e riscaldato, che non circola molto liberamente nel polmone. In questo caso bisogna subito cavarli sangue, e dargli i rimedj indicati nel Cap. V.

§. 6.

SE poi provenisse da un' ostinata siccità, gli si daranno quelli del §. 4. di detto Cap. V.

§. 7.

Quest' ansietà è sommamente pericolosa, quando sopravviene nel principio, e nello stato della febbre, ed è accompagnata dal freddo, e dal tremore. Essa indica in generale che vi è della marcia maligna nel sangue. Nè è meno da temersi quando proviene dalla ripercussione di questa stessa malignità. Nell' uno o nell' altro caso bisogna regularsi, come ho detto nel Cap. XIII. §. 3.

CA-

CAPITOLO XV.

*Delle Debolezze , e degli Svenimenti , che
accompagnano le Febbri calde .*

41

§. 1.

QUando in principio d' una febbre calda l' infermo cade spesso in isfinimenti , egli è segno , che vi' è nel corpo qualche malignità , massime quando sono accompagnati dal tremito . Allorchè questo succede , bisogna curarlo nel modo , che dissi nel Cap. V. e dargli mattina e sera una presa delle goccioline febrifughe anodine del n. 4. in alquanto d' acqua cotta .

§. 2.

SE questi sintomi sopraggiungono verso la declinazion della febbre , o quando è questa nel suo maggior grado di violenza , e se non provengono , che dalla dissipazione degli spiriti animali prodotta dalla cavata di sangue , dall' agitazione , dalla difficoltà di dormire , e dalla scarshezza di alimento , basta il far fiutare all' ammalato di quando in quando qualche cosa di forte , come sarebbe dell' aceto , dello spirito glaciale , n. 2. o dello spirito di corno di cervo , e dargli dopo che sarà diminuita la febbre , un cucchiario di aceto nell' acqua cotta d' orzo ; ovvero , se si può avere , si pigliano alcune oncie di sugo di limone , altrettante di aceto , ed il doppio d' acqua d' orzo , che si raddolcirà con zucchero , e quando s' viene l' ammalato , gli si danno due cucchiari per volta di questa mistura .

§. 3.

§. 3.

SE queste debolezze, e questisfinimenti sono prodotti dalla retrocessione di qualche, espulsione cutanea, o della materia artritica, si praticherà quanto dissi nel Cap. XIII. §. 3.

§. 4.

SE provengono da postema nel polmone, o in alcun' altra parte interna del corpo, che siasi aperta, o si trovi in procinto di aprirsi, altro non si dee fare, se non dare all' infermo, finchè lo abbandoni la febbre, le pozioni rinfrescative, agrette, ed anodine, delle quali uno si valse da principio; e poscia i rimedj, de' quali parlerò nel Capitolo della Tifichenza, e Confunzione. Imperciocchè, quando avviene questo accidente, l' infermo muore subitamente, o cade in una confunzione incurabile.



CAPITOLO XVI.

Delle Convulsioni, e de' moti convulsivi, che sopraggiungono nelle Febbri calde.

§. 1.

ALTRO non s' intende sotto il nome di Convulsione, se non una contrazione violenta ed involontaria di tutto il corpo, o di alcuna delle sue parti, le quali rimangono per qualche tempo intirizzate e senza moto, come appunto succede nel granchio. Tra questo, e la convulsione havvi questo divario, che il primo non assale, se non una parte del corpo, e la seconda assale più parti insieme. Il granchio

chio è più frequente dell' altra nelle febbri calde , ed ora viene negli occhi , ora nelle labbra , o in altra parte visibile , ora in un braccio , ed ora in una gamba .

§. 2.

Queste spezie di moti convulsivi possono talvolta sopraggiungere ad una donna soggetta ai vapori , o ad un fanciullo , che faccia i denti , o che abbia dei vermini nel corpo , senza che vi abbia alcuna parte la febbre ; e in simili casi non meritano attenzione .

§. 3.

Tutte le convulsioni , che sopravengono nello stato d' una febbre calda , e che affalgono tutto il corpo , sono mortali , e nulla , o pochissimo giovano contro di esse i rimedj . Si può nondimeno tentare , se un vescicatorio , quale si è indicato nel Cap. I. n. 10. , applicato sulla nuca , o sul polpaccio fosse per produrre qualche salutare effetto .

§. 4.

Sopraggiungono spesso nel corso d' una febbre calda moti convulsivi , i quali sono seguiti da un nuovo accesso di febbre , accompagnato dal freddo e dal tremore . Questo generalmente è un segno indicante , che vi è nel corpo qualche umor maligno , di cui la natura cerca idi liberarsi per mezzo di qualche escrezione ; e in tal caso bisogna , quando non è troppo violenta la convulsione , cavare alcune oncie di sangue all' infermo , dopo avergli primo dato il clistere , di cui nel Cap. V. §. 4. , e la polvere di Can-

Canfora del Cap. I. dietro la quale gli si farà bere dell' acqua cotta calda in copia . Se le convulsioni non cessano , gli si applicherà un impiastro vescicatorio .

§. 5.

I Fanciulli, che non hanno avuti i vajuoli, sono spesso fiate assaliti da convulsioni, quando la febbre sta per manifestarsi; ma tali convulsioni non sono pericolose, ed indicano soltanto, che i vajuoli non tarderanno molto ad uscire.

§. 6.

SE queste specie di convulsioni sopravengono in un fanciullo, che non abbia ancora fatti i denti, sarà facile il conoscere dai di lui escrementi, se il far de' denti ne sia la cagione; e in questo caso converrà dargli, oltre i rimedj indicati nel Cap. V., due o tre clisterj emollienti, e più ancora, se occorrerà.

§. 7.

IN caso che tali convulsioni sieno cagionate da calcolo, o da renella nelle reni, il che si conosce al dolore acuto, che l' infermo risente in sul confine della spina del dorso, ed agli sforzi, che fa per vomitare, oltre i clisteri emollienti, e gli altri rimedj già indicati, gli si daranno ogni ora alcuni cucchiari d' olio di mandorle dolci, in cui si spremeranno alcune goccioline di sugo di limone. Si applicherà in oltre di tempo in tempo sulla parte, in cui sente il dolore, il cataplasma emolliente del Cap. XII. §. 3.

CA-

*Del Sudore, e del freddo, che accompagnano
le Febbri calde.*

§. 1.

QUasi tutti i nostri Contadini Svizzeri son persuasi, che il mezzo più sicuro di gucirre da una febbre calda sia il sudar molto, e di quì è che non fittosto essa principia, che pigliano i rimedj più caldi, che possano ritrovare, e spessissimo ne costa loro la vita. Egli è un ottimo segno, quando nello stato delle febbri calde sopraggiunge in tutto il corpo un caldo ed' insensibil sudore, che rende umida la pelle. Ma pessimo è all' incontro, quando il sudore sopravviene in sul principio, e nel corso della febbre; perciocchè non serve ad altro, che a far isvaporare la parte più acquosa del sangue, dimodochè non resta più ne' vasi, se non la parte più densa, e la più terrestre.

§. 2.

IL miglior consiglio, ch' io posso dare, è di non mai impedire il sudore, che sopravviene in sul finire delle febbri calde, e di non provocarlo in sul principio con rimedj caldi. Il meglio, che in tali occasioni far si possa, egli è di far bere ogni giorno all' infermo alcune pinte della decozione rinfrescantiya, ed attenuante, di cui ho di sopra favellato, a fine di attenuare gli umori, e diminuire insensibilmente la tensione troppo grande delle fibre.

§. 3.

§. 3.

Rispetto al freddo ed al tremito , che accompagnano le febbri calde , diffi di sopra , che questi sintomi , allorchè sopraggiungono nel corso della febbre , se si eccettua la catarrale , nulla presagiscono di buono , e sono sempre i forieri delle migliari . In tal caso , quando la febbre è forte , e pletorico il soggetto , gli si deono cavare alcune oncie di sangue dal braccio , o dal piede , e gli si darà , oltre la polvere febrifuga anodina , quella di Canfora del Cap. I. n. 1. , senza ometter però le pozioni , delle quali ho parlato .

§. 4.

Quando il tremito sopraggiunge nello stato d' una febbre calda ordinaria , ed è seguito da un dolor sordo , e poscia acuto e pulsativo in qualche parte del corpo , egli è segno che vi si forma un tumore . E in tal caso ecco ciò , che si dee fare . 1. Allorchè la febbre è violenta , convien cavare all' infermo alcune oncie di sangue . 2. Per prevenire l' infiammazione , convien raddoppiare la dose delle pozioni agrette del Cap. II. §. 3. , e far uso degli altri rimedj , che in principio della febbre si sono adoperati . 3. Non bastando poi questi mezzi ad impedire la formazione del tumore , si applicherà sulla parte , in cui si fa sentire il dolore , l' impiastro emolliente del Cap. IV. §. 7. avvertendo di farlo sempre scaldare , e di rinnovarlo spesso . Quando il tumore sarà pervenuto alla sua maturità , vi si applicherà sopra

sopra una cipolla calda, cotta sotto la cenere, per farlo crepare, o almeno perchè si renda più facile ad esser forato colla lancetta. Si medicherà quindi la piaga nella maniera indicata nel Cap. V. §. 7.

o) ————— o

CAPITOLO XVIII.

Della Febbre catarrale semplice.

§. 1.

Questa febbre, come dissi, è la meno pericolosa di tutte le febbri continue. Principia con una stanchezza in tutto il corpo, con una tensione nella spina del dorso, con un mal di capo, e con una specie d'inquietudine nella maggior parte delle parti esterne e carnose. L'infermo sente prima un freddo in tutto il corpo, a cui in un subito succede il calore. In sul principio stenta a soffiarsi il naso, questo poscia si va umettando, e a poco a poco si gonfia; sternuta spesso; gli lacrimano gli occhi; spesso se gli gonfiano ed infiammano l'ugola, le gavigne, e le labbra; e la febbre cessa, o si termina con sudori, e con una gran copia di orine; le quali formano uno spesso deposito, di color bianchiccio, o rossiccio.

§. 2.

Queste sorte di febbri sono assai comuni, e regnano per l'ordinario nel principiar della primavera e dell'autunno, ed anche nella state, quando il tempo è vario, ed allora sono cagionate da difetto di traspirazione. Se la materia di questa si getta sull'asperarteria e sul pol-

polmone , produce una raucedine , una difficoltà d'inghiottire , una tosse violenta , un'oppressione di petto ; e l'ammalato non rende da principio , che un'acqua chiara e salina , che poi a poco a poco si intorbida . Queste sorte di febbri sono più violente ne' soggetti pletorici che negli altri , a segno tale , che sono talvolta accompagnate dal delirio non meno delle febbri calde .

§. 3.

LA cura di dette febbri consiste in trar sangue dal braccio o dal piede a' soggetti pletorici , ed in restituire al sangue la fluidezza , che ha perduta pel frequente uso delle pozioni del Cap. II. n. 3. , e finalmente in calmare la febbre , ed in ristabilire la traspirazione col mezzo di una presa di Spirito glaciale del Cap. I. n. 2. che si darà all' infermo mattina e sera . Se gli può sostituire l'essenza sudorifica di Sthal , e le goccioline anodine d' Hoffman , delle quali ho parlato nel Cap. XIII. §. 3. -

§. 4.

SE l'ugola , e le gavigne sono gonfie ed infiammate , l'ammalato gargarizzerà con acqua tiepida , aceto , e miele , e gli si applicherà sul collo l'impiaastro rinfrescativo , ed attenuante del Cap. I. n. 11.

§. 5.

SUCCede sovente , dopo cessata la febbre , che sopraggiunge una tosse ostinata , che tormenta notte e dì l'ammalato , e produce talora una rottura ne' vasi del polmone , di che la
pul-

pulmonia è una conseguenza . Per calmarla , si darà all' ammalato dell' acqua di semola , di riso , o d' orzo , oppure la mattina a colazione mezza pinta di latte di vacca tiepido , in cui si faranno bollire alcuni pugilli di foglie di rose secche , ed un poco di cannella . La sera nell' andar a letto prenderà una presa delle gocciole anodine del Cap. I. n. 7. nel brodo , o nell' acqua di fior di farfara , o sia unghia cavallina , a guisa di Tè . Si servono alcuni , per calmar la tosse , del brodo di una pollastra giovine senza sale , di cui tagliansi le gambe dopo che è cotta . .

§. 6.

Rispetto alla dieta , deve precisamente essere la medesima , che ho prescritta per le febbri calde .

o)-----o

CAPITOLO XIX.

Della Febbre Catarrale maligna .

§. 1.

Così in generale si appellano le febbri (conviene però eccettuarne le fredde) , nelle quali è frequente il tremito , e che hanno qualche cosa di maligno nella loro natura , locchè si può riconoscere dai seguenti indizj . 1. Sopraggiungono all' improvviso senza veruna evidente cagione , ed abbattano interamente le forze dell' infermo . 2. Sono accompagnate da que' sintomi stessi , che si osservano nelle febbri calde , con questo divario , che non sopraggiungono nel solito tempo . 3. Gli esterni sintomi non hanno nulla , che abbia correlazion colla febbre ; per esempio la lingua ed il

C

pa-

palato sono aridi , ed infiammati , mentre il calor esteriore , il polso , e le crine sembrano esserè nel naturale loro stato . Questi sono i tre segni , che distinguono le febbri calde dalle maligne . Indipendentemente da questi altri ve ne sono , che indicano costantemente la malignità delle febbri continue . A cagion d' esempio , è un segno di malignità , se l' infermo nel corso di una febbre continua cade in un subico nell' abbattimento contro il suo solito , e senz' aver troppo caldo è assalito da un violento mal di capo , o sente acuti dolori nella spina del dorso e ne' lombi , i quali non si possono attribuire nè alla retrocessione di un umore artritico , nè alla soppressione del flusso menstruale o emorroidale , nè al calcolo delle reni . Lo stesso dicasi , se sovente si sente del freddo nella spina del dorso , se sopraggiunge un sudor passeggero in diverse parti del corpo , e se manda fuori dal naso alcune goccioline di sangue chiaro .

§. 2.

A ffinchè il leggitore possa meglio conoscere la natura di queste febbri , le ridurrò sotto le classi seguenti . Pongo nella prima le febbri maligne ordinarie e semplici , che non hanno in se medesime nulla di contagioso , e accompagnate non sono da veruna espulsione , ma provengono dalla cattiva cura d' una febbre calda , o cominciarono con la fiacchezza , e l' abbattimento . Nella seconda comprendo quelle , che si ritrovano nello stesso tempo complicate colle miſgliari , col vajuolo , &c. e che son contagiose . Queste sono di gran lunga più violente , e più maligne delle
pri-

prime . Nella terza metto le febbri epidemiche , che uccidono la maggior parte di coloro , che ne sono assaliti . Nella quarta poi pongo la peste medesima , la quale non è altro , se non il grado più alto d' una febbre maligna contagiosa , e che ha per principali sintomi ; indipendentemente dalla malignità della febbre , delle postume maligne nelle parti esteriori e glandulose , e dei furuncoli rossi e duri nelle parti carnose , che penetrano infino all' osso . Quanto è maggior nel principio d' una febbre maligna lo abbattimento , e quanto più sono pronti a manifestarsi i sintomi , come a cagion d' esempio il delirio , tanto più essa è pericolosa , massime quando la febbre sembra per se stessa piccola , se si riguarda la mediocrità del calore , e la debolezza del polso .

§ . 3.

IL metodo di curare queste sorti di febbri consiste 1. nel calmare l' infiammazione del sangue , e nel prevenire la putrefazion degli umori con rimedj rinfrescativi , anodini , ed antiseptici ; 2. nell' impedire nel corso della febbre la putrefazione del sangue coi rimedj più efficaci ; 3. nel rimettere le forze dell' ammalato . Ma prima di far tutto questo , bisogna esaminare , se la violenza della febbre , e la soverchia abbondanza di sangue , che impedisce la circolazion del medesimo , non esigono il salasso . Questo è assolutamente necessario in principio di tutte le febbri calde a cagione della infiammazione del sangue , e deve anzi replicarsi fino a due volte , allorchè il sangue è

còpperlo da una cortica bianchiccia , se pure il per-
mettono le forze dell' infermo .

§. 4.

SE l' ammalato fin dal principio della febbre
ha dei mali di cuore , delle nausea , e degli
sforzi di vomito , si farà quanto dissi nel Cap. V.
§. 5. ; e se è stitico , quanto indicai in esso Capi-
tolo al §. 4. Conciossiachè riesce assolutamente
necessario nell' uno e nell' altro caso di toglier
via le impurità , che possono essere nello stomaco
e negl' intestini , come una parte del fomite , che
nodrir può ed aumentare la febbre , e questo anzi ,
se è possibile , si dee fare innanzi alla cavata di
sangue .

§. 5.

DOpo aver salassato e purgato , come dissi ,
l' infermo , si passerà ai rimedj , ed alle po-
zioni agrette , onde ho detto doverfi far uso in
principio delle febbri calde . La sera gli si darà ,
in vece dell' emulsione del Cap. V. §. 2. , una
presa di polvere di Canfora sudorifica Cap. I. n. 3.
nella sua bevanda , la quale non dev' essere , che
acqua di fontana cotta , in cui si metterà dell'
aceo , e del miele , o del sugo di limone , op-
pure , quando si possa , si metterà nell' acqua
cotta d' orzo tante di spirito di vitriolo , o di
zolfo , quanto basta per darle un poco di acidez-
za , e si raddolcirà col zucchero . Beverà poi al-
ternativamente fra il giorno dello sciero di lat-
te , in cui si metteranno alcune goccioline d' ace-
to , o di sugo di limone .

§. 6.

§. 6.

ED ecco il metodo , che si deve osservare finchè dura la febbre , senza mutarvi nulla , se non che si useranno nelle febbri maligne rimedj , e pozioni più agrette , ed in maggior dose , che non si userebbero nelle febbri calde ordinarie . §. 7.

QUanto a' sintomi particolari , che sopraggiunger possono nel corso di queste sorte di febbri , bisogna trattargli non altrimenti che quelli delle febbri calde , e far osservare all' infermo la medesima regola . §. 8.

SE sopravviene un qualche nuovo tremito verso il tempo , in cui dette febbri maligne sono nel loro maggior grado di violenza , ed esso tremito è accompagnato da calore , da mal di capo , e da ansietà , egli è segno , che non tarderanno molto a manifestarsi le migliari ; e in questo caso si darà di due in due ore all' infermo una presa di polvere di Canfora , facendogli bere sopra molt' acqua cotta calda , e verso la sera , ed anche nella notte , lo spirito glaciale del Cap. I. n. 2. Gli si applicherà pure alla pianta de' piedi il lievito , di cui parlai nel Cap. VIII. §. 2.

○)------(○

CAPITOLO XX.

Della Febbre Migliare , e delle Migliari .

§. 1.

COSÌ vien detta questa febbre dalle pustulette , che vengono sopra la pelle , e dalle quali

C 3

- è accompagnata . Sono quelle da principio di un rosso alquanto chiaro , e grosse come la testa d'uno spillo . Si fanno queste veder prima sul petto , e nella giuntura del cubito , e finalmente sul volto , e per tutto il corpo . Prima che compaiano, l'infermo, oltre gli ordinarij sintomi delle febbri calde (Cap. IV.) è sommamente agitato , respira con difficoltà , ha una tosse asciutta , e si sente dei dolori violenti nel dorso e ne' lombi ,

§. 2.

Questa febbre, come pure la maggior parte delle febbri exantematiche , è semplice , o doppia . La prima si manifesta nel tempo stesso , in cui si manifestano le pustulette , e cessa immediatamente dopo che queste son venute a suppurazione . La seconda dura finchè spariscono le pustule . Entrambe sono una spezie di febbre calda , e deono per conseguenza annoverarsi tra le febbri continue . La prima procede da una materia acre fissata nella massa del sangue , la quale gettandosi alla cute , vi produce tante piccole infiammazioni , quante sono le pustule , e questa infiammazione è appunto quella , che produce la seconda febbre . Insensibilmente dette pustule si elevano in punta , pigliano un rosso oscuro , e rendono la pelle ruvida e secca . Si forma finalmente sulla loro estemità una vescichetta trasparente , che diventa poi del color della perla . Quando la circonferenza della pustula è rossiccia , e sparisce con esse e con la febbre , chiamasi Migliare rossa :

sa : se all' opposto è del color della perla , ed accompagnata dai sintomi d' una febbre maligna , chiamasi Migliare bianca ; e quest' ultima è pericolosissima .

§. 3.

LA prima non è pericolosa , purchè non si pecchi nei rimedj , o nella dieta : conciossiachè in tal caso la Migliare rossa è spesso seguita dalla bianca , massime nelle puerpere , delle qua' i parlerò in un Capitolo a parte .

§. 4.

LA migliare rossa sopraggiunge spesse volte verso la declinazione delle febbri calde , o infiammatorie , e così d' ordinario vanno queste a finire , quando non si è da principio cavato sangue a sufficienza all' infermo , e non si sono adoperate le pozioni e i rimedj in dose competente . La bianca per lo contrario non viene per lo più , se non infine di dette febbri , ed è accompagnata da' sintomi violentissimi (Cap IV, §. 3.) , quando si son praticati rimedj troppo caldi , o intempestivi .

§. 5.

LA migliare bianca è sempre preceduta dalla rossa , ed è di due spezie . La prima , che spesso tien dietro alla rossa , è meno maligna e meno pericolosa dell' altra ; le macchie sono accompagnate da una febbre men violenta , e sono più larghe e più visibili sulle braccia , sulle mani , e sulle gambe , che non sul volto , sul collo , e sul petto .

§. 6.

LA seconda specie di migliare bianca è di tutte la più pericolosa , e la più maligna . Le vescichette sono più piccole delle prime , più puntute , e della grandezza di un granello di miglio , vengono sul collo , sul petto , e in quasi tutto 'l corpo , e sono accompagnate da tutti i più violenti e più pericolosi sintomi d'una febbre maligna , ma con maggiore , o minore violenza , da delirio , da frenesia , da convulsioni , da difficoltà di dormire , da rossezza , e da aridità nella lingua e nel palato , da lagrime involontarie , da crudezza di orine , comechè sieno del color medesimo delle naturali , da sordità , da stridor di denti , da sudori freddi e transitorj in diverse parti del corpo , da uno sguardo fisso e fiero , dimanierachè può questa febbre riguardarsi come maligna al maggior segno , e dette vescichette bianche come altrettanti carboncini , i quali non solamente infettano l' epiderma , ma i visceri ancora .

§. 7.

LA febbre migliare ordinaria , in cui le macchiette rosse si manifestano nel modo , che dissi nel §. 1. e 2. , altra cura non esige , che quella di una febbre calda ; cioè uno o più salassi , quando la febbre è violenta , e vi ha troppa abbondanza di sangue . 2. Si deve far uso frequente ed assiduo delle pozioni agrette del Cap. II. §. 3. . 3. Si hanno da adoperare i rimedj resolutivi , anodini , indicati nel Cap. V.

§. 2.

§. 2. e 4. si deve osservare la stessa regola , che per le febbri calde si è prescritta .

§ 8.

Succede talvolta , che dette macchie rosse spariscono in un subito , e rientrano nel corpo prima del tempo prescritto ; in questo caso cresce la febbre , l' infermo cade nel delirio , risente dei dolori in differenti parti del corpo , rimane sopito , inquieto , e non respira , se non con difficoltà . Quando per lo contrario le macchie spariscono in quel tempo , in cui deggion farlo , si calma la febbre , si diminuiscono i sintomi , e l' ammalato gode un sonno tranquillo . Il primo accidente avviene , quando l' ammalato , essendo sudato , si raffredda all' improvviso , quando è agitato da qualche violenta passione , o quando adopera rimedj troppo caldi . In simil caso convien trargli alcune oncie di sangue dal braccio , o dal piede , allorchè il permettono le sue forze , o la febbre , l' ansietà , e i dolori sono violenti . 2. Gli si darà di tempo in tempo , in vece della polvere febrifuga anodina , quella di Canfora del Cap. I. n. 3. , senza omettere le pozioni tiepide ed agrette del Cap. II. §. 3. , e la sera lo spirito glaciale del Cap. I. n. 2. 3. Gli si applicherà alla pianta de' piedi l' impiastro di lievito del Cap. VIII. §. 2. , o quando i sintomi , come sarebbero il delirio , il sopore , i dolori di costa , &c. lo esigono , il vescicatorio del Cap. I. n. 10. alle due tempia , per attrarre al di fuori quanto più presto è possibile l' umor morbifico . Praticherassi lo stesso

C 5

nelle

nelle febbri calde ed infiammatorie, per esempio nella pleurisia, nella peripneumonia, &c. se mai vi fosse complicazione dell'una o dell'altra di queste spezie di migliari. Se poi i suddetti rimedj non giovassero in questa migliare maligna, si darà all'infermo quattro volte il giorno, ed anche più spesso, la polvere febbrifuga del Cap. I. n. 13. nel modo che dissi nel Cap. XIII. §. 4. , senza omettere le pozioni agiutte, e la regola, che preferissi per le febbri calde.

o)-----o

CAPITOLO XXI.

*Della Febbre Migliare, che s'pragiuunge
alle Puerpere.*

§. 1.

Questa febbre è molto comune nelle donne, ch'ebbero un parto difficile, o che ne' primi giorni del puerperio, si sono servite d'alimenti, e bevande troppo riscaldanti. Proviene anche spesso dalla soppressione dei lochii, o dall'infiammazione della matrice.

§. 2.

LA febbre, di cui parlo, assale improvvisamente queste tali donne con varj accessi di tremore, e di calore immediatamente dopo il parto, o nel terzo e quarto giorno, che è il tempo, in cui suole manifestarsi la febbre del latte; ma questa cosa in capo ad un giorno o due, dove la febbre migliare (Cap. XX. §. 1. e 2.) cresce di giorno in giorno, ed è accom-

pa-

pagnata dai sintomi d'una febbre calda, e bene spesso da quelli della febbre maligna.

§. 3.

QUando una donna, immediatamente dopo il parto, è affalita dalla migliare, dessi esaminare 1. se i lochii hanno avuto un corso regolato pendenti i primi otto giorni, oppure se si sono fermati, o diminuiti a segno di poter cagionare tal febbre. 2. Se gli sforzi, ch' essa fece nel partorire, non hanno prodotta un' infiammazione nel corpo, o nell' orificio della matrice; e questo si argomenterà dalla continuità della febbre, dai dolori, ch' essa prova nel basso ventre, e dalla difficoltà di urinare, e di andar del corpo. In questo caso il basso ventre si gonfia, e divien duro e teso, comechè vuoti sieno gl' intestini. 3. Se la puerpera non si è raffreddata, e non ha con ciò dato luogo alla interruzione del corso de' lochii. 4. Se le si sia data, prima o dopo del parto, come si usa frequentissimamente fra i contadini, qualche bevanda, o medicina calda e sudorifica, la quale le abbia infiammato il sangue. 5. Se non è alle volte rimasta nella matrice qualche porzione del secondo parto, la quale vi si sia corrotta; imperciocchè tanto questa, quanto le anzidette cagioni, bastano a destare una febbre migliare in un corpo già disposto ad una febbre infiammatoria per la violenza de' dolori sofferti nel parto.

§. 4.

IN caso che questa febbre sia prodotta dalla modicità, o dalla soppressione de' lochii, il

C 6

corso

corso de' quali dura per lo meno otto giorni, e consiste nei primi giorni in una ferocità sanguinolenta, che a poco a poco divien quasi bianca, e che va decrescendo in quantità; si piglierà tosto l'impiaastro emolliente del Cap. XII. §. 3., e dopo averlo mescolato con alquanto di zafferano, le si applicherà nel basso ventre; le si caveranno 10. o 11. oncie di sangue, ed anche più, dal piede, e si reitererà il giorno dopo il salasso fino ad una o due volte, massime se la febbre è accompagnata da delirio, e moti convulsivi. Le si darà di due in due, o di tre in tre ore nell'acqua cotta d'orzo lo spirito glaciale del Cap. I. n. 2., e si osserverà in ogni punto la regola, che prescrissi per le febbri calde. E' bene ancora metterle ogni giorno un serviziale, o due, simili a quello del Cap. 5. §. 4. §. 5.

SE la migliare sarà cagionata da lesione, o procidenza della matrice, cosa pericolosissima, e che si riconosce dalla continuità e violenza del dolore, dell'ardore, che l'inferma sente nel basso ventre, e dagli sforzi che fa per urinare o per andar del corpo, si principierà dal cavarle dieci o quattordici oncie di sangue dal braccio, e se il dolore continua, si replicherà il dì dopo il salasso fino a due volte. 2. Le si ungerà più volte il giorno il basso ventre con olio di camomilla, o di mandorle dolci caldo, e le si metterà mattina e sera, semprechè però non abbia veruna foccorrenza, il clistere del Cap. V. §. 4. Si può ancora, unto che le si sarà il ventre

tre, come ho detto, applicarvi sopra l'impia-
stro emolliente del Cap. XII. §. 3. . 3. Quanto ai
rimedj interni, ed alla dieta, si osserverà in tut-
to, ciò che si è prescritto nelle febbri calde .

§. 6.

SE proviene la febbre da improvviso raffred-
damento, e dalla ripercussione o retrocessio-
ne della traspirazione, si useranno i rimedj, che
ho indicati nel precedente Capitolo §. 4. , tanto
più che è d'ordinario accompagnata dalla di-
minuzione, o dalla total soppressione de' lochii.
Lo stesso è da farsi quando la migliare procede
dall'eccessivo uso, che si fece dei rimedj e delle
pozioni riscaldanti .

§. 7.

HO detto di sopra, che la migliare viene
spesso cagionata dal secondo parto, che o
tutto o in parte rimanga nella matrice, quando
egli viene a corrompersi, e nella terza parte di
quest'Opera suggerirò quanto dee farsi in tale
occasione .

§. 8.

OLtre le suddette cagioni, che produr pos-
sono la febbre migliare in una puerpera,
ed oltre i mezzi, che ho indicati per guerir-
nela, sonovi ancora due cose, le quali possono
prevenire questa spezie di febbre, o calmarla
dopo essersi manifestata . La prima si è la dieta,
la quale ha da essere esattamente simile a quella,
che la puerpera dovrebbe osservare, se avesse at-
tualmente febbre calda . Conciosiachè per quanto
felice sia stato il parto, egli è sempre seguito
dalla

dalla febbre del latte , che ogni menomo errore nella regola può far degenerare in una febbre calda pericolosissima . I Contadini Svizzeri credono , che bifogni dar da bere e da mangiare alle puerpere , per ristabilire le loro forze , e non niego , che questo metodo sia buono per alcune ; ma moltissime sono però quelle , che cadono in malattie gravissime , che le conducono al sepolcro . La seconda cosa , che si deve osservare , è di non tener così calda la puerpera , ch' ella debba sudare : non v' è cosa più pericolosa di questa , mentre il troppo calore , e la troppa traspirazione diminuisce il colamenro de' lochii ; questi si mescolano colla massa del sangue , e producono sovente in appresso febbri dannosissime . Il più sicuro si è il mantener l' inferma negli otto primi giorni suffeguenti al parto in un moderato calore , coll' ajuto delle pozioni anodine e dolcificanti , e di un nutrimento leggiero , affinchè colino i lochii per la via ordinaria .

o) ————— (a

CAPITOLO XXII.

Della Rosolia .

§. I.

SI dà il nome di Rosolia a certe macchie rosse somiglianti alle morsecchiature delle pulci , ma di un colore alquanto più oscuro , che s' innalzano sopra la pelle a segno , che sono sensibili al tatto . Più soggetti vi sono i fanciulli , che gli adulti . La Rosolia è benigna talvolta , e spesso fiata maligna , e pericolosa . La prima non è accompagnata da verun sinistro accidente , e

le sue macchie sono men rosse di quelle della seconda specie.

§. 2.

I segni e i sintomi ordinarij, che annunziano questa malattia, sono una fiacchezza e stanchezza generale in tutto il corpo, il mal di capo, l'inappetenza, le nausea, qualche volta il vomito, o il flusso di ventre, un'alternativa di freddo, di tremore, e di calore, i dolori nei lombi, nella spina del dorso, e nel collo, una tosse asciutta, il sopore, massime ne' fanciulli, che si risvegliano sbigottiti, le convulsioni e i moti convulsivi, gli occhi rossi, una lacrimazione continua d'un umor acre e pizzicante, i frequentissimi stentati. A misura che cresce la febbre, crescono altresì l'angoscia, il dolore de' lombi, la tosse, le nausea, ed il vomito, come pure l'arsura della bocca, e la sete, ed allora le macchie si fanno vedere nel terzo, quarto, o quinto giorno, prima sul volto e sulle braccia, e poi sul petto, sul dorso, sulle coscie, e sui piedi. Tosto che principiano a mostrarsi queste macchie, l'infermo si sente alquanto più tranquillo, benchè sopravvenga una nuova febbre. Continuano però la tosse ed il mal di capo colla medesima violenza, per modo, che gli spuri sono spesso tinti di sangue. Fra 9. o 11. giorni contando dal momento, in cui si fanno vedere dette macchie, crescono, maturano, e spariscono.

§. 3.

Accade talvolta, quando il veleno di queste macchie non esce fuori in quantità sufficiente,

te,

re, ch' egli si fissa in alcuno de' visceri, e vi produce una infiammazione mortale. Da principio egli si stabilisce nel polmone, o sulla pelle, che copre le coste, e cagiona una peripneumonia, ovvero una pleurisia, ed in questo caso convien adoperare la cura, che esigono queste malattie. Sovente egli suscita una tosse ostinata, che consuma l' infermo, o lo getta in una mortal tisichezza. Per calmarla deesi far uso per lungo tempo del rimedio indicato nel Cap. XVIII. §. 5.

§. 4.

L A Rosolia benigna, quando la febbre è piccola, e non accompagnata da verun cattivo sintoma, altra cura non esige per la sua guerigione, se non l' uso frequente dell' acqua d' orzo, di semola, e di riso, e la dieta delle febbri calde.

§. 5.

L A maligna richiede qualche cosa di più. 1. Convien da principio dare all' infermo, quando ha delle nausee e dell' inclinazione al vomito, una presa della polvere emetica del Cap. L. n. 5. nell' acqua tiepida. 2. Il giorno seguente, se la febbre è forte, gli si caverà sangue dal braccio o dal piede, e si reitererà la stessa operazione nel terzo giorno, se così esigono le circostanze. Se nel corso della malattia la materia morbifica velenosa venisse a produrre una pleurisia, o una peripneumonia, il che si riconoscerà dal tremito, e dal calore, che gli succede, dalla difficoltà di respirare, dall' ansietà,

CAPITOLO XXII. 65

fietà, &c., si trarrà di nuovo sangue all' ammalato, senza temere di far retrocedere le macchie, nè l'umore morbifico, perchè anzi all' opposto si farà meglio l'espulsione. 3. Si farà uso dei medesimi rimedj, e della medesima regola, che si prescrissero per le febbri calde. 4. Per calmare la tosse, si piglieranno due oncie di siroppo di bismalva, un' oncia di siroppo di seme di papavero, e mezz' oncia di fior di zolfo, che si mescoleranno ben bene insieme, e di tempo in tempo se ne daranno due cucchiari all' infermo. Non potendosi poi aver queste cose, gli si farà bere una maggior quantità d' acqua d' orzo, e di brodo, in cui si metterà la sera una presa delle goccioline febrifuge anodine del Cap. I. n. 4. Può altresì farsi uso, per calmare la tosse, d' una decozione composta con regolizia, radice di bismalva, fior di farfara, linseme, uva secca, fioraliso bianco, o mandorle dolci. 5. Innanzi che appaja la Rosolia, si farà che l' ammalato una o due volte il giorno tenga i piedi nell' acqua tiepida, per ammollare la pelle, ed agevolare l' uscita dell' umor morbifico. 6. Per calmare il bruciore degli occhi e del naso, si sciacqueranno spesso esse parti con acqua, o latte tiepido. 7. Se la Rosolia retrocedesse prima del tempo, converrà regularsi come dissi nel Cap. XX. §. 8.

§. 6.

Qualche volta, dopo essere sparite le macchie, e cessata la febbre, succede, che la tosse dura tuttavia; ma quand' anche non ve ne fosse

fosse più, deve l'ammalato tenere per qualche tempo una regola esattissima, a' tenersi dalle carni, dal vino, e dai licori spiritosi, e nutrirsi soltanto con brodi, frutta cotta, radici, erbe, e latte, bevendo sciero di latte bene sfiorato. Le persone poi, che sono agiate, e ricche, potranno valersi dell'acqua di Selz per ordinaria loro bevanda.



CAPITOLO XXIII.

Del Vajuolo.

§. 1.

Si dà il nome di Vajuoli a certe pustulette, le quali elevansi sopra la pelle, e racchiudono una materia putrida. Non consistono da principio, se non in macchiette rosse somiglianti alle morsecchiature delle pulci, ma alquanto più pallide, come nella Rosolia, nel mezzo delle quali scorgesi una piccola prominenza, che insensibilmente va poi crescendo, ed occupa tutta la macchia, convertendosi in fine in un' ulcera.

§. 2.

Distinguesi due spezie di vajuoli, il vero vajuolo, ed il falso. Il vero è quello, che testè ho descritto, ed è o discreto, o confluyente. Il vajuolo discreto consiste in pustulette acquose, le quali non hanno in se nulla di pericoloso, e si curano semplicemente con tener caldo l'infermo, e con dargli sovente alcune porzioni calde, e rinfrescative.

§. 3.

Questa malattia, dico il vero vajuolo, affale più spesso i fanciulli che gli adulti, il che però non fa, che questi non possano averla in età avanzata, e quando meno sel pensano. Si nota, che questa malattia osserva certi periodi, e che è più famigliare e più violenta in un paese ed in un tempo, che in un altro. Osservò lo Sidnham, ch'essa regna di cinque in cinque anni in Inghilterra, che è più pericolosa nel primo che nel secondo anno, e più in questo, che nel terzo e nel quarto. Diviene spesso epidemica in un luogo; affale i fanciulli, e gli adulti che ancora non l'ebbero, e tanto è maligna, che fa morire una quantità grande di persone, quando non è curata come si deve.

§. 4.

Sonovi molti fanciulli, a' quali dopo di aver fatti tutti i denti, viene il vero vajuolo senza febbre, e senz' alcun cattivo accidente, talchè non lo risentono quasi. Per lo contrario, il vajuolo discreto è accompagnato dai seguenti sintomi: da brivido, e tremore, che è immediatamente seguito da un ardentissimo calore; da mal di capo violento, e dolori nel dorso; da fiacchezza e lassitudine in tutte le membra, da sforzi per inghiottire e per vomitare, negli adulti poi, da sudori copiosi, da dolori nelle parti situate immediatamente sotto lo scrobicolo del cuore, da sopore e stupidità, massime ne' fanciulli, e da convulsioni, le quali annunziano, che è prossima a farsi l'espulsione, e che non avrà

avrà sinistre conseguenze . Dopo questi sintomi , che sopravvengono d'ordinario nel quarto o nel quinto giorno , dopo quello , in cui principia la malattia , s' incomincia ad enfiare il volto , si alterano le fattezze , e si coprono quà e là dalle macchie rosse , che dissi di sopra , e la febbre diventa alquanto più piccola . Queste macchie escono poscia sul collo , sul petto , e finalmente in tutte le altre parti del corpo , in maggiore o minor quantità . Le pustule crescono , divengono bianche , e finalmente gialliccie , e nell' undecimo giorno principiano a seccarsi sul volto , e quindi nelle altre parti del corpo , ed a cadere in tante croste , ed allora l' enfiagione , e l' infiammazione considerabilmente si sminuiscono . Chiamansi queste pustule discrete , perchè separate sono le une dalle altre , laddove nel vajuolo confluyente si uniscono esse insieme , si confondono , e si ammassano le une sopra le altre , il che lo rende assai più pericoloso del vajuolo discreto .

§. 6.

IL vajuolo confluyente è accompagnato dagli stessi sintomi , che vanno uniti al discreto , con questo solo divario , che più sono i sintomi violenti nel primo , e si manifestano fin dal secondo o terzo giorno . Maggiore si è la difficoltà d' inghiottire , più roca la voce , perchè maggiore si è la infiammazion della gola . Sopraggiunge per lo più negli adulti un flusso di bocca , e ne' fanciulli , che inghiottiscono la loro saliva , un flusso di ventre , o un vomito violento . Verso
l' or-

l'ottavo giorno la saliva diventa così vischiosa e tenace, che l'infermo stenta moltissimo a spurare: la notte poi se gli aumenta la febbre e la sete, e cade nel delirio. Le pustule sono assai più piccole di quel che sieno nel vajuolo discreto, e tanto contigue le une alle altre, che a misura, ch'esse van crescendo, si confondono insieme, coprono tutto il volto, o fanno gonfiare stranamente, e per modo che si attaccano insieme le palpebre, e le narici si turano. Nel crescere delle pustule molti sono assaliti da una violentissima tosse, da sputo sanguigno, e da flusso di sangue dal naso: altri da un' infiammazione di cervello, da una pleurisia, o da una peripneumonia, ovvero da una soppressione delle urine. Quando la malattia si termina felicemente, le pustule divengono pallide verso il nono, o decimo giorno, si ammassano nel mezzo, diminuisce la febbre, e così pure gli altri sintomi; si seccano poscia, e cadono le croste. Se queste cadono prima, e se crescono i sintomi, e sono accompagnati da freddo, da convulsioni, e da mali violenti di stomaco, l'ammalato corre gran rischio della vita.

§. 6.

A Vvien molto spesso, nel tempo in cui si credono finite la febbre e la malattia, che l'infermo si trova all'improvviso assalito da un nuovo accesso di febbre, e da un tumore doloroso in certe parti glandulose del corpo, massime dietro le orecchie, sulla nuca del collo, sotto le ascelle, nell'anguinaja, che viene a
sup-

suppurazione, e manda fuori una materia somigliante a quella delle pustule. Sopraggiunge questo accidente piuttosto dopo il vajuolo discreto, che dopo il confluyente, quando l'espulsione non si è fatta, come si dovea.

§. 7.

Queste due spezie di vajolo, tanto il discreto, quanta il confluyente, possono essere maligne in sommo grado, e contagiose. Tali sono quando vengono accompagnate dai sintomi del Cap. XIX. §. 1., o si trovano complicate colle migliari

§. 8.

IL vajuolo, quando è di buona specie, quando piccola è la febbre, e quando non è accompagnata da verun cattivo sintoma, non esige altra cura, se non la regola, che prescrissi per le febbri calde. 2. Se l'infermo si trova stitico, quando principia a manifestarsi, gli si darà il clistere del Cap. V. §. 4. 3. Per bevanda la pozione del Cap. II. §. 3., una infusione di melissa. o dell'acqua cotta di linseme, o dello sciero di latte, avvertendo che non istia troppo coperto, affinchè non si riscaldi oltre il dovere.

§. 9.

Quanto alla cura del vajolo, sia discreto, sia confluyente, che è accompagnato da febbre violenta, e da' sintomi pericolosi, si terrà quel metodo, ch' esige la natura della febbre, e de' sintomi. Se la febbre da principio è forte, si caverà sangue all' infermo dal piede, dopo averglieli fatti tenere per alcune ore nell'acqua tiepi-

tiepida, e gli si darà il clistere del Cap. V. §. 4. Se fin dal principio è assalito dal vomito, e si trova sollevato quando esso è cessato, bisogna un giorno innanzi al salasso, dargli 3. grani di polvere d'ipecacuana (tale essendo la dose conveniente ad un adulto) nell'acqua tiepida, oppure una presa della polvere emetica del Cap. I. n. 5. L'emetico in simil caso ha questo di buono, che sgombra una parte del veneno morbifico, il quale manterrebbe, restando nel corpo, ed aumenterebbe la malattia. Convien pure per la stessa ragione, fin dal principio della malattia mettere ne' clisteri, che si daranno all'infermo, alcuni cucchiari di miele, ed alquanto più di sale del solito per isgomberar gl'intestini, e nello sciero di latte, che prende la mattina, alcune oncie di manna. Si può altresì in caso di bisogno reiterare i detti clisteri, quand'anche principiasse a farsi l'espulsione, senza temere, che abbia perciò a retrocedere il vajuolo.

§. 10.

C Almarò in tal guisa negli adulti l'ardor della febbre col salasso, e sgomberare fin dal principio della malattia le impurità contenute nello stomaco, e negl'intestini, tanto de' fanciulli, quanto delle persone attempate, convien procedere alla cura ed alla guerigione della malattia nel modo seguente. 1. Si daranno all'infermo bevande attenuanti, rinfrescative, ed antiseptiche, come farebbe lo sciero di latte, le acquecorte d'orzo e di semola, ovvero l'acqua di fontana, in cui si metteranno alcune goccioline

ciòle di fugo di citrone , ed alcuni pizaichi di zuccaro , in vece d' affrettar l' espulsione , come in parecchi luoghi si suol fare , con rimedj e pozioni riscaldanti . Si può continuare l' uso di queste bevande attenuanti per tutto il corso della malattia . Rispetto a' fanciulli , che poppano ancora , si spopperanno , o si darà loro , dopo che avranno poppato , una pozione composta d' una parte di latte , e di tre parti di qualche acqua dolcificante , come farebbe a cagion d' esempio acqua di fior di tiglio , o di ciriegie , che si raddolcirà con un poco di zuccaro . 2. Quanto ai sintomi (e sotto questo nome comprendo tanto quelli , che proprj sono di questa malattia , quanto quelli , che sono ad essa comuni con le febbri calde , e de' quali ho favellato di sopra) , si procurerà di calmarli , o dissipargli , o di prevenirli .

§. II.

Diffi di sopra , che gli adulti sono assaliti fin dall' indomani del principio del loro male da un violento mal di gola , e da un flusso di bocca , e i fanciulli da un flusso di ventre , e che l' uno e l' altro sono pericolosissimi . Non v'è cosa migliore per fermare il primo , del dar sovente all' infermo le pozioni tiepide soprindicate , e di quando in quando un cucchiarino di miele , di siroppo di more , o di crespino , e quando principia il male , e massime verso il fine della malattia , quando la materia diventa spessa , e vischiosa , fargli sorbire il vapor dell' aceto per mezzo di un imbuto . Questo si è il rime-

rimed-

rimedio migliore, che possa nell' uno e nell' altro caso adoperarsi. Torna anche in acconcio il far alzar dal letto ogni giorno l' infermo per qualche ora, e il fare che la sua camera respiri l' aria, affinchè egli non fudi. Se sopravviene un flusso di ventre dopo essere uscite le pustule, il quale le faccia retrocedere, e sia accompagnato da qualche cattivo sintoma, gli si darà ogni giorno nel decremento della febbre una presa delle gocciole febrifughe anodine del Cap. I. n. 4. nell' acqua d' orzo.

§. 12.

SE le pustule, dopo di essere uscite, si ammassano, o provenga ciò da difetto di forze, o da qualsivoglia altra cagione, gli si applicherà alle due tempie l' impiastro vescicatorio del Cap. I. n. 10., e gli si darà di tre in tre ore nell' acquacotta, che beve, una presa della polvere di Canfora sudorifica del Cap. I. n. 3., ovvero gli si trarrà sangue dal braccio.

§. 13.

SE nel vajuolo confluyente, dopo che l' espulsione si è fatta nella maggior parte delle membra, l' ammalato cade in delirio, senza che nè il volto, nè il capo sieno molto gonfi, gli si caverà tutto sangue dal braccio, si farà alzare, gli si applicherà un impiastro vescicatorio alle tempie, e gli si darà verso la sera nell' acquacotta, che beve, una presa delle gocciole anodine antispasmodiche del Cap. I. n. 7. Se la mattina seguente prosiegue a delirare, gli si darà mattina e sera una presa di dette gocciole

D

con

con parecchie tazze d'acquacotta , e si farà stare fuori del letto più che sarà possibile .

§. 14.

IN caso di stranguria , si farà alzare dal letto tosto l'ammalato , e gli si faranno fare alcuni giri per la camera : questo è il più pronto , e più sicuro rimedio , che si possa in tal caso adoperare .

§. 15.

SE , come spesso avviene , gli occhi e le narici si turano , cosicchè non possa vedere , e sia costretto respirar per la bocca , il che riesce di gravissimo incommodo , gli si bagneranno più volte il dì dette parti con acqua tiepida , o sciero di latte , per distaccare la crosta , che si è formata; e se si formano altre pustule , si foreranno colle forbici , venute che saranno a maturità , e si asciugherà la putredine con un panno lino .

§. 16.

SE nell' undecimo o duodecimo giorno sopravvenisse un nuovo accesso di febbre , e si elevarono delle nuove pustule sopra la pelle , bisognerà immediatamente , se l'età e le forze dell'infermo il permettono , trargli sangue dal braccio , e dargli mattina e sera nell' acquacotta una presa delle goccioline anodine del Cap. I. n. 7.

§. 17.

SE dopo seccata la maggior parte delle pustule , si formano dietro le orecchie , o sul collo , o in altra parte visibile del corpo dei tumori , i quali degenerino in ulcere , si cureranno , come ho detto nel Cap. IV. §. 7.

§. 18.

§. 18.

SI terrà in questa malattia la stessa regola, che nelle febbri calde. Gli alimenti, e le bevande dell' ammalato non devono in altro consistere, salvo in acqua d' orzo e di semola, in frutta agrette cotte, sciero di latte, o acqua-cotta d' orzo, in cui si metteranno alcune goccioline di spirito di vitriolo. Più volte il giorno si apriranno le finestre della camera per rinnovar l' aria, si rifarà il letto all' infermo, e gli si muteranno i panni lini. Dal terzo o quarto giorno, l' ammalato non deve più star coricato in letto tutto il giorno, se pure non vi è costretto dalla necessità. Deve astenersi massimamente da ogni rimedio caldo e sudorifico, ed usare frequentissimamente le pozioni, che accennai, per attenuare il sangue, e renderlo più fluido.

§. 19.

GLi adulti, che hanno la pelle più compatta, dura, secca, e spessa, possono fin da principio, e prima che compajono le macchie, e dopo di essersi purgati con alcune oncie di manna nello sciero di latte, o con una presa del Sal glaciale del Cap. I. n. 9. nell' acqua tiepida, quando hanno dei mali di cuore, e degli sforzi di vomito, bagnarsi ogni mattina sino alle anche nel latte e nell' acqua. Quanto a' fanciulli, si farannò loro bagnar i piedi due volte nell' acqua tiepida, per dilatare i pori della pelle, ed impedire che il sangue, e il veleno morbifico non concorrano in appresso al capo.

D 2

§. 20.

§. 20.

CInque, sei, o sette giorni dopo che sono seccate le pustule, e cadute le croste in tutte le parti del corpo, si deve principiare a purgar l'ammalato per alcuni giorni consecutivi, prima ch'egli esca e ripigli il solito tenore di vita. Si farà perciò uso del purgante del Cap. I. n. 6, o di quello del n. 9. ; o se così vuol l'ammalato, si comporrà un purgante di un quarto d'oncia di rabbarbaro, mezz'oncia di foglie di fena, due oncie di foglie di rose damaschine, ed un'oncia di tartaro preparato, che si faranno bollire in una pinta d'acqua fino a diminuzione della metà. Un adulto potrà prenderne ogni mattina una o due chicchere, e bervi sopra del brodo liscio.

§. 21.

PEr cancellare, o diminuire i segni, che il vajuolo confluyente lascia ordinariamente dopo di se, e che sfigurano il volto, si può, dopo caduta una parte delle croste, andar bagnando quelle che rimangono con acqua tiepida, e poi toglierle via, ed applicar sulla parte l'impiaastro della Regina Maria Enrichetta d'Inghilterra, o altro più semplice preparato con olio di mandorle dolci, spermaceto, e cera vergine, che si avrà cura di rinnovare ogni giorno. Ma è cosa più sicura, quando le pustule principiano a seccare, di distaccarle per mezzo della seguente composizione, a fine d'impedire, che la putredine in esse contenuta non penetri nella pelle, e non la roda. Facciasi bollire un mezzo pugillo

gillo di radice di bismalva , ed un pugillo di mandorle dolci pelate in una pinta di sciero di latte fino alla consumazione del terzo , si coli il tutto a traverso d' un pannolino , si lasci divenir tiepido , e poi se ne bagni di quando in quando il volto . Sogliono avviluppate con un panno lino le dita a' fanciulli , per impedire che non si graffino la pelle .

CAPITOLO XXIV.

Della Febbre Scarlatina , e della Febbre Orticata .

§. 1.

T Ragge questa febbre il suo nome dalle macchie rosse come lo scarlatto , che vengono sopra la pelle . Da principio non sono più grandi di quelle della Rosolia , se non che non sono elevate , e si vanno insensibilmente allargando tanto , che finalmente confondonsi insieme , e non formano più , che una macchia sola di un rosso sommamente carico .

§. 2.

Questa febbre , come la maggior parte delle altre , si manifesta col tremito , e col calore , con dolori violenti nel dorso , e talvolta nelle braccia e nelle gambe , che non sono meno aspri di quelli del reumatismo ; gravezze e mali di capo ; alterazione , e calore ; e quando violenta è la febbre , vien accompagnata dai sintomi medesimi , che si osservano nella febbre calda . Qualche fiata pure , massime ne' fanciulli , sopraggiungono convulsioni , non altrimenti

D. 3.

che

che nel vajuolo , prima che si faccian vedere le macchie .

§. 3.

Queste macchie, le quali non sono, se non un' infiammazion della pelle, non così tosto principiano a comparire , che sopravviene una nuova febbre , come succede in tutte le altre malattie curanee , la quale è per lo più accompagnata da sintomi violentissimi , e pericolosissimi , che durano fino al decimoquarto giorno , ove però qualche giorno prima non sopraggiunga una crisi pei sudori , pel sonno , o per le orine . Comunemente verso il giorno ventiquattresimo le dette macchie diventano alquanto più pallide , e si distaccano le croste large come la mano , e più .

§. 4.

Quando chi ebbe la febbre scarlattina si espone troppo presto all' aria , anche dopo seccata la maggior parte delle macchie , egli viene assalito da un nuovo accesso di febbre , la quale non è nè men forte , nè men pericolosa della prima ; se gli gonfia tutto il corpo con dolori acutissimi , dimanierachè muojono infinitamente assai più persone di quest' ultima febbre , che non della prima ; e spesso volte que' pochi , che pur la scappano , caggiono nella tifichezza , e nella confunzione .

§. 5.

Questa febbre scarlattina assale più di rado i bambini , che poppano , e gli adulti , che non i fanciulli dall' età di sei anni fino ai quindici .

dici. I vecchj tutti possono soggiacervi, ed essa regna d'ordinario in sul finir della state, e in sul principiar dell'autunno.

§. 6.

E fige questa febbre quella stessa cura, che la Rosolia maligna (Cap. XX. §. 5.), e soprattutto replicati salassi. Svanita poi la febbre, e dissipate interamente le macchie, deve l'infermo starsene ancora per qualche tempo nella sua camera, astenersi dalle carni, o mangiarne pochissimo, e bere per qualche tempo ogni mattina dello sciero di latte dolcificato a misura della sete che avrà, ed a suo beneplacito. I ricchi anderanno bevendo dell'acqua di Selz con un terzo di latte per prevenire le ricadute.

§. 7.

SE sopraggiunge una nuova febbre oltre la prima, come dissi nel §. 4., si caverà di nuovo sangue all'ammalato, una, due, e più volte, se bisogna, e si osserverà lo stesso metodo, che nella febbre calda, insinattanto che si termini per via di copiosi sudori, e di un'abbondanza di urine spesse, come succede per la più.

§. 8.

LA febbre Orticata è una specie di febbre, che nel terzo o quarto giorno si manifesta con l'uscita subitanea di certi piccoli tubercoli di color rossiccio sul volto, sul petto, sulle braccia, i quali però non diventano mai più oscuri, e rassomigliano a punture di ortica. L'ottavo, il duodecimo, ed il decimo quarto giorno, in

qualunque modo sia seguita l' espulsione , o prontamente , o lentamente , principiano essi a decrescere , ed a distaccarsi in forma di croste , e lasciano nel luogo , in cui erano , una macchia gialliccia . La febbre è sovente piccola , e poco pericolosa ; spesso ancora è violenta , e mette l' infermo in pericolo della vita . Nel primo caso , altro non si dee fare , finchè essa dura , se non far osservare all' ammalato esattamente la regola , che prescrissi per le febbri calde : nel secondo si adoprerà lo stesso metodo , che per la Rosolia (Cap. XXII. §. 5.) , e specialmente la cavata di sangue , i rimedj , e le bevande attenuanti , i lassativi , senza trascurare i sintomi , che le sono comuni colle febbri calde ordinarie .

o)-----o)

CAPITOLO XXV.

Della Rispola , o sia Infiammazione della Cute .

§. 1.

Alter non è la Rispola , che un' infiammazione più o meno grande dell' epiderma . Quando penetra molto addentro nella pelle , suole appellarsi col nome di flemmone , e non è questo se non un maggior grado di un' infiammazione , che precedette , e che fu mal curata . La Rispola non sopravviene qualche volta , salvo in una parte sola del corpo ; ma per lo più dopo aver lasciata una parte , passa in un' altra .

§. 2.

LA Rispola , come il flemmonè ancora , è sempre accompagnata da una febbre conti-

tinua. Questa però non è tanto forte nella prima, quanto lo è nel secondo, perchè l'infiammazione è meno violenta. Accade spesso, che la Rispola ordinaria si converte in flemmone, quando si trascura da principio il salasso, o si fa uso di sudorifici troppo violenti, o si adoprano impiastri ripercussivi. Basta una Rispola trascurata a produrre un delirio, una schinanzia, una pleurisia, un'infiammazione del basso ventre, degli occhi, delle orecchie, e perfino violentissime convulsioni.

§. 3.

Non passando tra la Rispola, e il flemmone altro divario, se non se quello della maggiore, e della minore infiammazione, esige la loro cura, 1. che si cavi sangue all' infermo una, o due volte, ed anche più, e più spesso per lo flemmone, che per la rispola, massime quando il sangue riman coperto d'una cortica bianca: 2. che si dia all' ammalato il clistere del Cap. 5. §. 4. : e 3. che gli si prescrivano i rimedj, e la dieta, che indicai per le febbri calde.

§. 4.

I Sudorifici, e i ripercussivi sono in questa malattia assai nocevoli. Possano adoperarsi varj topici per calmaré l'infiammazione; ma bisogna avvertire di togli via quando son troppo umidi, affinchè non raffreddino la pelle. Se l'infiammazione è in sito visibile, potrà di quando in quando farlesi con acqua calda, o con latte un fomento, e poi mettersi sopra

una salvietta calda. Si può altresì accendere in una scodella dell'acquavita d'ottima qualità, e smorzata che sia, bagnarvi dentro un pezzo di flanella, spremerla, ed applicarla alla parte offesa.

§. 5.

Accade sovente, che per le anzidette cagioni la risipola degenera in un flemmone, il flemmone in un'ulcera, e questa in un buco nella pelle, o in una cancrena incurabile, come vedrassi là, dove tratterò della cancrena fredda, e secca.

o)-----o

CAPITOLO XXVI.

Della Febbre Petecchiale.

§. 1.

La febbre petecchiale è una febbre maligna, e pericolosa, accompagnata da macchiette, grandi a un di presso come quelle della Rosolia, ora rosse, ora gialle, ed ora del colore del piombo. Queste non s'innalzano mai, ma rimangono piane, e quel ch'è più, le ultime pajono incavate nel mezzo, e degenerano in un'ulcera nericcia, che si può con ragion riguardare come una vera cancrena. Le macchie, che da principio sono rofficie, e che tali si conservano fin verso il quattordicesimo giorno, sono meno pericolose delle gialle, e delle piombate.

§. 2.

Questa febbre, che per se stessa è malignissima, vien prodotta dalla dissoluzione, o
pu-

putrefazione del sangue, e degli umori. E' spesso epidemica, e principia, come le altre febbri maligne, con una fiacchezza, ed un abbattimento generale in tutto il corpo, senza che se ne possa indovinar la cagione, col tremore, e col freddo nel dorso, a cui succedono sudori vaghi, e transitorj, ed un violento mal di capo. La febbre è piccola, il polso, e l'orina sono nello stato lor naturale, se non che talvolta quest'ultima è un poco torbida. Sopraggiunge il mal di capo, e l'ammalato cade in varie specie di delirio. Ad alcuni vengono giù dal naso alcune goccioline di sangue pallido, e disciolto, alle femmine dalla vagina, e ad altri escono per l'ano dei vermini morti. Nel quinto, nel sesto, o nel settimo giorno sopraggiungono delle macchie sul volto, sul petto, sul collo, sulle braccia, sulle coscie, e sulle gambe, le quali macchie sono da principio alquanto più rosse di quelle della Rosolia, ed alquanto più pallide di quelle delle migliari.

Richiedesi a questa febbre la stessa cura, che alla febbre migliare, di cui ho parlato di sopra, e specialmente deve l'infermo bere molta acquacotta calda con lo spirito di vitriolo, ed il sugo di limone, e la sera deve prendere la polvere di Canfora, e lo spirito glaciale. In caso di mancamento di forze, e di svenimento, si darà di quando in quando all'ammalato uno, o due cucchiari di vino.

D 6

CA-

§. 1.

COSÌ appellansi queste febbri, perchè procedono dalla corruzione degli umori, la quale si comunica al sangue, o dalle impurità, che si ritrovano nello stomaco, e negli intestini.

§. 2.

SI manifestano con una lassitudine in tutte le membra, dolori che si fanno sentire alcuni giorni prima, cattivo umore, e vomito spesse volte, tremore, calore, aridezza, ardore, amarezza, e fucidume della bocca. L'infermo è affalito da violento mal di capo, e da dolori nel dorso, e stenta molto a prender sonno. La violenza della febbre va crescendo di giorno in giorno, il corpo divien secco, e le carni cocenti, e il mal di capo, e di stomaco si aumenta. L'orina è di un rosso carico, quando vi è molta bile nel sangue; quando no, è cruda, poco abbondante, e poscia torbida. Molti sono fitici; altri non vanno del corpo se non con molti sforzi, ed anche in assai piccola quantità; parecchi sono fin dal principio della malattia affaliti da un violento vomito, e flusso di ventre, le di cui materie hanno un odore cattivissimo, il che non è però un sinistro segno.

§. 3.

LA sera si aumenta la febbre, e la mattina decresce, ma quando è violenta, si distingue appena questo decremento. L'infermo cade

tade in delirio, gli divien nera la lingua, come altresì il palato, cresce l'alterazione, il polso diventa debole, e frequente, e così pure il respiro, le feci, e l'orina escono con difficoltà, e mandano un fetore insopportabile; si gonfia il basso ventre, si tende, e quando la malattia ha da essere mortale, sorgono in diverse parti del corpo, e massime sul petto, e sul collo, delle piccole macchie nericie, o piombate. L'ammalato viene allora sorpreso da convulsioni, e sudori freddi, e transitorj, e da ansietà violentissime di stomaco.

§. 4.

LA durata di questa febbre non è sempre la medesima, durando in alcuni sette, nove, e quattordici giorni, e in altri diciotto, e ventuno, e spesso volte ancora di più. Termina d'ordinario in uno dei detti giorni per via di sudori abbondanti, d'orine copiose, spesse, e ben cotte, si sminuiscono i sintomi, che abbiám detto, l'infermo ricupera il sonno, e a poco a poco le sue forze.

§. 5.

Accade molto spesso in questa febbre, che la materia acre, e putrida, che si è fissata nel sangue, si getta su certe parti, e vi produce un'inflamazione, la quale si manifesta per via dei dolori, che ivi costantemente si sentono.

§. 6.

LA cura di queste febbri richiede, che quando si hanno delle impurità nelle prime
stra-

strade , il che si arguisce dai mali di cuore , dall' amarezza della bocca , e dal vomito , si dia tosto all' infermo di tre in tre ore 10. grani di sale ammoniaco , mescolato con egual dose di nitro , o una presa dell' essenza febrifuga sudorifica del Cap. I. n. 2. nell' acqua-cotta , che beve . 2. La mattina seguente , quando sarà diminuita la febbre , gli si darà 30. grani di polvere d' ipecacuana (notisi però che questa dose convien solo agli adulti) , oppure una presa della polvere emetica del Cap. I. n. 5. nell' acqua tiepida . Se questa prima dose non opera sufficientemente , e se si dubita che sieno rimaste nello stomaco altre materie , gli sene darà una seconda dopo alcune ore . Si proseguirà a fargli prendere l' essenza febrifuga , o la polvere di sale ammoniaco , fino alla mattina del secondo giorno , aggiugnendovi fino a due , o tre prese della polvere emetica , se continuano , massime i mali di cuore . 3. Purgato che si farà in tal guisa l' infermo , piglierà di quattro in quattro ore una presa dell' essenza febrifuga nell' acqua d' orzo , e vi bevverà dietro dello sciero di latte caldo , o alcuna delle decozioni del Cap. II. §. 3. per prevenire la putrefazion degli umori , e procurarne l' evacuazione per via de' sudori , e delle orine ; e queste decozioni quanto più saranno agrette , tanto maggior effetto produrranno . 4. Riesce proficuo tanto in principio , quanto nel corso della malattia , far uso del clistere del Cap. V. §. 4. , o di altro composto solo di sciero di latte ,

latte, per mantenere il ventre libero, ed estrarre le imputità, che possono esser rimaste nelle prime strade. 5. Se la malattia è accompagnata da alcuno di que' sintomi, che sopraggiunger sogliono nel corso delle febbri calde, vi si rimedierà, senza violar punto la regola, che prescrissi per queste febbri, finchè l'ammalato sia del tutto guerito.

§. 7.

L' Ammalato userà poscia la precauzione di mangiar poca carne, e di bere per qualche tempo ogni mattina a digiuno mezza pinta di sclero di latte.

o) ————— (o

CAPITOLO XXVIII.

Delle Febbri Intermittenti, o Fredde.

§. 1.

Dissi di sopra le febbri fredde, o intermitten-
tenti esser quelle, che dopo essere principiate col tremito, e col freddo, si terminavano poi col calore, e con sudori abbondanti, i quali, dopo aver durato qualche tempo, diminuivano, o cessavano per intervalli, per ritornar poscia come prima.

§. 2.

Tre sorte vi sono di febbri intermittenti, la quotidiana, la terzana, e la quartana, le quali sono semplici, o doppie. La quotidiana sopravviene ogni giorno, e dura solo alcune ore. La terzana viene nel primo e nel terzo giorno, e cessa nel secondo. La quartana sopravviene nel primo, e nel quarto, e lascia

scia nei due giorni di mezzo libero l'ammalato. La terzana doppia è quella, il di cui primo accesso corrisponde al terzo, ed il secondo al quarto, e così gli altri. La quartana doppia è quella, che sopraggiunge per due giorni consecutivi, cessa il terzo, e ritorna il quarto.

§. 3.

HAvvi in tali febbri questo di maraviglioso, che d'ordinario ritornano in quell'ora medesima, in cui principiarono. Ad alcuni sopravviene il nuovo accesso un' ora prima, e ad altri un' ora più tardi, dimodochè si può dopo i due primi accessi predire il tempo, in cui ritorneranno. Il primo accesso di queste sorte di febbri è sovente violento del pari, che quello d'una febbre calda, a segno tale che il febbricitante cade nel delirio.

§. 4.

REgnano le febbri terzane per lo più nel principio della primavera, e le quartane nell'autunno. Si le prime, come le seconde sono comuni in parecchie contrade dell'Europa, ma più nelle une, che nelle altre, e specialmente ne' paesi bassi, paludosi, e vicini al mare, dove fanno spesso molta strage.

§. 5.

LA cura di queste febbri consiste, 1. in attenuare la materia febbrile, ed in renderla fluida per via di rimedj attenuanti ed aperitivi, ed in rintuzzare il veleno, che la produce: 2. in estrarla in tempo dal corpo con purganti, o coll'emetico: 3. in restituire a' nervi la

la forza, che hanno perduta, coll' uso de' corroborativi, e degli anodini.

§. 6.

T Oltochè un uomo si trova affalito da alcuna di queste febbri, egli deve osservar la regola, che prescrissi per le febbri calde, e prendere di tre in tre ore una presa dello spirito glaciale del Cap. I. n. 2., o della polvere febbrifuga anodina del n. 1., in una infusione di camomilla, di melissa, o in altra pozione anodina, bevendovi dietro qualche cosa di caldo. 2. Se l' infermo ha mali di cuore, o vomiti, converrà, dopo che avrà per alcuni giorni fatto uso dei detti rimedj, dargli la mattina a digiuno, e nel giorno d' intervallo, una presa della polvere emetica del Cap. I. n. 5. nell' acqua tiepida. 3. Farà poscia uso per alcuni giorni dello spirito glaciale, o della polvere febbrifuga anodina, dopo del che gli si darà nuovamente una seconda presa della polvere emetica. 4. Dopo quattro o sei accessi di febbre, bisogna, prima di fissarla del tutto, dargli nel giorno d' intervallo, ed a digiuno, una presa della polvere purgativa del Cap. I. n. 6. 5. Dopo il quinto o il sesto accesso, trovandosi come ho detto purgato l' infermo, gli si darà il primo giorno, di tre in tre ore, una presa della polvere febbrifuga del Cap. I. n. 13. nell' acqua tiepida, o nel Tè. Il secondo giorno di quattro in quattr' ore. Il terzo due prese la mattina, ed una il dopo pranzo. La febbre cesserà fin dalla prima, o dalla seconda presa. Ma per

per impedire ch'essa non ritorni, ed affinchè l'infermo si ristabilisca quanto prima in salute, bisogna ancora che ne faccia uso per alcuni giorni. Questa polvere può darsi in un siroppo, che abbia alquanto dell'agretto, o in qualche conserva, per toglierle il cattivo gusto che ha, ed impedire che non ributti chi la prende.

§. 7.

ANche dopo cessata del tutto la febbre, deve l'infermo starsene per qualche tempo in regola, ed astenersi dagli alimenti freddi, grassi, e difficili a digerirsi, dal pesce, dai latticini, e da tutto ciò, che genera della pituità. Deve in oltre schivare i luoghi umidi, e fare ogni giorno un moderato passeggio.

§. 8.

SE non volessero alcuni valersi dei rimedj sopracennati, potranno ai medesimi sostituire i seguenti, i quali egualmente caccieranno via la febbre. 1. In vece della polvere febbrifuga, e dello spirito glaciale, gli adulti prenderanno di tre in tre ore 15. grani di sale ammoniaco, mescolato con egual dose di nitro, nell'acqua d'orzo, o in alcun altro de' veicoli indicati di sopra. 2. In vece della mia polvere emetica, prenderanno nel tempo indicato da 30. in 40. grani d'ipocacuana in polvere nell'acqua tiepida. 3. In vece della mia polvere purgativa, faranno bollire mezz'oncia di foglie di senna, un quarto d'oncia di rabbarbaro, un pugillo di foglie di rose damaschine in una foglietta, e in un settier d'acqua fino alla consumazione della

CAPITOLO XXVIII. 91

della metà, e colata questa decozione, vi stempereranno dentro mezz'oncia di manna, e un'oncia di siroppo rosato. A questo purgante possono anche sostituirne altri, come giudicheranno più a proposito. 4. E in vece di servirsi della mia polvere febrifuga, si serviranno di quella della scorza di Chinachina.

o) ————— (o)

CAPITOLO XXIX.

Delle Febbri Continue.

§. 1.

Generalmente parlando, non vi ha se non tre forte di febbri continue, e sono quella che accompagna la pulmonia, la febbre cachetica, e la febbre etica. Delle due prime parlerò nell'Articolo della polmonia e della Clorosi, e solo della febbre etica tratterò nel presente.

§. 2.

LA febbre etica è una febbre quotidiana continua, che dura spesso più mesi, consuma, e disecca tutta quanta l'abitudine del corpo, e roglie totalmente le forze, senza che vi sia alcun interno tumore. Molte volte è ereditaria, e proviene da una perdita notabile di sangue, o da dissipazione degli spiriti vitali, a cagion d'esempio dal troppo usar colle donne, dalle veglie eccessive, dagli affanni, &c. Talora è una conseguenza di altra malattia, come a dir farebbe di una febbre calda non ben curata, d'una prematurata retrocessione d'una febbre fredda, della melancolia, della frenesia, d'un' ostru-

o rruzione nel fegato , nella milza , nel pancreas , &c.

§. 3.

PAre da principio , che non si debba quasi por mente a questa febbre , tanto sono leggieri i suoi accessi . Pure coloro , che ne vengono affaliti , principiano insensibilmente a divenir magri , ed a perdere le forze loro , e l' appetito ; ed ogni menomo moto gli rende stanchi . Hanno la pelle secca , e tesa , frequente il polso , e debole , massime dopo avere mangiato . Quando essa dura per qualche tempo , sopraggiungono loro sudori abbondanti verso lo spuntar del giorno , che molto gl' infievoliscono , cresce il calore del corpo , ed è seguito dal freddo , e dal tremito , non altrimenti che nella febbre catarrale ; si affossano gli occhi ; il volto perde la sua grassezza , si allungano le unghie , e diventano pallide , e puntute . Molti allora vengono affaliti da un flusso di ventre , si aumentano i sudori , e l' infermo finalmente se ne muore di debolezza e di consunzione .

§. 4.

LE indicazioni curative sono 1. di dare all' infermo bevande , che gli conservino l' umido , e nel tempo stesso arrestino i progressi della febbre : 2. di fortificarlo con rimedj ed alimenti opportuni , ed acconci a ristabilire il balsamo del sangue : 3. di calmare i diversi sintomi , ond' è accompagnata la febbre , massime i sudori , e di fargli cessare .

§. 5.

§. 5.

QUanto alla prima indicazione, io consiglio coloro, che vengono assaliti da questa febbre, di ridursi senz' indugio alla dieta bianca, e di non bere altro ch'è latte, o sciero di latte. Se la febbre fosse forte, sarebbe assai migliore lo sciero di latte, che non il latte medesimo, salvochè si mescolasse questo in egual dose con acqua di Selz, di Schuvalbach, di Pyrmont, di Spà. Il migliore latte, dopo quello d'asina, è il latte di vacca; gli altri sono troppo grassi, e troppo pesanti. Convien berne per lungo tratto di tempo la mattina a digiuno, e prenderne mezza pinta, ed anche tre fogliette nello spazio di alcune ore. Il latte così mescolato coll' acqua di Selz, o altra, che sia alquanto agretta, è infinitamente salutare in questa malattia; anzi soggiungerò, che l' acqua nostra di Veissenburgo, mescolata con un' eguale quantità di latte, è un balsamico mirabile, come è stato sperimentato da moltissime persone.

§. 6.

IL miglior nutrimento, di cui si possa far uso in questa malattia, sono i brodi d' orzo, di riso, e di tritello di vena. Quando la febbre non è molto forte, vi si può far cuocere dentro una giovane pollastra, o un poco di carne di vitello. Vi si possono aggiugnere l'erbe, e le radici per far minestre, le frutta cotte, le piccole trotte cotte nell' acqua con un po' di sale, e di persimolo, i latticini, le poltiglie fatte con latte, zucchero, e mandorle.

L' in-

L' infermo può valersi per ordinaria bevanda di acqua di Selz, di Veiffenburgo, o d' un' acqua-cotta di radice di china. Può bere nell' andare a letto un' emulsione di mandorle dolci, ed usarne a discrezione.

§. 7.

N Ulla tanto giova a ristabilire le forze, quanto la polvere febrifuga contro le febbri fredde del Cap. I. n. 13. Quando si sarà bevuto per quattordici giorni il latte, ed offervara la regola prescritta di sopra, se ne piglierà una presa nell' acqua d' orzo, o nello sciero di latte, e in caso che questo rimedio riesca disgustoso, si piglierà la stessa dose di polvere di scorza di china.

§. 8.

I Bagni d' acqua tiepida sono eccellenti per rinfrescare, e fermare i sudori. L' infermo ne farà uso ogni mattina in quell' ora, in cui essi sogliono venire: starà nel bagno un' ora, finchè l' acqua si raffreddi del tutto, e poi si porrà di nuovo a sedere in letto, o passeggerà per la sua camera. Io gli consiglio pure per la medesima ragione, tostochè sarà un poco calmata la febbre, di salir a cavallo, o in carrozza, purchè lo faccia sempre a digiuno.

§. 9.

Q Uando l' ammalato si riduce alla dieta bianca, conviene che la interrompa di otto in otto giorni, o di dieci in dieci, e che lasci due giorni d' intervallo, prima di ritornarvi, per ovviare che non si ammassi nello stomaco
una

una quantità troppo grande di parte buttirosa. Può altresì purgarsi, ove gli aggradi.

§. 10.

IN caso, che si valga della polvere febbrifuga col latte, deve parimente d'otto in otto giorni interromperne l'uso per sei giorni o otto, e ripigliarla poscia, senza cessar frattanto di prendere ogni mattina il suo latte.

§. 11.

SPesso interviene, che lo sciero di latte cagiona un flusso di ventre. In questo caso, convien lasciarlo per alcuni giorni, e prendere la polvere nel brodo sopra mentovato.

§. 12.

SE la febbre procede da altre cagioni, come per esempio da debolezza, da dissipazione degli spiriti vitali, da qualche perdita di sangue, dopo che uno se ne sarà accertato mediante la lettura del §. 2. si terrà quel metodo, che dirò a suo luogo. Per esempio si disaminerà, se essa non è forse cagionata dall' ostruzione del fegato, della milza, del pancreas, o dalla retrocessione della rognà.

o) ————— o

CAPITOLO XXX.

Dell' Infiammazione del Cervello, ossia della Frenesia.

§. 1.

LA frenesia è un' infiammazione di certe parti del cerebro, e delle sue meningi, accompagnata da una febbre acuta, e da un turbamento di spirito, che fa, che l'ammalato non può stare tranquillo nè in letto, nè fuor del letto,

letto, e grida, minaccia, e mena le mani. Egli è afflitto da una continua veglia, o se dorme alcun poco, si risveglia non men turbato di prima; piange, canta, parla inconsideratamente, e non risponde alle interrogazioni, che gli si fanno. Ha gli occhi rossi, e scintillanti, or asciutti, ed ora umidi; nera la lingua, ed arida; si duole continuamente, e getta profondi sospiri; ad alcuni sopravviene il sangue dal naso, o un tremor nelle mani, l'orina sua per lo più è rossa, poco pesante, e divien poscia bianchiccia; e quando sta per morire, lacera colle unghie le lenzuola, e le coperte, e non fa altro che grattar colle dita.

§. 2.

PUÒ la frenesia procedere o dalla infiammazione immediata del cervello, e delle sue meningi, accompagnata da una febbre acuta, o dal sangue, che vi concorre con troppa violenza.

§. 3.

QUESTA malattia riduce spesso l'ammalato a morte nel terzo, quarto, o settimo giorno; ma quando è curata a dovere, si termina nell'ottavo, nono, o undecimo per via di sudori continui e caldi per tutto il corpo, e per uno scolamento di urina torbida, e spessa. L'infermo si calma, e si addormenta, e ricupera la ragione, e la salute, che prima godeva. Quando la crisi è imperfetta, la malattia degenera in un'alienazione di mente continua, alla quale va unita una febbre pure continua. Molti vengono liberati da questa malattia

ria da un' emorragia di naso, da un flusso menstruale, ed emorroidale, o da un flusso di ventre, o da un' espulsione cutanea.

§. 4.

E Sige in generale questa febbre que' medesimi rimedj, e quella regola stessa, che esigono le febbri acute; e soprattutto due, tre, e quattro cavate di sangue dal braccio, e dal piede ne' tre primi giorni. 2. Che si scharichi il cervello, che si calmi l' infiammazione del sangue, e che si renda a questo la sua fluidezza ordinaria per via de' pediluvj, de' clisteri emollienti (Cap. V. §. 4.), de' quali se ne darà uno la mattina, ed un altro la sera, applicando all' infermo un cataplasma di lievito sotto le piante, Cap. VIII. §. 2., fin dal principio della malattia, un impiastro vescicatorio alle tempie, Cap. X. §. 4., in caso che il lievito non operi; le coppette a taglio sulle spalle, se l' impiastro non fa effetto; finalmente usando i rimedj, che ho prescritti per le febbri calde. Il meglio, che si possa anche fare, si è il prendere la sera nell' andar a letto il latte di mandorle del Cap. IX. §. 2. e nel corso della giornata le pozioni agrette, e i brodi d'orzo, e di tritello di vena. La dieta dev' essere la stessa in ogni punto, che per le febbri calde. Parlerò nella seconda parte di quest' opera della Frenesia, che non è complicata colla febbre.

§. 1.

PEr infiammazione intendono i Medici un rumore prodotto dalla presenza, o sia dal floggiorno del sangue arteriale, che stagna ne' vasi più minuti, e vi cagiona una distensione dolorosa, accompagnata dalla febbre. Quando quest' infiammazione succede ne' vasi sanguigni degli occhi, vi produce un ardor violento, ed un dolore acuto; essi divengono rossi, si gonfiano, e l' infermo vien assalito da' mali di capo, dalla febbre, e talvolta dal vomito, massime quando l' infiammazione giunge alla tunica interna vicina al nervo ottico; la luce aumenta il dolore, e tosto si accumula un umor vischioso nell' angolo interno. Quanto più sono i vasi distesi, tanto più dolorosa riesce l' infiammazione, e da questa tensione appunto dipendono i varj gradi d' infiammazione.

§. 2.

L' Infiammazione degli occhi, non men di quella delle altre parti del corpo, esige 1. che si tragga sangue all' infermo dal braccio una o due volte; e più ancora, se occorrerà; e se è adulto gli si deono cavare da otto in dodici oncie di sangue per volta. Deve altresì tener ogni sera i piedi in un bagno composto d' acqua tiepida, in cui si sieno fatti bollire alcuni pugilli di cenere, un pugillo di sale, mezzo pugillo di pepe, ed alquanti bichieri di aceto, e far uso ogni giorno del clistere del

Cap.

Cap. V. §. 4. 2. Convieni in principio della malattia, e finchè dura l'infiammazione, usare i rimedj interni, e la regola, che prescrissi per le febbri calde, a fine d'impedire, che essa non cagioni un'ulcera nell'occhio. 3. Impiegare i topici, che si credono atti a diminuire la tensione de' vasi, ed a sgombrargli; per ottenere il qual fine gioverà molto il mettere dell'acqua calda in un vaso, che abbia il collo stretto, e il riceverne il vapore nell'occhio infermo quanto più spesso si può. Quando questo vapore riuscisse incommodo all'ammalato, egli applicherà sull'occhio l'impiaastro emolliente del Cap. IV. §. 7. avvertendo di rinnovarlo ogniqualvolta sentirà, che principia a perdere il suo calore. Perchè poi non può profumarsi la notte, nè valersi dell'impiaastro suddetto, per timore che non raffreddi l'organo, piglierà un pezzetto di tela, e stendendovi sopra l'impiaastro rinfrescativo e risolutivo del Cap. I. n. 11., lo applicherà sull'occhio, per impedire che non sia tocco dall'aria. Può altresì, in vece dell'impiaastro emolliente, applicare caldamente in sugli occhi un panno lino a tre o quattro doppi, dopo avervi distesa sopra la seguente preparazione. Piglinsi due bianchi d'uova, ed un pezzetto di vitriolo bianco, si macini il tutto insieme, e si dimeni finchè faccia la schiuma, e poi si adoperi. O veramente si metta un cucchiarino di canfora nell'acquavita, vi si dia il fuoco, e dopo averla lasciata ardere alquanto,

si bagni in essa una tasta, o compressa, come volgarmente si dice, e si ponga sull'occhio.

§. 3.

SE l'infiammazione è ostinata, gli si applicheranno alle tempia, o dietro le orecchie due o tre sanguisughe, e gli si faranno delle scarnificazioni sulle spalle. L'infiammazione delle palpebre, quando è violenta, richiede la stessa cura, che quella degli occhi. Quella, che è prodotta dal morbo venereo, non può guerirsi se non col mercurio, come si dirà nel Capitolo delle malattie veneree.

○)—————(○

CAPITOLO XXXII.

Dell' Infiammazione della Gola, e degli Orecchi.

§. 1.

L'Infiammazione della membrana interiore dell' orecchio si manifesta con un dolore acuto ed intollerabile, che si risente nel meato uditorio*, e che è accompagnato da una febbre continua, da delirio, e da convulsioni.

§. 2.

Questa malattia esige la stessa cura, che le febbri calde. 2. Che si applichi immediatamente sulla parte il cataplasma emolliente del Cap. IV. §. 7. per calmare l'infiammazione, che vi si è formata. Quando questo non operi, e si formi nell' orecchio una postema, bisogna più volte il giorno introdurvi dentro alcune goccioline d'acqua tiepida mescolata con miele, o con urina di un bambino, e proseguire ad usar

ufar questo rimedio finchè non n' efca più materia alcuna .

6. 3.

QUando il dolore d' orecchio non è prodotto da infiammazione , ma da un umor acre , basta applicarvi sopra il cataplasma emolliente , e introdurvi dentro più volte il giorno alcune tiepide goccie d' olio dolcificante . Lo stesso rimedio può adoperarsi , quando il dolore vien cagionato da qualche insetto , che vi si sia introdotto .

§. 4.

L'Infiammazione della gola , o la schinanzia , è di varie spezie , e le si danno varj nomi . Ma ordinariamente denota l' infiammazione , che ha la sua sede nella membrana del palato , nella parte superiore dello esofago , e della trachea , nelle amigdale , o gavigne , e nei muscoli interni della strozza , o sia del gorgozzule . La schinanzia riesce più o meno pericolosa , secondo le parti , che vengono infiammate . Manifestasi d' ordinario con un dolor violento , con una febbre acuta , ed un ardente calore nel palato , con l' accensione del volto , e la gonfiezza degli occhi , con la difficoltà di respirare , e d' inghiottire , a misura che va crescendo la gonfiezza delle parti . L' infermo cade spesso nel delirio e nel letargo , gli s' inaridisce la lingua , e stenta sommamente a sputare .

6. 5.

T Ostoche sopravvengono ad alcuno i detti sintomi , qualunque sia il loro grado , e
E 3 quelli

quelli di una febbre calda, convien dargli sul campo il clistere del Cap. V. §. 4. e continuarne l'uso in tutto il corso della malattia, abbia egli il ventre libero ed obbediente, o non l'abbia. 2. Poche ore dopo che il clistere avrà operato, gli si caverà sangue dal braccio o dal piede, e se la sua età, e le sue forze il permettono, questa cavata di sangue dovrà essere di 10. in 15. oncie. 3. Il giorno dopo, quando farà diminuita la febbre, gli si farà un nuovo salasso, anzi è utile il farlo ne' quattro primi giorni, se la febbre è forte, e il sangue coperto d'una corica bianca. 4. L'infermo userà giornalmente de' clisteri, e de' pediluvj, non altrimenti che per l'infiammazione degli occhi, a fine di trarre il sangue alle inferiori estremità, applicandosi sul collo il cataplasma emolliente del Cap. IV. §. 7. per mantenere la traspirazione. 5. Se le forze gliel permettono, farà bene di alzarfi dal letto, e di starsene nella sua camera, in guisa però che non possa raffreddarsi, e gargarizzerà spesso con acqua tiepida raddolcita con miele, in una foglietta, nella quale metterà due cucchiarini della polvere di canfora sudorifica del Cap. I. n. 3. e da quattro in sei cucchiari pieni di buon aceto. Alla polvere di canfora potrà sostituire il nitro raffinato. Quando egli si ritrovasse troppo debole per gargarizzar da per se, gli si schizzerà con un sifone o siringa la detta composizione. Eccone però un'altra assai migliore. Si prendano due bicchieri d'aceto, vi si aggiungano alcuni

cuc-

cucchiari di polvere di canfora , vi si getti dentro un pezzo di mattone , o di ferro rovente , e si faccia raccogliere all' infermo il fumo per mezzo di un imbuto . Questo rimedio è utilissimo in tutte le spezie di schinanzia , quando non si è ancora formata la postema , o il tumore che vogliam dire . 6. Si adopera-
no fin dal principio della malattia que' medesimi rimedj interni , e si terrà quella stessa regola , che nelle febbri infiammatorie .

§. 6.

Rispetto alla schinanzia falsa , che è cagionata da un ammasso di serosità nelle parti inferiori del gorgozzule e del collo , e che so-
praggiunge spesso nelle febbri catarrali , bastano a guerirla il salasso , il gargarismo composto come ho detto poc' anzi , alcuni clisteri e purganti , e la regola , che ho prescritta per le febbri infiammatorie . Se malgrado questi rimedj si forma poi nel gorgozzule un tumore , convien farlo venire a suppurazione col mezzo del cataplasma emolliente del Cap. IV. §. 7. , bagnando la parte con latte caldo , facendo inghiottire dell' acqua calda all' infermo , schizzandogli in gola , o facendogli gargarizzare acqua tiepida e miele , insin tanto che non n' esca più della marcia .

§. 7.

Nel tempo , ch' io sto scrivendo , cioè li 15. di Genajo 1762. , regna da un mese in qua in questa Città una spezie di schinanzia maligna , la quale ha condotte al sepolcro moltissime

sime persone d' ogni età e d' ogni sesso . Ne darò quì la descrizione , ed insegnerò nel tempo stesso il metodo di curarla . La maggior parte di coloro , che ne vengono affaliti , si duole di una somma fiacchezza in tutte le membra , ha dei mali di capo , ed un' alternativa di freddo , e di calore ; molti hanno vomiti violenti , che loro recano qualche sollievo ; quelli , che all' incontro non possono vomitare , sentono un calor eccessivo , e cadono in una febbre infiammatoria , nel delirio , e nelle convulsioni . Nel primo , o nel secondo giorno sopravviene una tensione , ed un dolore nel gorgozzule , e le amigdale , o gavigne interne principiano ad enfiarsi ed infiammarsi . Nel quarto o nel quinto compajono sul petto e sul dorso , e quindi su tutte le altre parti del corpo macchiette rosse o bianche , simili alle migliari , e bollicole ripiene di serosità , l' espulsion delle quali calma il mal di gola . Nel settimo giorno dette macchie , o pustulette principiano a seccarsi , ed a cadere in altrettante croste . Parecchi vi sono , che altro male non hanno , se non la schinanzia , e in vece delle macchie anzidette , si formano loro dei tumori nelle amigdale esterne , che si dissipano colla schinanzia , oppure degenerano in ulcere .

§. 8.

E Cco ora in qual guisa io foglio curare questa malattia . 1. Faccio osservare agli ammalati la stessa regola , che nelle febbri infiammatorie , con questo solo divario , che permetto loro

loro di alzarfi dal letto per qualche ora verso la metà del giorno, e che quando oltre il calore, che hanno, sono pletorici, e sono adulti, gli fo trar sangue fin dal primo o secondo giorno. 2. Quando violenti sono i mali di cuore ed i vomiti, do loro da principio una presa della polvere emetica del Cap. I. n. 3. nell'acqua tiepida, e poi di tre in tre ore una presa dello spirito glaciale del Cap. I. n. 2. in una infusione di fiori di sambucco raddolcita con miele. 3. Quando mi accorgo verso il quarto o quinto giorno, che le macchie son per uscire, a fine di accelerarne l'espulsione, e di secondar la natura, do loro la sera una presa di polvere di canfora sudorifica nel Tè, o nel brodo d'orzo, o di tritello di vena. 4. Gli fo gargarizzare più volte il giorno col gargarismo accennato nel precedente §. 5., ed applico lor sulla gola l'impiaastro rinfrescativo del Cap. I. n. 11., oppure un pezzo di pelle di montone. 5. Quando sopraggiunge loro il delirio, fo loro applicare alle piante l'impiaastro di lievito del Cap. I. n. 10., e mi regolo nel modo che dissi nel Cap. X. §. 4. 6. Quando le amigdale interne si gonfiano, vi rimedio come ho detto nel §. 6. Se poi ciò interviene all'esterne, vi applico sopra il cataplasma del Cap. IV. §. 7. per dissolvere il tumore, o farlo venire a maturità; quindi lo taglio colla lancetta, ne fo uscire la materia, metto per alcuni giorni nella piaga della filaccia asciutta, e sopra questa l'impiaastro resolutivo, e la medico

E 5.

poscia

poscia due volte il giorno col balsamo vulnerario, finchè sia perfettamente consolidata.

§. 9.

QUando mi accade curar fanciulli, in vece dei rimedj, che loro non si possono far prendere, do loro ogni giorno due o tre clisteri composti di 10. o 15. grani di canfora disciolta in un cucchiaro d'olio, di un mezzo cucchiaro di zucchero, e di una chicchera d'acqua tiepida, nè gli lascio bere altro, che acqua cotta raddolcita con zucchero, e mescolata con alquanto di latte di vacca.

§. 10.

Molti, e particolarmente i fanciulli, sono soggetti a' tumori acquosi, per guerire i quali mi servo della Panacea Elvetica, Part. III. Cap. III. non altrimenti che per l'idropisia.

o) ————— (o

C A P I T O L O XXXIII.

Della Pleurisia.

§. 1.

DUE sono le sorte di Pleurisia, la vera, e la falsa. La vera consiste in un dolore acuto dall'uno o dall'altro lato del petto, il quale è prodotto dall'infiammazione, e dal ristagnamento del sangue nelle arterie delle costole, e delle membrane interne del petto, ed accompagnato da una febbre violenta.

§. 2.

Comprendendosi sotto nome di falsa pleurisia tutti i dolori di costa, che non sono accompagnati da una febbre acuta, che son meno

vi-

violenti di quelli della prima specie, ed esterni la maggior parte, cosicchè crescono quando si tocca la parte offesa.

§. 3.

LA vera pleurisia, non altrimenti che la febbre acuta, si manifesta col freddo, e co' tremori, ai quali succedono un calore violento, la sete, l'ansietà, &c. In capo ad alcune, ore o l'indomani, sopraggiunge un acuto dolore nell'uno, o nell'altro lato del petto, o in amendue insieme, il respirare si rende malagevole, e spesso il dolore corrisponde alla spina del dorso, o fino all'omoplata. L'infermo è assalito da una gran tosse; rimane infiammato in volto, stenta a sputare; ma in capo ad alcuni giorni i suoi sputi divengono sanguigni, ed a misura che cresce il male, più spessi, e più tinti di sangue. Tanto più è pericolosa la malattia, quanto è più tardiva l'espulsione del catarro dal petto. Fin da principio sopravviene la febbre, e va crescendo fino al settimo o nono giorno, nel qual tempo è in tutta la sua forza; si termina poscia o per via di sudori, o per abbondanza d'urine, &c. o per una postema, o per la cancrena. Quando si ulcera il polmone, più difficile si rende il respiro, si rallenta il polso, cresce la rossezza del volto, si gonfia, e si diminuisce lo spurgo. Nella vera pleurisia, non altrimenti che nella peripneumonia, di cui parlerò nel seguente Capitolo, deonsi fare sul sangue varie osservazioni, le quali sono infallibili, e dalle quali si può dedurre se la pleurisia

E. 6.

fia

sia vera, o falsa. Nella prima il sangue è coperto d'una cotica bianca, spessa, e dura quanto il cuojo, è congelato, e forma a guisa di un grumo, che galleggia sulla linfa. Spesse volte non si osserva questa cotica nel primo salasso, solamente il sangue vi appare vischioso ed infiammato; si forma poi nel secondo, il che mai non accade nella pleurisia falsa. La vera è sovente accompagnata dai medesimi sintomi, che accompagnano le febbri infiammatorie, e richiede la stessa cura.

§. 4.

Nella falsa pleurisia, che non è complicata colla febbre, o in cui la febbre è leggera, tutto si riduce a diminuire la troppa copia del sangue, che ne impedisce la circolazione. Perciò si procederà ad un salasso di 8. in 11. oncie dal braccio, o dal piede, e si darà due volte il giorno all'infermo una presa dello spirito glaciale in un infusione di camomilla, o in uno de' veicoli indicati nel Cap. I. n. 2. Se avrà dei mali di cuore e di stomaco, gli si darà il giorno seguente una presa della polvere purgativa del Cap. I. n. 6. nell'acqua tiepida, o nel brodo liscio, o altro purgante, che si stimi più opportuno. Accennerò altrove la condotta, che si deve tenere nella falsa pleurisia, quando è cagionata dalla retrocessione dell'umore, che produce la podagra, o le convulsioni, o da' vermini, che si sono stanziati nello stomaco.

§. 5.

LA vera pleurisia richiede qualche cosa di più, come quella, che è prodotta dal con-

densamento, dall' infiammazione, e dalla troppo grande abbondanza del sangue. Siccome suole uccidere spesse volte l' ammalato in capo a cinque o sette giorni, quando è violento; così conviene da bel principio diminuire la copia del sangue, restituirgli l' ordinaria sua fluidezza, ed impedire che non si corrompa, e finalmente prescrivere all' infermo quella medesima regola, che prescritta si è per le febbri infiammatorie.

§. 6.

Quanto al salasso, convien ricorrervi nei tre o quattro primi giorni della malattia, dopo che sarà cessato il tremore, e reiterarlo due volte il giorno, quando violento è la febbre. Se l' infermo è adulto, e di temperamento pletorico, gli si trarranno nel primo salasso da 12. in 15. oncie di sangue, alquanto meno nel secondo e nel terzo, e in caso che debba reiterarsi ancora, l' ultimo non dovrà essere che di 8. in 9. oncie di sangue, per non indebolir troppo il soggetto. Passato il quinto giorno, riesce pericoloso il trargli sangue, mentre o il primo accesso di febbre gli reca la morte, o sopraggiunge un' infiammazione. Dalla maggiore o dalla minore violenza della febbre, e dalla maggiore o minore durezza della cotica bianca, che si forma sul sangue, si giudica del numero de' salassi, che la malattia richiede. Quando dopo il secondo, o il terzo l' infermo è più tranquillo, quando egli dorme, quando il calore, la sete, il dolore, l' ansietà, e lo sputo di sangue diminuiscono, e quando la cotica del sangue

gue del ultimo salasso è men dura, e meno spessa, non si deve più replicare, e conviene at- tenerfi ai rimedj, e alla diera fino al fine della malattia. Egli è meglio cavar da principio troppo sangue all' infermo, che cavargliene troppo poco, conciossiachè, oltre al non correrfi verun rischio d' indebolirlo, il sangue, che gli si è tratto, non tarda a rinnovellarsi in poco tempo.

§. 7.

UN' ora dopo il primo salasso, gli si darà il clistere indicato nel Cap. V. §. 4., e si replicherà ogni giorno, ove sia fitico. 2. Gli si darà la mattina di tre in tre ore una presa della polvere di canfora del Cap. I. n. 3., e il dopo pranzo di due in due ore, fin verso le ore otto della sera una presa dell' essenza febrifuga, o dello spirito glaciale, Cap. I. n. 2., nel brodo d' orzo, o di tritello di vena, e la notte, quando non dorme, due cucchiari di latte rinfrescativo, Cap. V. §. 2. tiepido, e s' è alterato, dell' acqua d' orzo nel brodo, &c. e nel corso della giornata le decozioni agrette, o la bevanda del Cap. II. §. 3., secondo si giudicherà opportuno, avvertendo sempre che sia tiepida. Quando la febbre, e il dolore principieranno a decrescere, si diminuirà pure la dose di detti rimedj. 3. Deesi ancora in principio della malattia applicar alla parte, in cui è il dolore, una vescica ripiena di latte, o d' acqua calda, oppure (e questo è meglio di tutto) il caraplasma del Cap. IV. §. 7. avvertendo di rinnovarlo, quando comincia a raffreddarsi. Or-
tino,

CAPITOLO XXXIII. 111

simo altresì per calmare il dolor di costa egli è l' ungerlo più volte il giorno con unguento di bismalva tiepido , e l' applicarvi sopra il detto cataplasma . 4. Se questa malattia è accompagnata da alcuno de' sintomi della febbre acuta , si useranno i soliti rimedj per calmargli . 5. Non è male , tanto in principio , quanto nel corso della malattia , che l' infermo , quando non suda , lasci per poche ore il letto , e si bagni i piedi nell' acqua tiepida , per trarre il sangue alle estremità , e sgomberare il petto . 6. Per calmare la tosse , che lo tormenta , piglierà di quando in quando due cucchiarini di siropo di bismalva , e vi bevèrà copiosamente dietro del brodo di orzo , o di triello di vena . 7. Sopravvenendo in fine della malattia le migliari , o un nuovo accesso di febbre , si caveranno all' ammalato da 7. in 10. oncie di sangue , se pure lo permettono le sue forze , e si adopereranno quegli stessi rimedj , che in principio . 6. 8.

T Ale si è il metodo , onde da tredici anni in quà mi servo nel curare la vera pleurisia , quando le forze dell' infermo me lo permettono , e pochi son quelli , che io non guerisca in capo di sette giorni . Si può sostituire alla polvere di canfora , mezz' oncia di sale ammoniac , altrettanto di nitro , e 25. grani di canfora , usandone nel tempo prescritto . Anche in vece dello spirito glaciale si può adoperare la seguente bevanda , prendendone di due in due , o di tre in tre ore una chicchera , e
be-

bevendovi sopra dell'acqua d' orzo . Prendasi acqua di fior di tiglia distillata , e di cardomaria , un quarto di pinta per ciascuna , da due in tre oncie di aceto distillato , due dramme di nitro raffinato , e tanto di miele , quanto è necessario per raddolcire questa pozione .

§. 9.

Succede spesso , quando si trascura di trar sangue per tempo all' ammalato , o che non è ben curato , che il sangue contenuto nelle arterie delle coste si converte in marcia , e forma una postema , la quale aprendosi nel petto in un subito lo soffoca , e lo getta nell' etichezza . Quando questa postema è esteriore , e viene a suppurazione , allora per l' ordinario egli salva la vita . I sintomi , che la indicano , sono il freddo , il tremito , a cui succedono il calore , la tension della parte , la difficoltà del respirare , e la molestia grave , che prova l' ammalato nello stare coricato sul fianco . Formata che si è la postema , la pelle diviene al sommo sensibile , e la parte si gonfia , e s' infiamma . In questo caso convien applicar sul tumore il cataplasma del Cap. IV. §. 7. per farlo maturare , forarlo colla lancetta , quando non crepa da se , e medicar la piaga , come si disse in detto Cap. IV. §. 7. Nel Capitolo della Tifichenza accennerò la cura , che esigono i tumori del polmone . Deggio quì avvertire intanto , che quando è maturo il tumore , si deve senza indugio forare , affinchè la materia non venga ad offender le coste , ed a tarlarle . Il che sia detto
pure

CAPITOLO XXXIII. 119

pure di tutti i tumori, che vengono nelle altre parti del corpo in seguito ad una pleurisia.

○) ————— (○

CAPITOLO XXXIV.

*Dell' Infiammazione del Polmone , o sia
della Peripneumonia .*

§. 1.

LA Peripneumonia è un male violentissimo e pericolosissimo . Manifestasi con febbre ardente , tremore , calore , difficoltà nel respirare , oppressione , e dolore di petto . Il volto si gonfia , gli occhi son rossi e scintillanti , infiammate le guancie l' ammalato cade in accessi di sopore , di letargia , e di vaneggiamento . In sul principio della malattia nè la tosse , nè lo spurgo son così forti , come nella pleurisia , ma crescono a misura dei progressi del male . La Peripneumonia è spesso complicata colla pleurisia , ed allora ai sintomi suddetti si aggiungono quelli di quest'ultima malattia .

§. 2.

L'Infiammazione del polmone è della natura stessa , di cui è quella , che accompagna la pleurisia , ed esige però i rimedj medesimi , e la stessa regola , che le febbri infiammatorie , senza eccettuarne i sintomi .

§. 3.

IL polso in questa malattia è molte volte non diverso da quello , che suol essere nello stato naturale , ma le vene compajono tese e gonfie . Talora si arresta , e questo procede dalla difficoltà , che incontra il sangue in circolar nel

nel polmone . Il sangue del primo, e del secondo salasso, e spessissime volte del primo, è coperto d'una cortica spessa e bianchiccia, non altrimenti che nella pleurisia, e quanto più essa cortica è spessa, tanto più devono essere abbondanti e reiterate ne' quattro o cinque primi giorni le cavate di sangue.

§. 4.

HAvvi una seconda specie di peripneumonia, che chiamasi falsa, perchè sebbene la febbre sia quasi impercettibile, pure partecipa in qualche cosa della vera. Questa è talvolta pericolosa, e degenera in peripneumonia vera, quando da principio è mal curata. Descriverò in poche parole quella, che regna nella primavera, e nel principio dell'inverno, ed a cui le persone attempate, piene di umori vischiosi e di ferosità soggiacciono più che i giovani. Parlerò poscia a suo luogo delle altre spezie di peripneumonia, provenienti da altre malattie, come farebbe a cagion d'esempio, dalla ripercussione, o sia retrocessione della materia atrittica.

§. 5.

Moltissimi, e massime coloro, che sono attempati e soggetti a malattie ippocondriache, e ne' quali si fa male la digestione, hanno il polmone ripieno di viscidumi, e di ferosità, e sono per l'ordinario soggetti alla tosse. Quando tali persone fanno uso di bevande troppo riscaldanti, o si espongono al freddo incautamente, detti viscidumi si condensano
a se-

a segno di non poter più uscire, e in questo caso vengono esse assalite da una grande fiacchezza, da una difficoltà di respiro, da una febbre continua, ma però men forte, che nella vera peripneumonia, e da una tosse asciutta, la quale è insensibilmente seguita dallo spurgo di una materia spessa e vischiosa, che talvolta è tinta di sangue. Si gonfia loro il volto, ma è però questo meno infiammato, che nella vera peripneumonia. Sentono talora dei dolori nel lato del petto, che loro impedisce di star in letto distesi. Questi sintomi sono finalmente seguiti da un'ulcera mortale, o da un'apoplessia, quando non si usa la precauzione di disciogliere in tempo la materia condensata nel polmone, e di agevolare la circolazione del sangue in detto viscere, e nel cervello.

§. 6.

LA cura di questa malattia consiste 1. in disciogliere, attenuare, ed evacuare o per mezzo delle urine, o per secesso, o per traspirazione la materia, che si ristagna ne' vasi del polmone e del petto, dando ogni giorno all'infermo tre o quattro prese della polvere di canfora sudorifica del Cap. I. n. 3. in acquacotta d'orzo tiepida, o in altra di quelle del Cap. II. §. 3., e facendogli bere sopra sovente una pozione calda. Quando adulto è il soggetto, si può in cambio di detta polvere dargli più volte il giorno 20. grani di sale ammoniacco mescolato con 2. grani di canfora, ed un grano di gomma di fior di belzoino. Verso la sera,

tem-

tempo in cui crescono le ansietà, se gli può dare nella sua acquacotta di tre in tre ore una presa dello spirito glaciale del Cap. I. n. 3. . 3. Se egli è stitico, gli si darà mattina e sera il clistere del Cap. V. §. 4., e gli si freggeranno di quando in quando con una salvietta calda i piedi. 4. Egli dovrà starsene alzato il più che potrà, e passeggiare per la sua camera. La dieta dev' essere la stessa, che per le febbri infiammatorie. Se il soggetto è adulto e pletorico, e se il permettono le di lui forze, gli si caveranno il secondo giorno da 8. in 10. oncie di sangue; ma si dovrà avvertire, che il salasso è molto pericoloso, e quasi sempre mortale ne' vecchi.

o) ————— o

CAPITOLO XXXV.

Dell' Infiammazione dello Stomaco.

§. I.

L' Infiammazione dello Stomaco non è meno pericolosa di quella del polmone. E' accompagnata da una febbre acuta violenta, la quale principia con un fortissimo tremito, a cui succede un calore ardente, quando il male non proviene direttamente da qualche materia acre, corrosiva, ed infiammatoria, che si è mangiata, o che si è gettata su questo viscere. Sentesi verso lo scrobicolo del cuore un dolore acuto, e cocente, che corrisponde nella spina del dorso; l'infermo è sommamente alterato, ha dei mali di cuore frequenti tostochè beve, o mangia cos' alcuna, i suoi escrementi sono liquidi per

per lo più, e la sua pelle s'innalza nel sito, in cui è l'infiammazione, e diventa sensibile al maggior segno. L'infiammazione sopravviene d'ordinario nel settimo giorno, ed anche nel quarto o nel quinto, con convulsioni, ed affanni intollerabili. Alcuni gueriscono per via di replicati salassi, e dell'uso delle bevande tiepide; in altri l'infiammazione degenera in un'ulcera, che li mena al sepolcro.

§. 2.

LA guerigione di questa malattia riesce difficile assai, perchè l'ammalato manda subito fuori i rimedj, che gli si danno, prima che abbiano potuto produrre l'effetto loro. E' assolutamente necessario il trar sangue dal braccio o dal piede, come nella peripneumonia. 2. Il dar ogni giorno due o tre clisteri all'infermo, Cap. V. §. 4., per mantenergli il ventre libero. 3. L'applicare alla parte inferma l'impiaastro emolliente del Cap. IV. §. 7. 4. Il dargli di due in due ore, sì la notte come il giorno, una chicchera, e più se è adulto, di latte di mandorle, con la polvere febrifuga anodina del Cap. V. §. 2., e dietro poi fargli bere acquacotta d'orzo tiepida in quantità. 5. Convien per quanto è possibile sgombrare il cervello col mezzo de' pediluvj, de' clisteri, degli epispastici, e delle fregagioni a' piedi. 6. Quando l'infiammazione procede dalle materie, e calde corrosive, che ha mangiate l'infermo, bisogna provocargli il vomito con fargli inghiottire dell'acqua tiepida mescolata con olio.

CA-

§. 1.

PUÒ ritrovarsi alle volte negl' intestini una materia acre e corrosiva , la quale , o provenga dagli alimenti e dalle bevande , onde si è fatto uso , o provenga dalla retrocessione della traspirazione , basta da se sola a produrvi un' infiammazione mortale .

§. 2.

BAsta che una parte degl' intestini venga assalita da un' infiammazione , perchè tutti gli altri ne partecipino , si restringano , e non diano più passaggio a nulla . Il dolore , che vi si sente , cresce insensibilmente , e degenera in una violentissima colica ; il basso ventre non fa più le sue funzioni , e l' ammalato manda fuori per bocca ciò che mangia , e ciò che bee . I suoi intestini riempionfi di ventosità , le quali manifestansi borborigmi , sopraggiunge una febbre infiammatoria unita a convulsioni , delirj , vaneeggiamenti , &c. Questa malattia manifestasi pure colla febbre , colla sete , con un ardente calore in tutto il corpo , durezza di polso , orine rosse ed infiammate , fiacchezza , e coi dolori sopradetti . Quanto è più piccola la parte assalita dall' infiammazione , tanto meno violenti , ed in minor numero sono i sintomi .

§. 3.

LA cura di questa malattia richiede : 1. Che si tragga sangue subito all' infermo più volte , come nella vera pleurisia . 2. Che gli si diano

diano i medesimi rimedj attenuanti. 3. Tre o quattro clisteri il giorno simili a quelli del Cap. V. §. 4., ne' quali si aggiugnerà un po' di sale per tener libero il ventre. 4. Che si applichi sopra la parte inferma il cataplasma emolliente del Cap. IV. §. 7. e che spesso si rinnovi. 5. Che l'ammalato pigli sovente brodi d'orzo, o tritello di vena per calmare la febbre, ed espellire le materie acrimoniose, che si ritrovano negl' intestini. 6. Che si serva di questi rimedj, e di questa regola finchè abbia perfettamente recuperata la salute., e li continui per alcuni giorni, eziandio dopo cessati i dolori. 7. Che quando i dolori sono violenti, pigli la sera una presa delle goccioline anodine del Cap. I. n. 7. ne' brodi suddetti.

o) ————— (o

CAPITOLO XXXVII.

Dell' Infiammazione del Diafragma.

§. 1.

IL Diafragma è un muscolo molto largo, sottilissimo, e seminato di molti vasi sanguigni, situato alla base del petto, cui esso divide dal basso ventre, come una specie di traversale. L'infiammazione di questo muscolo si manifesta 1. con una febbre acuta. 2. Con un dolore quasi intollerabile al di sotto, ed allato del petto, massime nell' inspirazione, tosse violenta, sternuti, vomiti, e contrazione del basso ventre, quando l'ammalato vuol urinare, o andar del corpo. 3. Con un respirar corto, penoso, e limitato alla parte
supe-

superiore del petto. 4. Con una grande confusione di mente, contorsioni della bocca, ed un certo ridere convulsivo, che vanno a terminare colla morte dell' infermo.

§. 2.

Questa malattia per l' ordinario è incurabile, ma nel tempo stesso rarissima. Esige la medesima cura, che la pleurisia, e la stessa regola, che le febbri infiammatorie.

o)—————(o

CAPITOLO XXXVIII.

Dell' Infiammazione del Fegato, e della Milza.

§. 1.

Sono questi due visceri situati ai due lati della parte superiore del basso ventre, il primo alla destra, e il secondo un poco indietro dal lato sinistro andando verso la spina del dorso sotto le coste false. Le infiammazioni di questi due visceri hanno i sintomi medesimi, e l' esito stesso. Quella del fegato manifestasi con una forte tensione sotto le false coste alla destra dei lombi, accompagnata da febbre violenta, che varia secondochè più o meno è infiammato il detto viscere. L' ammalato è astretto ad incurvarsi, o a star coricato in sul fianco infermo. Quando è infiammata la milza, questi sintomi hanno la loro sede nel fianco sinistro.

§. 2.

Queste due specie d' infiammazioni richiegono la stessa cura, che la pleurisia, o quella degli' intestini.

CA-

CAPITOLO XXXIX.

Dell' Infiammazione delle Reni .

§. 1.

Manifestasi questa malattia con un pungente ardente , e violento dolore presso la metà della spina del dorso , con una febbre acuta , colla diminuzion delle orine , che pigliano un color di fuoco , e un rosso carico , con una specie di paralesia alla coscia più vicina al rene infermo , con un dolore nella parte de' lombi , e della borsa , che è dal lato del rene infiammato , e finalmente con dolori di ventre , vomiti di bile , e rutti amari e frequenti .

§. 2.

Questa specie d' infiammazione esige la stessa cura , che quella dello stomaco , e degl' intestini .

- Fine della prima parte .

F.

L' AR-

L' A R T E

DI CURARSI E DI GUERIRSI DA SE

Nelle più comuni e più gravi malattie .

o)-----o

PARTE SECONDA.

DELLE MALATTIE DEL CAPO , DEL PETTO,
E DEL BASSO VENTRE .

o)-----o

CAPITOLO I.

*Rimedj per le Malattie indicate in questa
seconda Parte .*

Num. I.

*Pillole Elvetiche aperitive e corroboranti contro le
malattie Ippocondriache ed Isteriche .*

Q Ueste Pillole sono non solamente uno de' più efficaci rimedj , che usar si possano nelle malattie ippocondriache ed isteriche , per la virtù, che hanno di togliere le ostruzioni , e di fortificare i nervi , ma sono altresì utili in tutte le malattie prodotte da un' effusione di bile e di pituità

pituità nella massa del sangue, nelle soppressioni del flusso menstruale ed emorroidale, come pure servono a tenere il ventre libero. Gli adulti possono secondo il loro comodo, e secondo la natura del loro male prenderne da quattro in sei due o tre volte il giorno. Queste pillole consistono 10. *latz* una mezz' oncia.

Gocciolo Mercuriali.

Num. 2. **S**I vedrà più sotto nel Capitolo IV. che questo rimedio è l'unico specifico, che si conosca per la rabbia, quando per tempo si adopera. E' ugualmente efficace in parecchie altre malattie, per esempio nel morbo venereo, nelle malattie della cute, e delle glandule. Opera per via de' sudori e delle urine, e non eccita salivazione, come la maggior parte delle altre preparazioni mercuriali, se si adopera cautamente, e come indicherò trattando delle malattie, alle quali è adattato. Si prende ordinariamente la mattina a digiuno, e la sera nell'andare a letto, in una chicchera di Tè freddo, o d'infusione di sassafrasso, o di sambucco, e gli si beono dietro alcune chicchere d'acquacotta. Gli adulti possono prenderne 12. gocciole in una volta, e proseguire a prenderne una gocciola mattina e sera per ventiquattro giorni e più, in caso che non eccitino la salivazione, perchè in tal caso bisogna interromperne l'uso per alquanti giorni, e purgarsi due volte, e poi ripigliarle insin a tanto che uno sia perfettamente guerito. Se cagionassero dolori di ventre, il che però è assai raro,

converrebbe un' ora dopo di averne preso , bervi sopra del brodo d' orzo , di tritello di vena , o di riso . Se ne possono dare a' fanciulli dall' età di anni cinque fino ai dodici 5. in 8. goccioline per volta il giorno . Chi adopera questo rimedio deve astenersi dal sale , dagli aromi , dai licori spiritosi , e dagli alimenti caldi e difficili a digerirsi , star caldo , e difendersi dal freddo quando esce , ed usare per bevanda ordinaria qualche leggier acquacotta di legni . Queste goccioline costano 25. batz. la mezz' oncia .

Pillole Mercuriali Elvetiche .

Num. 3. **Q**ueste pillole operano nella stessa guisa , che le predette goccioline Mercuriali , cioè per via delle urine e de' sudori , ed in alcuni per secesso . Il solo divario che passa fra di esse è , che le pillole a cagione del zolfo dorato , d' antimonio che contengono , sono assai più efficaci delle goccioline in certe malattie delle glandule . Gli adulti possono prenderne mattina e sera cinque in qualche acquacotta di legni tiepida per venti consecutivi giorni , ove non eccitino salivazione , mentre se ciò avvenisse , converrebbe regolarli come dissi di sopra al n. 2. . I fanciulli dall' età di cinque anni fino ai dodici possono prenderne ogni giorno mattina e sera da 2. fino a 5. nel brodo liscio , avvertendo di fargli bere dietro acquacotta di legni in copia . La mezz' oncia costa 25. batz.

Essenza amara Elvetica contro la Podagra, &c.

Num. 4. **Q**uest' Essenza è il più efficace rimedio, che usar si possa per attenuare ed evacuar la materia acre, e pituitosa, che produce la podagra, e i reumatismi freddi, come pure per fortificare i nervi e le fibre. Nella podagra conviene aspettare che sia cessata la febbre, e valersene nel modo seguente. Gli adulti ne prenderanno un' ora innanzi il pranzo un cucchiajo nell' acqua mescolata con un terzo di vino, e vi beberanno dietro alcuni bicchieri d' acquacotta di sassafrazzo tiepida. Finchè l' ammalato fa uso di questo rimedio, egli deve astenersi dal vino, e servirsi per ordinaria bevanda dell' acquacotta di sassafrazzo, salvochè potrà bere a pranzo qualche cucchiaro di buon vino di Spagna. Deve mangiare pochissima carne, e il meno che gli sia possibile, ed astenersi soprattutto dalle uova, e dai cibi salati. La carne, che più gli conviene, si è quella di vitello arrosto, del pollo, a cui può aggiungere la rrotta. Quest' Essenza costa 3. batz. la mezz' oncia.

Panacea Elvetica contro l' Idropisia.

Num. 5. **Q**uesto rimedio è eccellente per tutte le diverse specie d' idropisia; evacua le acque per secesso, e per via delle urine, previene la corruzione degli umori, e conserva la lor fluidezza. Coloro che sono assaliti dall' idropisia, e massime gli adulti, possono prenderne di due in due ore un cucchiarino dentro un poco d' acqua, oppure (e questo è
 F 3 anche

anche meglio) dentro la seguente acquacotta .
 Piglinsi due oncie di tartaro preparato , si fac-
 ciano disciogliere in una foglietta d' acqua cal-
 da , e poi si raddolcisca quest' acqua con zuc-
 chero a piacimento . La dose pe' fanciulli dai
 quattr' anni fino agli otto è da 10. grani fino
 a 25. e per quelli di età superiore da 25. grani
 infino a 30. La mezz' oncia costa 7. batz. e
 2. Kr.

o)-----o

CAPITOLO II.

Del Male di Capo .

§. 1.

P Arlai nella prima parte del mal di capo ,
 che va congiunto alla febbre , e dei mez-
 zi , che si debbono usare per calmarlo . Può
 però ancora procedere da varie cagioni , fra le
 quali io annovero le malattie e gli accidenti ,
 quali farebbero a cagion d' esempio un colpo ,
 una caduta , certi mali del polmone o del pet-
 to , che ritardano la circolazione del sangue ,
 le affezioni ippocondriache ed isteriche , un' osti-
 nata stitichezza , la plethora troppo grande , le
 ripienezze ed impurità dello stomaco , i vermi-
 ni , la retrocessione di certe malattie cutanee ,
 della rogna per esempio , di un tumore nelle
 giunture , un' ulcera , che si sia saldata , il di-
 fetto di traspirazione , la cessazione o il ri-
 tardo del flusso menstruale o emorroidale , l'uso
 eccessivo de' licori spiritosi , il veleno venereo ,
 le assidue veglie , le affezioni , la melancolia ,
 &c.

§. 2.

§. 2.

QUando il mal di capo sia cagionato da un colpo o da una caduta, senza lesione nè interna nè esterna, basta bagnare di quando in quando la parte con canfora, e semplicemente con acquavita, ovvero far bollire un pugillo di fieno cucito in un sacchetto nel vino, spremarlo, ed applicarlo sopra la parte quando sia tiepido solamente.

. 3.

SE il mal di capo proviene da difetto di circolazione nel polmone, il che tosto si riconosce ai dolori ed alle ansietà, che si risentono nel petto, come succede nella peripneumonia sì falsa che vera, egli richiede la stessa cura, che la principal malattia, da cui è prodotto.

§. 4.

LE donne maritate, e soggette alle affezioni isteriche, come anche le vergini, che hanno i nervi e le fibre deboli, sono esposte ai mali di capo, quando si raffreddano i piedi, o il sangue concorre loro al capo più del solito. In tal caso deono spesso far uso di pediluvj tiepidi, e prendere dei clisteri d'acqua tiepida, nella quale metteranno alcuni cucchiari d'olio di mandorle dolci, ed un po' di sale, in oltre deono fregarli i piedi con una salvietta calda, e far del moto. Parlerò nella terza parte dei mali di capo, a' quali soggiacciono le donne maritate.

§. 5.

SE il mal di capo procede da stitichezza ostinata, convien adoperare il clistere accennato nel §. 4., o quando non operi questo sufficientemente, si piglierà una presa del sale glaciale, di cui ho parlato nella Parte I. Cap. I. n. 9. nel Tè, o nell'acqua tiepida.

§. 6.

SE è cagionato dalla plethora, il che si riconosce al calor, che si sente, alla rossezza della pelle, ed al sopore che si prova, bisogna in tal caso trar sangue all'ammalato dal braccio, o dal piede, proporzionalmente alla di lui età e alle di lui forze, per diminuire il volume del sangue. E' utile altresì ch'egli si astenga per qualche tempo dalle carni, e si nodrisca di sole frutta e di legumi, e massimamente che non bea vino, nè licori forti.

§. 7.

IL mal di capo, che è prodotto dalle ripiene e dalle impurità dello stomaco, manifestasi ordinariamente con un dolore nella fronte, o nell'uno o nell'altro lato del capo, dopo che si è dormito, talvolta pure con un dolore nell'occipite, con una aversione alle carni, sconvolgimenti di stomaco, nausea, ed amarezza di bocca. In questo caso l'ammalato non deve far altro, se non bere per due giorni consecutivi del fugo di cedro, mattina e sera, e tanto di sale d'assenzio, quanto ne capisce sulla punta d'un coltello, in un bicchier d'acqua tiepida, e nel dì seguente, se è adul-

to,

10, prenderà 30. grani d' ipecacuana in polvere nel Tè, o nell' acqua, per nettarsi lo stomaco. Che se non potesse avere le dette cose, egli prenderà il primo giorno una presa della polvere febrifuga sedativa, Par. I. Cap. I. n. 1. nel Tè poco carico, o nell' acqua, e l' indomani, o anche due ore dopo una presa della polvere emetica Par. I. Cap. I. n. 5. Per impedire che questo mal di capo, a cui si dà il nome di Emicrania, non sopravenga un' altra volta, bisogna che l' ammalato, dopo di essersi nella detta guisa purgato, prenda mattina e sera tanto di limatura di ferro ben netta, quanto può contenersene sulla punta d' un coltello, nella conserva d' arancio, o d' assenzio, e si astenga da tutti gli alimenti grassi, oleosi, e difficili a digerirsi insin a tanto che il suo stomaco abbia riacquisito tanto di forza da poter digerire quelli, ond' è solito valersi. E quando la limatura di ferro non produca il desiderato effetto, prenderà per quattordici giorni, mattina e sera, una presa della polvere febrifuga indicata nella Par. I. Cap. I. n. 13. A simil sorta di gente si conviene molto il far del moro, il camminare, il cavalcare, e il mantenere il corpo in una spezie di agitazione. L' ordinaria loro bevanda ha da essere acqua di fontana, mescolata con un pajo di bicchieri di vin vecchio.

§. 8.

I Segni indicanti, che il mal di capo è cagionato da vermini, i quali si trovano nello

F. 5

lo stomaco, e negli intestini, sono la pallidezza del volto, gli occhi pesti e fiacchi, gli sconvolgimenti di stomaco per poco che si mangi, le vertigini, l'aversione agli alimenti, comechè si abbia volontà di mangiare, i pizzicori nel naso, e mali di stomaco, e talvolta purei deliquj, e le convulsioni. In caso che si osservi alcuno di questi sintomi, o che l'ammalato nell'andar del corpo getti fuori dei vermini, e si possa sospettare che altri ne abbia nello stomaco, convien dargli tosto una presa della mia polvere purgativa nel Tè leggero, o nell'acqua, la quale glie-li farà evacuare immediatamente. Se non basta la prima presa, egli ne piglierà un'altra nel giorno susseguente. Vegasi Par. I. Cap. I. n. 6.

§. 9.

Succede spesso, che il mal di capo è prodotto dalla retrocession della rognà, dalla cessazione del flusso emorroidale o menstruale, dalla improvvisa cicatrizzazione d'un'ulcera vecchia. Nel primo caso convien ricorrere ai pediluvj, e dare due o tre volte il giorno all'ammalato un cucchiarino di fior di zolfo nel latte tiepido, per far uscire la rognà, o farla uscire in maggior copia, quando non è troppo abbondante, come si pratica rispetto al vajuolo. Nel secondo e nel terzo caso, bisogna trargli sangue dal braccio, fargli prendere i bagni di vapore, e non bastando questo, applicargli le sanguisughe all'ano, per tirar giù il sangue alle estremità inferiori; o almeno dargli spesso il cli-

clistere del §. 4. per avvalorare il tuono de' vasi delle dette parti, come pure le pillole del Cap. I. n. 1. per promuovere le evacuazioni periodiche, come dirò nel Capitolo della soppressione del flusso menstruale e del flusso emorroidale. Si osserverà lo stesso metodo rispetto ai mali di capo cagionati dalla retrocessione della materia artritica, o reumaticale.

§. 10.

SE il mal di capo proviene dalla fermentazione straordinaria del sangue, e questa è cagionata dall'uso eccessivo de' liquori forti, dal far troppo moro, dalle veglie, e da troppa applicazione di mente, si faranno tosto bagnati i piedi all'ammalato nell'acqua tiepida, gli si applicherà sulla fronte un pannolino bagnato nell'aceto, che si rinnoverà di quando in quando, gli s'interdirà per due giorni l'uso del vino e della carne, e non gli si daranno per suo nutrimento, se non cose rinfrescanti, come per esempio brodi d'orzo, o di tritello di vena, acqua semplice, o limonea, o acqua, in cui si sieno fatte cuocere delle frutta agrette.

§. 11.

IL mal di capo, che procede da cagione venerea, non cede se non alle fregagioni mercuriali, come diremo a suo luogo.

§. 12.

OGni qualunque mal di capo continuo in una persona pletorica, che non è soggetta all'affezione ipocondriaca, quando interrompe il sonno dell'ammalato, gl'indebolisce la me-

moria, e l'udito, è accompagnato da vertigini, da tintinno d'orecchi, e da un brulichio nelle dita, è sempre foriere dell'apoplessia. In tal caso l'ammalato deve regolarfi nel modo, che dissi nel §. 6. e farsi trar sangue qualche volta nel corso dell'anno, massime quando è avvezzo a farlo, e fare un uso frequente de' pediluvj.

§. 13.

VI sono dei mali di capo prodotti da ulcere, o da tumori nel cervello, o dal tarlo delle lame interne degli ossi del cranio. Tralascierò qui di parlarne, perchè sono quasi sempre incurabili.

o) ————— o)

C A P I T O L O III.

Della Melancolia, e della Mania.

§. 1.

Comprendo sotto nome di Melancolia quel certo grado di turbamento nell'immaginazione, e nello spirito, che fa un uomo per un leggerissimo motivo si spaventa, si perde d'animo, si rattrista, e talmente si occupa delle idee, che lo colpiscono, che si rende inabile a pensare ed a riflettere a chetichessia. Quando poi questo sconvolgimento di spirito riduce un uomo ad attentare alla propria vita, o a quella d'altri, chiamasi Mania.

§. 2.

Variando le cagioni di queste malattie, ne segue, che la loro cura deve altresì esser diversa. Coloro, che ne vengono assaliti, hanno però

però questo di comune, che sudano pochissimo, dormono anche meno, e tollerano facilmente la fame e la sere, come si osservò in un ammalato dello Spedale di Berna, che si lasciò morir di fame. Procedono per lo più queste malattie da una bile ricotta e adusta, e dalla stitichezza ostinata, che n'è la conseguenza.

§. 3.

Generalmente queste malattie hanno una cagion doppia, ed una doppia sede, cioè risiedono nell'animo, e nel corpo. Hanno nell'animo la lor sede, quando un uomo al vedere un pericolo, da cui non è in istato di liberarsi, cade in un subito nell'affanno, si perde di coraggio, e dà in malinconia, Hanno la lor sede nel corpo, quando per l'eccessivo uso de' licori forti, o pei mezzi, onde si vale a dissipare la propria tristezza, egli altera la massa del sangue, o fa svaporare i suoi spiriti con far troppo moto, usando troppo spesso colle donne, facendosi troppo frequentemente trar sangue, senza procurar poi di rinnovarlo con un nutrimento leggiero e succulento, o quando per la cessazione di qualche malattia, come per esempio del flusso menstruale, o emorroidale, dei fiori bianchi, di un reumatismo, &c. il cervello si trova impedito nelle sue funzioni. Finalmente queste malattie si possono ereditare, quando si nasce da genitori, che vi soggiacevano. Per altro interviene sovente, che la cagione di queste malattie ha la sua sede tanto nell'animo, quanto nel corpo, tale essendo l'unione

l'unione di queste due sostanze, che non può. l'una restar offesa, senza che l'altra pure non se ne risenta.

§. 4.

T Alvolta un'ostinata melancolia degenera in fmania, in confunzione, in istupidezza, o in un violento mal di capo, o veramente si dissipa per via d'una rosolia, d'un flusso emorroidale, d'una febbre quartana, del vomito, d'un flusso di ventre violento, o d'altro simile accidente.

§. 5.

Q Ueste malattie sono difficilissime a curarsi, e per guarirle, convien esaminare se esse provengano da disordine dello spiritoso dell'immaginazione, o da ostruzione di qualche viscere, o da altra preceduta malattia.

§. 6.

Q Ualunque siasi la cagione, da cui procede la melancolia, essa richiede sempre la seguente cura. Si deve procurare di riempiere l'immaginazione dell'infermo di idee contrarie a quelle, che fanno l'oggetto dell'applicazione del di lui spirito, farlo viaggiare, e conversare, trattenerlo in discorsi piacevoli, e fargli fare del moto. 2. Gli si prescriverà un nutrimento leggero, e facile a digerirsi, ed una bevanda, che non sia nè troppo riscaldante, nè troppo rinfrescativa, conciossiachè queste malattie cercano da lor medesime di distruggere la cagione, che le produce. 3. Avendo le persone assalite da tali malattie per l'ordinario una
bile

bile ricotta, e delle ostruzioni nel fegato e nella milza, convien loro prescrivere per quattordici e più giorni due prese dello spirito glaciale, Par. I. Cap. I. n. 2. nell'acqua, e poi finchè sia guerito il male, o scemato almeno, le pillole aperitive e corroboranti indicate da me per le malattie ippocondriache nel Cap. I. n. 1., e si daranno mattina e sera verso le quattro ore, facendogli bere dietro dell'infusione di germandrea. 4. Quando queste pillole non facessero andar del corpo l'infermo una o due volte il giorno, gli si darà il clistere del Cap. II. §. 4. o altro leggier purgante. 5. Se queste pillole non bastano a fradicare affatto il male, gli si farà per qualche tempo bere ogni mattina a digiuno una mezzetta, o una pinta d'acqua di Spà, o di Schwalbach, o di Pyrmont, e si procurerà che cavali spesso, o esca in vettura, affinchè quest'esercizio possa fortificarlo. 6. Non cedendo il male, gli si faranno prendere per qualche tempo, tre o quattro volte il giorno, le goccioline del Cap. I. n. 2. nell'infusione di germandrea, ed è cosa rarissima, che non si guarisca radicalmente.

§. 7.

E Gli è talora necessario, quando l'infermo non vuol sottomettersi alla regola, che gli si prescrive, nè prendere i rimedj, che gli si ordinano, ricorrere alle minaccie ed alle battiture, come lo provò benissimo il Sig. Consigliere Ritcher, già mio maestro in Medicina, in uno scritto da lui pubblicato in tale materia,

ria ; ed accade sovente che le semplici minaccie facciano sull'animo dell'ammalato un'impressione tale , ch'egli poi fa quanto gli si prescrive , e guerisce . Parlerò nella terza Parte della melancolia e della mania , che accompagnano spesso i morbi isterici , ed ippocondriaci , come pure della melancolia delle donne incinte .

o)-----o

CAPITOLO IV.

Della Rabbia .

§. 1.

Coloro per la maggior parte , a' quali accade di essere morsi da un cane , un gatto , o altro tale animale arrabbiato , sono sul campo , o qualche tempo dopo che il veleno si è comunicato al sangue , sorpresi dalla tristezza e dalla melancolia ; diventano inquieti , ed agitati fuor di modo , e finalmente la rabbia s'impadronisce di loro , onde mordono tutto ciò che trovano , ed imitano il gridare di quell'animale , da cui furono morsi . Hanno un timore , ed un'aversione per l'acqua e per tutti i liquidi , dimanicachè quando si reca loro da bere , o vengono costretti a prendere qualche bevanda , cadono in terribili convulsioni , comechè abbiano per altro una gran sete . In fine muojono essi fra convulsioni spaventevoli .

§. 2.

Contro questa terribile malattia un solo finora è il rimedio , che si conosca , e questo si è il Mercurio , di cui si è fatto lo spe-
ri-

rimento in America, in Parigi, ed in Londra, e che io medesimo ho da poco tempo in quà adottato nella mia pratica.

§. 3.

SI può adoperare in varie guise, mescolarlo con sugna, e stropicciarne bene le articolazioni delle braccia e de' piedi, come si pratica pel morbo venereo, o darlo in bocconi, dopo averlo preparato, e raddolcito, ma eccita un flusso di bocca inutile, e che punto non contribuisce alla guerigione del male. Ecco il modo, con cui io me ne servo. 1. Quando un uomo è stato morficato da un cane, o da tal altro animale arrabbiato, io principio dal lavare la piaga con aceto, oppure, se non ho aceto, con vino ed acqua, o con orina. 2. Della sera all' infermo, quando va a letto, una presa delle mie gocciole mercuriali nell' infusione di fiori di sambuco, o in altra somigliante pozione, e gliene faccio bere alcune tazze, affinchè la notte traspiri. Proseguo a dargli una presa di dette gocciole mattina e sera per venti giorni consecutivi, nè per suo nutrimento gli do altro, che acqua di riso, d' orzo, o di tritello di vena, e qualche volta a pranzo della carne di vitello, dei legumi, e dei latticinj, e per bevanda dell' infusione di melissa, o della decozione di bacche di genepio, o di legno santo. Che se l' ammalato non può prender nulla di liquido, gli do le pillole Mercuriali del Cap. I. n. 4.

CA-

SOTTO nome di Letargia generalmente si intende ogni qualunque sonno, o sopore contro natura. Ven'è di tre spezie, tutte più forti, e più pericolose l'una dell'altra. La prima è quella, in cui l'infermo cade improvvisamente in sì profondo sonno, che quando viene svegliato, rimane mezzo addormentato, e come stupido. La seconda è più forte, e più pericolosa, perchè l'ammalato nel risvegliarsi sembra privo di tutti i suoi sensi, di maniera che se chiede da bere, e gli si presenti il bicchiere, non si ricorda più di quanto ha chiesto, e di nuovo si addormenta. Egli ha una leggier tosse, le mani gli tremano, feroce è il suo sguardo, e debole ad un tempo, i suoi escrementi sono verdicci, torbide le urine, e spesso pischia senz' accorgersene. Non chiede da bere, e quando si desta non si duole, se non di un dolore nel collo, e d' un tintinnio negli orecchi, ed interrogato non risponde altro che sì, o no. La terza specie è quella, in cui l'infermo dorme tanto profondamente, che stenta molto a risvegliarsi da se medesimo, e sembra che abbia la mente alienata.

LE cagioni di questa malattia sono non men varie di quelle del mal di capo, di cui ho parlato, e da esse convien prender regola nella cura. Ecco in generale la cura, che esigono que-

queste tre spezie di Letargia . 1. Se il soggetto è pletorico , gli si trarrà tosto sangue dal braccio , o dal piede , per trarre il sangue alle inferiori estremità , e sgombrare il capo . Gli si darà ogni giorno di due in due ore il serviziale del Cap. II. §. 4. aumentando la dose del sale , e se così esige il caso , si replicherà il salasso . 2. Se è stitico , gli si darà il detto serviziale , e in caso che abbia molte impurità nello stomaco , una presa d' ipecacuana , o la polvere emetica indicata nella Parte I. Cap. I. n. 5. Il vomito , ogniquale volta il soggetto è pituitoso , è anche salutare in questo male , non men di quello che è il salasso ne' soggetti pletorici . 3. Se nè l' emetico , nè i clisteri , nè il salasso possono liberar l' infermo dal suo letargo , gli si applicherà l' impiastro vescicatorio accennato nella Parte I. Cap. I. n. 10. o sulla nuca , o sui polpacci delle gambe . 4. Se ha febbre , gli si prescriverà la regola delle febbri acute indicata nella Parte I. Cap. II. e gli si darà mattina e sera una presa dello spirito glaciale di detta Parte I. Cap. I. n. 2. in qualche pozione rinfrescativa , sì prima ; che dopo dell' accesso . In vece dello spirito glaciale , può anche dargli di tre in tre , o di quattro in quattr' ore 20. grani di polvere antispasmodica , mescolata con altrettanto di salnitro ; semprechè però il soggetto sia adulto.

§. 3.

SI suole dalla maggior parte risvegliar l' ammalato con licori spiritosi , e fargliene anzi inghiottire , locchè è pericoloso sommamente ,

re, mentre obbliga il sangue a concorrere al cervello, e può così cagionargli una mortale apoplezia. A quest' effetto non v'è cosa migliore dell' aceto, come quello che di sua natura è risolutivo. Si può altresì applicar all' infermo una sanguisuga dietro l' orecchio. la quale produce sovente un ottimo effetto.

o) ————— o)

CAPITOLO VI.

Dell' Apoplessia.

§. 1.

SOTTO nome di Apoplessia s'intende ogni qualunque male, il quale privi l' infermo dell' uso de' sensi tanto interni, quanto esterni, e di ogni moto, non eccettuato neppur quello del cuore, e gli tolga improvvisamente la vita.

§. 2.

Questo male sopravviene talvolta tutto ad un tratto, senza essere prevenuto da alcun sintoma. Spesso ancora vien pronosticato parecchi giorni, ed anche parecchie settimane prima da vertigini, gravezze di capo, sopore, sminuimento di memoria, intormentimento in tutte le membra, incommodità, o pizzicore nelle dita, difficoltà di parlare, ed enfiagione della lingua, ed allora l' apoplessia colpisce nel mangiare, o dopo che si è mangiato. Chiudonsi gli occhi come se si dormisse, talora rimangono aperti, e fan paura a vedere; si russa, la paralizia s'impadronisce di qualche parte del corpo, e in questa guisa, oppur colla morte vanno a terminare tutte le diverse spezie di apoplessia. Due

o tre

o tre giorni dopo l' accidente il membro paralitico principia a gonfiarsi, e diviene affatto insensibile, quando la gonfiezza sopraggiunge unita ad un accesso di febbre. Se dopo passato l' accidente sussiste tuttavia la gonfiezza, l'ammalato resta impotente pel rimanente della sua vita.

§. 3.

Distinguonfi due sorte di apoplessia: l'una proviene da una ripienezza di sangue; l'altra da una soprabbondanza di pituità e di ferofità, che distende i vasi del cerebro, e gli fa crepare. Si riconosce la prima al rosso carico, che cuopre il volto e le giunture delle mani, ed alla forza del polso, sì prima, che dopo dell' accidente; e la seconda alla pallidezza e gonfiezza del volto, ed alla debolezza del polso. Questa differenza fa, che molti Medici si regolino anche diversamente nel curarle, e dicano, che nella seconda specie di apoplessia non si dee trar sangue all' ammalato, potendo ciò cagionargli la morte, e che nella prima gli si può cavar sangue senza rischio. Ma i Medici più sperimentati, senza fare alcuna differenza, cavano sangue egualmente nell' una e nell' altra apoplessia, perchè ne ignorano la specie, e perchè i contrassegni, che di sopra indicai, sono incerti, e possono ingannare.

§. 4.

LE indicazioni curative in questa malattia si riducono 1. A trar tosto sangue all' ammalato, in qualunque maniera, per alleggerire il capo

capo e il polmone, e restituire ai nervi il movimento, che han perduto. 2. A calmare la febbre, per timore che non cagioni alle volte un secondo accidente 3. A far cessare la paralisi, ch'essa ha cagionata.

§. 5.

TOstochè l'apoplessia si manifesta per via dei sintomi accennati nel precedente §. 2., convien cavare sul campo all'ammalato da 7. in 14. oncie di sangue, e dargli il clistere, che segue. Piglisi il quarto d'una pinta d'acqua calda, vi si faccia dentro disciogliere un pugno di sal marino, ed un mezzo bicchiere, o sei cucchiari di mièle, e sarà fatto il clistere opportuno. Se l'infermo non ricupera l'uso de' sensi mezz'ora dopo il salasso, e il clistere, gli si dia una forte dose della polvere emetica della Parte I. Cap. I. n. 5. in alquanto d'acqua tiepida, ovvero da 30. in 40. grani di polvere d'ipecacuanà, semprechè però egli sia adulto. Si corichi nel letto, e gli si faccia fiutare dell'aceto, o dello spirito glaciale. Se l'emetico non opera in capo a mezz'ora, e l'ammalato si ritrova sempre nello stesso stato, diaglisi una presa di spirito glaciale, Par. I. Cap. I. n. 2. in alquanto d'acqua; e indi a mezz'ora si tenti, se una seconda presa di polvere emetica, ed anche una terza, che nella presente circostanza può darsi senza rischio, possa farlo rinvenire, o no. Io ho spesso data in questa malattia una triplice dose di polvere emetica per far rinvenire l'ammalato; ma non bisogna omet-

mettere nè il salasso, nè il clistere. Se l' ammalato non rinviene dopo la seconda presa di polvere emetica, diaglisi di due in due ore una presa di spirito glaciale nell' acqua tiepida, oppure 10. goccioline di spirito di corno di cervo rettificato in un cucchiaro di miele, mezzo cucchiaro d' ottimo aceto, e un mezzo bicchiere d' acqua tiepida, e si replichi il salasso la sera. In caso che l' apoplessia continui, la mattina, o il giorno seguente, nel venir della notte gli si applichi un vescicatorio sulla nuca, o tra le due omoplate, Par. I. Cap. I. n. 10., e gli si dia ogni giorno il clistere, che dissi di sopra.

§. 6.

Trovandosi l' apoplessia accompagnata sempre da una febbre quotidiana, la quale, se non si calma, cagiona un secondo accidente in capo ad alcuni giorni, conviene nei tre primi giorni cavar all' infermo alcune oncie di sangue ogni sera, e dargli alternativamente di due in due ore, finchè sia del tutto cessata, la polvere febrifuga, e lo spirito glaciale, Par. I. Cap. I. n. 12. nel Tè non troppo carico, o nel brodo d' orzo, e la sera il latte di mandorle accennato nel Cap. V. §. 2. di detta Parte prima. In vece della polvere febrifuga, se gli può anche dare la polvere antispasmodica.

§. 7.

SE l' apoplessia è tanto ostinata, che l' infermo non rinvienga, malgrado il salasso, il clistere, e la polvere emetica, e possa temersi ch' egli muoja, conviene senza ritardo applicar-

cargli l'attual cauterio sulla nuca, e bruciar-
gli la pelle quanto è larga la mano, e se non
rinviene, fargli la stessa operazione al polpac-
cio della gamba, e lasciar poi suppurare la pia-
ga per quattordici giorni. Questa operazione sem-
bra crudelissima a coloro, che servono l'infer-
mo, perchè non riflettono, ch' essa è assolu-
tamente necessaria, e che nello stato, in cui
egli è, la vista di un ferro rovente non fa in
lui maggior impressione di quella, che faccia
la vista di una lancetta in chi è sano.

§. 8.

E' Pur anche necessario, fino al decimoquarto
giorno, finchè dura la febbre, che si diano
all' ammalato i rimedj anodini indicati di sopra,
e che gli si prescriua la dieta, di cui ho parlato
nel Cap. II. della prima Parte.

§. 9.

S E l' infermo si ritroverà con qualche membro
paralitico, si userà per guerirlo il metodo
seguente. 1. Dovrà giornalmente far uso di rimedj
aperitivi ed attenuanti, ed atti a rendere agli
umori la perdita lor fluidezza. Tra questi pos-
sono annoverarsi tutte le acque aggrete, ed
impregnate di particelle ferruginee, quali sono
quelle di Schwalbach, di Spà, e di Pyrmont;
le decozioni fatte col sambuco, col sassafrasso,
col legno santo, e mescolate con eguale quan-
tità di sciero di latte, che l' ammalato beverà
ordinariamente. 2. Riceverà ogni mattina un
bagno di vapore, e varie sono le maniere di
prepararlo. Si piglia una quantità grande di
grosse

grosse formiche, che si chiude in un sacchetto di tela, e si fa bollire in una sufficiente quantità d'acqua. Si mette poscia in una tinnozza, in cui si fa seder l'ammalato sopra uno scanho, e gli si lega attorno al collo una salvietta doppia, affinchè il fumo non gli salga alla testa: ovvero si prendono alcune oncie d'acquavita eccellente, che si mettono in un piat-ro, si accende l'acquavita, e si getta nella tinnozza, e se ne fa ricevere all'ammalato il vapore infinattanto che la parte offesa sia tutta molle di sudore. Allora si ripone in un letto ben caldo, e gli si dà la soprad detta pozione.

3. Per lo stesso effetto, gli si fregherà più volte il giorno la parte offesa con una flanella, o altro panno asciutto di lana, e se il bagno di vapore non produce effetto veruno, gli si faranno prendere i bagni caldi, ma in guisa però, che il loro calore sia moderato. 4. Egli prenderà mattina e sera nella sua bevanda una presa di spirito glaciale, oppure il seguente rimedio. Prendansi venti gocciole di balsamo del Perù, chiudansi nel mezzo d'un bianco d'uovo, e gli si faccia inghiottir ogni cosa la mattina a digiuno in un bicchiere di sciero di latte raddolcito con zucchero. Alcuni si servono felicemente dell'acqua di catrame, ed ecco il modo di farla. Si prende una libbra di catrame, si getta in una pinta d'acqua, e di quando in quando si va dimenando: in capo a due giorni si vuota in una, o due bottiglie, e poi se ne beve ogni mattina mezza pinta per qualche tempo. 5.

G

Con-

Convien far in modo, che l'ammalato vada ogni giorno del corpo, e questo si otterrà, mediante il elistere accennato di sopra.



CAPITOLO VII.

*Dei Catarri, delle Flussioni,
e del Catarro soffocante.*

§ 1.

Chiamasi Catarro soffocante quel male, che priva in un subito l'infermo d'ogni sentimento, d'ogni moto, e gli toglie il respiro. I segni, che lo annunziano, sono la raucedine, e il ristringimento improvviso delle fibre, della faringe, e della trachea, che toglie al polmone la comunicazione dell'aria, ed espone la persona al pericolo di rimaner soffocata.

§. 2.

Ecce la cura, che finora mi è paruta migliore rispetto a questa malattia pericolosa. 1. Convien cavar sangue all'ammalato, se è adulto, o prossimo ad esserlo. 2. Dargli una doppia presa di spirito glaciale, ed un'altra presa di due in due ore. 3. Unire al salasso il clistere indicato nel Cap. VI. §. 5. Con questo metodo mi è riuscito di guerir molti. Quando l'infermo è affatto fuor di pericolo, io lo purgo per alcuni giorni, e per alcune settimane gli fo prendere ogni giorno una mezza pinta di sciero di latte caldo.

§. 3.

OVe non bastasse lo spirito glaciale ed il salasso, io gli applico un vescicatorio, Par. I.

I. Cap. I. n. 10., sulla nuca, egli fo cavare per la seconda volta alcune oncie di sangue.

o)-----o

CAPITOLO VIII.

Delle Convulsioni, e de' Moti Convulsivi.

§. 1.

LA Convulsione è una contrazione violenta ed involontaria di uno, o di più muscoli del corpo, la quale fa, che la parte rimane per qualche tempo assiderata ed immobile: ma quando la contrazione è ineguale, irregolare, e successiva, chiamasi moto convulsivo. Feci menzione nel Capitolo XVI. della prima Parte, della Convulsione, e de' Moti convulsivi, e parlerò nella terza di quelli, che accompagnano le affezioni isteriche, ed ipochondriache.

§. 2.

INfinite, e variabili all' estremo sono le cagioni di questo male: ma può dirsi in generale, ch'egli può esser prodotto da tutto ciò, che cagiona un irritamento troppo violento nei nervi. Il mio Maestro in Medicina poc' anzi mentovato osservò molto bene, provenire la maggior parte delle convulsioni dalla ripienezza, o dal disseccamento de' vasi, e la prova di ciò si è il vederli, che le emorragie eccessive, l'uso troppo frequente del coito, come pure la troppo grande pletora, o sia la troppa abbondanza di sangue si traggono dietro le convulsioni. Egli è inutile il ricercarne la cagione. Dico adunque, che tutto ciò, che irrita troppo violentemente i nervi, può cagionare delle con-

§. 2

vul-

vulsioni . Per esempio un nervo mezzo tagliato , una caduta , un colpo nel capo , il veleno , i rimedj troppo violenti , i vermini nello stomaco e negl' intestini , la retrocessione delle mialtie cutanee , la cessazione de' menstrui , de' fiori bianchi , del flusso emorroidale , la ripercussione della podagra , del reumatismo , il calcolo delle reni e della vescica , un parto cattivo e difficile , un improvviso spavento , la collera , un' allegrezza eccessiva in coloro , che sono di gracile temperamento , ed hanno i nervi deboli .

§. 3.

QUando le convulsioni son cagionate da una violenta emorragia , o dall' usar eccessivamente colle donne , e dallo svaporamento degli spiriti vitali , io procuro di prevenire le emorragie coi mezzi accennati nel Capitolo delle emorragie e delle perdite di sangue , e vieto all' ammalato di aver commercio col sesso . 2. Per riparare gli spiriti vitali , gli prescrivo alimenti leggieri , di buona sostanza , e facili a digerirsi , vi unisco il latte di vacca mescolato alle acque di weisseburg , e di Selz , sia per fortificare i nervi , sia per restituire al sangue quella consistenza , che ha perduta .

§. 4.

SE procedono dalla plethora , e dalla fermentazion troppo grande del sangue , e degli umori , io gli fo cavare , secondo che l' età sua e le sue forze il permettono , da sei in quindici oncie di sangue dal braccio o dal piede , gli proi-

proibisco l'uso delle carni, del vino, e de' liquori forti, e gli prescrivo quella regola medesima, che ho prescritta per le febbri acute.

§. 5.

SE provengono da impurità contenute nello stomaco, e negl' intestini, io le evacuo per mezzo di purganti dolci.

§. 6.

SE son prodotte da un colpo, da una caduta, o da una piaga nel capo, principio dal cavar sangue all' infermo dal braccio; replico la stessa operazione il giorno seguente, quando le convulsioni non cessano, e gli do di due in due, o di tre in tre ore una presa della mia polvere febrifuga sedativa, Par. I. Cap. I. n. 1., o un' egual dose di polvere antispasmodica, nell' acqua di fior di tiglia, o nell' infusione di melissa, e gli prescrivo per qualche tempo la stessa regola, che per le febbri acute. Lo stesso metodo si deve tenere, quando le convulsioni procedono da un nervo mezzo tagliato, e in oltre gli si deve dare una dose sufficiente del mio balsamo vulnerario, Par. I. Cap. I. n. 12., o di olio d' uovo, e metterne alquanto nella piaga, dopo averlo fatto intiepidire. Se poi non cessano le convulsioni, io taglio del tutto il nervo, e mi servo per medicar la piaga del balsamo vulnerario.

§. 7.

SE sono esse cagionate da veleno, da un purgante, da un emetico, o somigliante altro rimedio violento, io gli dò immantinentemente, se

sono in grado di farlo , del contravveleno , e procuro di scemarne il vigore con fargli inghiottire dell' olio , del latte , dell'acqua tiepida , &c .

§. 8.

SE son prodotte da' vermini alloggiati nello stomaco , o negli intestini , adopero la mia polvere purgativa , Par. I. Cap. I. n. 6. , o altro simile vermifugo mescolato con qualche droga purgativa .

§. 9.

SE procedono da retrocessione di qualche malattia cutanea , da soppressione o sia cessazione de' menstrui , de' fiori bianchi , del flusso emorroidale , &c. , si terrà il metodo , che indicai nel Cap. H. §. 9.

§. 10.

AD.literò nel Capitolo , in cui tratto del Calcolo delle reni , e della vescica , quel che si dee fare , quando le convulsioni sono cagionate dall' una o dall' altra di queste due cose .

§. 11.

PArlerò di quelle delle donne incinte , e delle puerpere nella quarta Parte nel Capitolo , in cui tratto delle malattie , alle quali e le une e le altre sono soggette .

§. 12.

LE violenti passioni , come sono la collera , la paura , la tristezza e l' allegrezza eccessiva , bastano spesso a produrre convulsioni nelle persone di temperamento debole , come dissi di
so-

sopra. Le loro fibre si contraggono, e s'irritano a segno, che gli spiriti animali entrano in un movimento tumultuoso, ed agitano con violenza quelle parti, alle quali concorrono. Questa debolezza di temperamento può essere ereditaria, o acquistata. Niente è meglio, per calmare queste sorte di convulsioni, della polvere febbrifuga sedativa indicata nella Parte I. Cap. I. n. 1., o della polvere antispasmodica, di cui si darà all'ammalato una presa di due in due ore, finchè sieno esse cessate, nella infusione di cammomilla, o in altra somigliante. Se poi esse continuassero, gli si darà una presa della mia Essenza corroborativa contro le affezioni isteriche, Par. I. Cap. I. n. 8., oppure, se è adulto, 16. goccioline di spirito di corno di cervo nel Tè, o nell'acqua. Calmate che faranno le convulsioni, egli prenderà mattina e sera, per un mese, ed anche più, una presa della mia polvere febbrifuga contro le febbri fredde, Par. I. Cap. I. n. 13., o veramente 60. grani di polvere di scorza di china, e 5. grani di polvere di *Serpentaria di Virginia* nel Tè, o nel vino. Cavalcherà spesso, o salirà in caleste, mangerà poco per volta, e si asterrà da tutti gli alimenti grassi, oleosi, pesanti, salati, riscaldanti, e difficili a digerirsi.

§. 13.

SE le convulsioni sono prodotte dal ritardo de' menstrui, nelle femmine di temperamento debole, si trarrà loro sangue dal braccio, o dal piede, si prescriveranno loro i pe-

G 4

di-

diluvj, e i bagni di vapore, e si daran loro, finchè i menstroi abbiano ripigliato il loro corso, le pillole aperitive e corroboranti indicate nella Parte II. Cap. I. n. 1. , facendole bere dietro una leggiera infusione di melliloto, o sia ferrula campana.

o) ————— (o

CAPITOLO IX.

Dell' Epilepsia, ouvero Mal Caduco.

§. 1.

L' Epilepsia, detta pure da alcuni Mal Caduco, è una spezie di convulsione violenta, che colpisce improvvisamente, e fa cader l'ammalato, con lesione de' sensi interni ed esterni. Alcuni gridano, hanno la schiuma alla bocca, stringono e digrignano i denti, altri orinano, e van del corpo, senz' accorgersene, e quando riavengono in lor medesimi, rimangono sommamente infiacchiti, e quasi stupidi.

§. 2.

Viene in taluni preceduta l' Epilepsia da certi segni, i quali son quasi i forieri dell' accesso, ed ai quali uno non può ingannarsi. Fra questi possono annoverarsi la gravezza di capo, la vertigine, un dormire inquieto ed interrotto, un tremito, ed un tremore in tutto 'l corpo, la palpitazione di cuore, la malinconia, e l' inquietudine, la fiacchezza nella maggior parte delle membra, la crudezza dell' orina, lo sbadigliar frequente, i moti convulsivi nelle membra, &c.

§. 3.

§. 3.

LE cagioni dell' Epilepsia sono le stesse che quelle delle convulsioni, e de' moti convulsivi, e alcune di esse possono distruggerli, massime ne' giovani e ne' fanciulli, ne' quali vien ordinariamente prodotta da umori acri, o da' vermini contenuti nello stomaco, e negl' intestini. In caso che i sopra indicati rimedj non bastino a guerirli, si darà loro, per alquanti mesi, mattina e sera una presa della mia polvere febrifuga, Par. I. Cap. E. n. 13., in un po' d' acqua, o di vino, oppure della scorza di china, come ho detto nel Capitolo precedente §. 11. Trovansi infermi, ai quali 10. o 40. grani di Castorio in polvere nell' infusione di cammomilla fanno un gran bene, massime quando sono soggetti alle affezioni ippocondriache, ed isteriche. Altri sperimentano un beneficio notabile nel prender l' olio animale di *Dippels*, di cui si danno all' ammalato ogni giorno da 10. in 15. gocciole nell' infusione di cammomilla ..

o) ————— (a)

CAPITOLO X.

Della Vertigine.

§. 1.

LA Vertigine è un' affezione degli occhi, e de' nervi ottici, la quale fa, che tutti gli oggetti sembran girare, e sembri altresì girare la persona stessa, cosicchè vacilla sovente, e cade per terra.

G. S.

G. S.

§. 2.

LE principali cagioni di questo male sono la troppa ripienezza de' vasi del cervello, o degli occhi, o una febbre, o simile altra malattia violenta, onde avviene, che il sangue e gli umori concorrono al cervello in quantità maggiore di quel che dovrebbero, oppure l'effetto della bile, della piuita, &c., di cui lo stomaco si trova carico più del dovere.

§. 3.

I Mezzi più acconci a diminuir la pletora, e ad isgonbrare i vasi degli occhi, sono i reiterati salassi, i pediluvj frequenti, i clisteri coll'olio, coll'acqua, e col sale, ed una dieta rinfrescativa, agretta, e di poco nutrimento. Se il male procede da debolezza, o da disordine dello stomaco, il che si può arguire dalla qualità de' cibi, che l'infermo fu solito mangiare, dalle nausee, dall'inapetenza, e dai dolori di stomaco, ch'egli sente, io lo persuado 1. a prendere per due giorni consecutivi, mattina, e sera, prima di mangiare, una presa di spirito glaciale, Par. I. Cap. II. n. 2. nel Tè non molto carico, o nell'acqua, o invece di esso, venti grani di sale ammoniaco mescolato con eguale quantità di nitro depurato, per discioglierlo, ed attenuare i mucchi, e le impurità contenute nello stomaco, e nel secondo, o nel terzo giorno, la mattina a digiuno, una presa della mia polvere emetica, Par. I. Cap. I. n. 5. nell'acqua tiepida, oppure da 25. in 35. grani d'ipocacuana in polvere mes-

cor.

colata con 10. grani di sale d' assenzio . Se poi l' ammalato non fosse in caso di poterli valere della mia polvere emetica , egli prenderà in vece di essa , per tre giorni consecutivi , la polvere purgativa indicata nella Parte I. Cap. I. n. 6. , o altro simile leggier purgante , e poscia , mattina e sera , finchè sia guerito , la mia polvere febbrifuga , Par. I. Cap. I. n. 13. , o veramente un' egual dose di polvere di scorza di china , osservando la regola prescritta nel Cap. II. §. 7.

○) ————— ○

CAPITOLO XI.

Dello Svanimento , o Deliquio .

§. 1.

LO svanimento , o deliquio è una debolezza , da cui è sorpreso un uomo in un subito , o gradatamente , con diminuzione notabile delle azioni vitali ed animali , accompagnata da un polso fiacco e languente , da un respiro quasi insensibile , da una freddezza nelle mani e nel volto , da un gelido sudore , e da una privazione di cognizione .

§. 2.

FRa il Deliquio , e l' apoplezia passa questo divario , che in questa gli occhi per l' ordinario rimangono aperti , ed hanno un non so che di stravolto , e di fiero , che il polso è alterato , la respirazion forte , e il volto rosso , e gonfio , dove nel deliquio il volto è pallido , il polso debole , e gli occhi si chiudono , come se lo svenuto fosse morto .

§. 6.

§. 3.

§. 3.

LE ordinarie cagioni di questo accidente sono tutte le passioni violente, come la collera, la paura, lo spavento, e gli odori troppo forti, massime ne' soggetti ippocondriaci, o isterici, l'odor del carbone, un affaticamento violento di corpo, o di spirito, le perdite di sangue considerabili, le impurità, i vermini, le ventosità racchiuse nello stomaco, e negl' intestini, &c.

§. 4.

QUando sopraggiunge quest' accidente, non occorre far altro, se non far odorare all'ovenuto dell' aceto, dello spirito di corno di cervo, del castorio, della mia essenza corroborante contro i vapori isterici, e fregargli le mani ed i piedi con un caldo pannolino. Se poi questi rimedj non operano, gli si darà il clistere del Cap. VI. §. 5., ed una presa della mia essenza corroborante. Ricuperati ch' egli avrà i suoi sentimenti, si indagherà la cagione, che produsse il deliquio, e si procurerà di rimediarvi.

o) ————— (o)

CAPITOLO XII.

*Del Mal. de' Denti, e delle Malattie
delle Gengive.*

§. 1.

LE cagioni dei mali di denti, la violenza de quali cresce a segno di produr febbre, e convulsioni, sono in generale la infiammazione del perioistio, di cui sono rivestiti, o l'irrita-

rita-

ritamento de' nervi , che penetrano nella loro sostanza , che vien cagionata dal tarlo , dall' umidità dell' aria , dall' acrimonia degli alimenti e delle bevande , che si adoprano , o dalla retrocessione di qualche male cutaneo . Può ancora il mal di denti essere cagionato dall' umore di un' altra malattia , come sarebbe la convulsione , il reumatismo , la podagra , come pure dall' irritazione di quegli altri nervi del corpo , che simpatizzano con quelli dei denti .

§. 2.

IL mal di denti procedente dall' infiammazione è accompagnato da un acuto , cocente , e profondo dolore , e talvolta dall' enfiagione delle gengive . Questa infiammazione può calmarli col salasso , coi frequenti pediluvj , e col mezzo delle cose emollienti , come sarebbe a cagion d' esempio la cammomilla cotta nel latte , quando si lava la bocca , o quando questo rimedio non opera , lo spirito di vino , o il vin caldo , in cui siasi fatto bollire della salvia , del rafano , o della scorza di china . Se poi l' infiammazione non cede , bisogna farsi cavar il dente in tempo opportuno , per impedire che non si generi della marcia , la quale poi roda l' osso della mascella . Indipendentemente dai topici accennati , l' ammalato può prendere di quando in quando una presa di polvere antispasmodica , o di polvere febrifuga anodina , Bar. I. Cap. E. n. r. , nel Tè non molto carico , o nell' acqua tiepida , avvertendo di astenersi da alimentis e bevande , che possano riscaldarlo .

§. 3.

§. 3.

SE il mal di denti proviene da retrocessione di qualche male curaneo, o dell' umore del reumatismo, della podagra, &c. il quale si sia gettato sul nervo del dente, convien cercare di trarlo alle estremità inferiori per mezzo de' pediluvj, de' clisteri emollienti composti con olio, acqua, e sale, o di trarlo fuori con le copette, o coi vescicatorj tra le omoplate, o coll' uso de' rimedj attenuanti e sudorifici, come sarebbe per esempio l' essenza sudorifica dello Stalh, che si mescolerà con egual quantità di goccioline minerali anodine Hoffman, e di cui si daranno ogni giorno da 30. in 47. goccioline all' ammalato nel Tè, ovvero le mie goccioline febrifughe anodine, Par. I. Cap. I. n. 4.

§. 4.

SE il dente è del tutto tarlato, e il nervo rimane allo scoperto, conviene o farlo cavare, o distruggere il sentimento del primo, ed impedire che il tarlo non cresca. Perciò si metterà dentro il buco del dente alquanto di cotone bagnato nell' olio di garofano, o di majorana, oppure si piglierà un pezzetto di legno, o una penna, se ne avvilupperà la punta con un po' di cotone, che si bagnerà nell' olio di vitriolo, e che si applicherà sopra il luogo tarlato, avvertendo bene di non metterne sulla gengiva, il che fatto converrà sciacquare la bocca con vino caldo, acquavita, o acqua calda, e questa operazione si replicherà, insin tanto che il nervo sia morto, e tolto in-

reramente via il tarlo. Alcuni Dentisti adoperano l'attual cauterio per far morire il nervo. Tolto che si è interamente il tarlo, convien chiudere il buco del dente con un pezzetto di cera, o di piombo, o di radice di zedoaria, o di genziana, per impedire che non v'entri l'aria, e tarli il rimanente del dente. Coloro, che vogliono conservare i loro denti, deono sciacquarsi la bocca con acqua tiepida dopo di avere mangiato, nettarli con uno stuzzicadenti, e fregarli di quando in quando con orzo o caffè abbrustolito, o con qualche altra polvere, la quale non sia nè troppo acre, nè troppo aspra. §. 5.

LE gengive soggiacciono a certe malattie, che esigono una speciale attenzione. La prima si è la corruzione, la quale non tarda ad impadronirsi dei denti, e che si riconosce al color livido e verdiccio delle gengive, alla facilità, con cui n' esce del sangue, ed alla puzza del fiato. Questa malattia è molto comune in coloro, che soggetti sono alle affezioni isteriche, o che hanno il sangue scorbutico, o che trascurano di lavarsi la bocca. Essa però non richiede, se non cose detergenti, e corroborative, per esempio si farà bollire nel vin nero della scorza fresca ed interna di quercia, vi si aggiugnerà del miele, e si laverà la bocca due volte il giorno, o veramente si piglierà un' oncia di elettuario rosato, la stessa quantità, o il doppio di elettuario di coclearia, mezz' oncia di sangue di drago, ed altrettanto di goc-
ciole

ciò minerali di Hoffman, se ne freggheranno mattina e sera le gengive, e si risciacquerà la bocca con vin nero ed acqua calda.

§. 6.

UNa seconda malattia delle gengive assai frequente è una certa specie d'infiammazione, e di tumore, a cui gli Svizzeri danno il nome di *wurmbaus*. Questa è pericolosa, qualora dura lungo tempo, mentre la materia acre contenuta nel tumore rode l'osso della mascella. Toftochè uno si accorge di avere uno di questi tumori nelle gengive, convien lavarsi la bocca con latte caldo, in cui si sia fatto bollire dei fiori di cammomilla, ed un poco di zafferano, o con latte semplice, a fine di farlo maturare, e poscia applicarvi sopra un fico cotto ancor caldo per farlo crepare, o se questo non basta, si forerà colle forbici, o colla lancetta, e si laverà la bocca con infusione di salvia, di miele, e di vino, per nettare la piaga. Non parlerò della fistola delle mascelle, mentre questa richiede assolutamente il soccorso del Cerusico.

§. 7.

LA terza malattia, a cui soggiacciono le gengive, è un'escrescenza di carne, la quale non tarda molto a corrompersi. Questa non esige altro, che la pulizia, e i rimedj accennati nel §. 5.

§. 8.

NUlla dico delle ulcette, che sopravengono talvolta nella bocca, o nel palato, e che sono prodotte dall'acrimonia degli
una-

umori, che vi si attaccono, o da un riscaldamento, perciocchè già ne ho parlato nel Capitolo VII. della prima Parte.

○)—————(○

CAPITOLO XIII.

Del Tintinnio d' Orecchio, e della Sordità.

§. 1.

LE cagioni di queste malattie non sono nè men numerose, nè meno varie di quelle dei mali di capo, onde si parlò nel Capitolo II. di questa seconda Parte. Ora provengono esse da un cumulo di serosità nei piccioli vasi sparsi nelle membrane dell' orecchio, o dal cerume, che vi si accumula: ora da piccole ulcere, che si formano nella sua cavità, cosa assai ordinaria nel mal venereo: ora da un' infiammazione, o da un rumore, come si è veduto Par. I. Cap. XXXII: ora dalla gravidanza, dalla cessazione del flusso mensile o emorroidale, da un' ulcera eterna, che si è troppo presto saldata: ora dalla materia, che produce la podagra, il reumatismo, le convulsioni, dalla pletoia, da ripienezza di stomaco, da una caduta, da un colpo ricevuto nel capo, &c.

§. 2.

Riesce spesso volte difficilissimo lo scoprire la cagione di queste malattie, come pure il rimediarvi, quando si è conosciuta. In tal caso convien tenere il metodo seguente, che per se stesso non ha nulla di pericoloso, 1. Bisogna procurare per quanto si può di sgombrar dal cervello il sangue, e gli umori, che vi si sono

ac-

accumulati, e di trargli alle estremità inferiori, il che si otterrà ne' soggetti pletorici mediante il salasso del piede, le sanguisughe applicate all'ano, o dietro gli orecchi., oppure con far loro delle scarificazioni alle spalle, e purgarli, se son ripieni di umori, col mio sal glaciale, o con la polvere purgativa indicata nella Par. I. Cap. I., o con altro simile purgante usitato, o veramente con applicar loro i vescicatorj tra le due omoplate. 2. Convien diminuire la tensione troppo grande de' vasi dell' orecchio con topici attenuanti ed emollienti, introdurvi dentro per mezzo di un imbuto il vapore del latte caldo, mettervi alcune goccioline d'olio caldo di mandorle dolci, o di iperico, coprirlo con cotone, e reiterare questi rimedj più volte il giorno. Se queste cose non operano, si farà uso del fumo dell'aceto, o vi si applicheranno sopra alcune erbe aromatiche, cotte nel vino, e chiuse dentro una tela. 3. Si adopreranno, per discioglier de' detti umori, e trarli alle estremità inferiori, i rimedj interni attenuanti e purganti, i migliori de' quali sono in questo caso le acque agrette, la decozione di legno santo, le mie pillole aperitive e corroboranti contro le malattie ippocondriache ed isteriche, indicate nel Cap. I. n. 1.

§. 3.

IL tintinjo d' orecchio, e la sordità eziandio non derivano spesso da altra cagione, se non dal cacume, che vi si è accumulato. In questo caso conviene ammolirla con latte caldo, o
olio

CAPITOLO XIII. 163

olio di mandorle dolci , di cui si fan penetrar nell' orecchio alquante gocciolate . Non operando poi questi rimedj , si farà discioglierne del sapone di Venezia nell' acqua tiepida , e dopo averne bagnato l' orecchio , se n' estrarrà l' immondizia con uno stuzzicaorecchi , o colle mollette .

§. 4.

SE questi mali procedono dalla stessa cagione , che il raffreddore , si applicherà sull' orecchio dell' ammalato una taschetta ripiena di polvere di fior di sambuco calda il più che sia possibile , e gli si farà di quando in quando masticare una cubebe , per farlo salivare , e scaricar l' orecchio di quell' umido , che vi si è accumulato . Sono alcuni , che masticano un granello di pepe bianco , oppure un pezzetto di tabacco .

o)-----o

CAPITOLO XIV.

Della Raucedine .

§. 1.

A Tutti è noto questo male , onde è inutile il deffinirlo . Generalmente vien cagionato dall' aridità troppo grande delle membrane , de' muscoli , e degli organi , che servono a formare la voce .

§. 2.

F Requentissimo egli è questo male nelle febbri acute , e nella peripneumonia , e spesso volte tien dietro alle febbri fredde , che sono state mal curate . E' altresì molto comune nei
fog-

foggetti ipocondriachi ed isterici , in coloro , che furono infetti di morbo venereo , ne' quali ultimi è male incurabile , perchè proviene dalla consunzione dell' ugola , e finalmente nelle persone pletoriche , nelle quali è prodotto dalla ripienezza de' vasi di queste parti . E' facilissimo il diventar roco nella state , quando il caldo è violento , e quando regna una gran siccità , come pure quando si bee ghiacciato , o si canta o si grida per lungo tempo .

§. 3.

Trovandosi d' ordinario la raucedine unita ad altra malattia , ed essendone per così dire una conseguenza , può avvenire , che si confonda con questa , o che sussista da per se stessa , e in questo caso conviene andar bevendo qualche cosa di rinfrescante , e di unet-
tante , come farebbe della macilaggine di co-
tognò , con siroppo d' altea : nella febbre di
raffreddore , del siroppo squillitico , del brodo
d' orzo , o di tritello di vena , e quando vi è
la pletora , convien cavar sangue all' amma-
lato dal braccio , o dal piede , a proporzione
dell' età sua e delle sue forze . Generalmente
parlando , si possono per la raucedine adoperare
gli stessi rimedj , che si adoperano per la tosse
ostinata .

CAPITOLO XV.

Della Tosse.

§. 1.

Sono infinite le cagioni della Tosse. Può essa procedere da altra malattia, per esempio da una pleurisia, da una peripneumonia, dal vajuolo, dalla rossolia, da un'idropisia di petto, dall' affezione isterica &c., ovvero dalla retrocessione della materia della traspirazione, la quale si rigetta sul polmone, o sull' asperarteria, da un odore, o da un vapor troppo forte, dalle impurità dello stomaco, e da moltissime altre cagioni. In una parola, tutto ciò, che irrita i nervi dell' asperarteria, de' polmoni, del diafragma, e di quelle altre parti, i nervi delle quali hanno qualche corrispondenza con quelli del petto e de' polmoni, può cagionare la tosse.

§. 2.

Distinguesi la tosse in umida, ed in asciutta. Nella prima si sputano molte flemme più o meno spesse; nella seconda non si sputa mai, o assai di rado. Evvi una terza spezie di tosse convulsiva e spasmodica, che si chiama *ferina*. Sopraviene questa per via, direi quasi, di accessi, nei quali si tosse talvolta con violenza tale, che ne vien suscitato il vomito.

§. 3.

Per giugnere a guerire la tosse, convien sapere, se abbia essa la sua cagione nel petto, o nello stomaco. Nel primo caso il respiro è d'ordinario difficile, e l' infermo si sforza a tof-

tosse , per liberare i polmoni e l' asperarteria dalle materie , che l' imbarazzano . Nel secondo , il respiro non è già libero affatto , ma l' infermo ha spesso dei mali di cuore , e dei desiderj di vomitare , e sente nella région dello stomaco , o nell' uno o nell' altro lato del basso ventre una tensione , ed una gravezza .

§. 4.

Ecco in generale come si dee rimediare alla tosse . 1. Convieni prima di tutto procurar di agevolare la circolazione del sangue nel polmone per via del salasso nel braccio , o nel piede , massime quando pletorico è il soggetto . 2. Si dee liberare il petto dagli umori , ond' è sopraccarico . 3. Calmare l' eccessiva irritazione de' nervi del petto . Nulla tanto giova a sgombrare il petto , quanto i pediluvj , i clisteri emollienti d' acqua , olio , e sale , le fregagioni a' piedi con panni di lana asciutti , i purganti leggieri , quali sono la manna , i tamarindi , le follicule di senna , o il mio spirito glaciale , Par. I. Cap. I. n. 9. , e i clisteri emollienti . Si calmerà l' irritazione del petto e dell' asperarteria con acque cotte d' orzo o di tritello di vena , olio di mandorle dolci , in cui si stempererà una quarta parte di spermaceo , e che si raddolcirà a piacimento con siropo di bismalva o sia altea . Se ne darà di quando in quando all' infermo un cucchiajo da caffè , e gli si farà bere dietro qualche pozione rinfrescativa ed anodina , come sarebbe per esempio l' infusione d' unghia di porco , o tussilagine ,
di

di clano bianco , e di fior di riglia , &c. Quando l'irritazione è violenta , può darglisi la sera nell' andar a letto una presa delle mie gocciole anodine , o due grani d' estratto di cinoglossa nel Tè . Se poi la tosse va unita con febbre , convien prescrivere per qualche tempo all' infermo la stessa regola , che per le febbri acute , come ho detto nel precedente Capitolo , e farlo astenere dalla carne e dai licori forti . Se la tosse è cagionata da una pleurisia , o da una peripneumonia , converrà in tutto regolarfi a norma delle istruzioni ; che ho date nella prima Parte di quest' Opera . Passerò ora a discorrere della cura delle altre differenti specie di tosse .

§. 5.

Quando la tosse è prodotta da umori freddi , acri , e viscidì , che si gettano sul polmone , ed irritano i nervi del petto , come è il solito nei vecchj e nei valerudinarij , si deve :
 1. per attenuar detti umori e renderli fluidi , dar all' infermo due o tre volte il giorno da 12. in 20. gocciole di spirito di sal ammoniac aromaticizzato con anici , o una presa di spirito glaciale , Par. I. Cap. I. n. 2. in una chiacchiera di Tè pettorale , fatto col fico , coll' uva secca , col fiore di ruffilaggine , coll' orzo mondato , e col zucchero , oppure in una leggier decozione di legno fatto , di regolizia , e di fichi secchi , e fargliene bere sopra alcune chiacchere . Puossi in vece di dette gocciole , fargli prendere qualche volta il giorno un cucchiarino
 del

del seguente siroppo . Prendansi due oncie d' olio di mandorle dolci , venti grani di zafferano ben mondato , una dramma di balsamo nero del Perù , un' oncia di siroppo d' altea , ed altrettanto di siroppo di semenza di papaveri . Io mi sono spesso servito felicemente , per attenuare questi umori acri , e corrotti , dell' acqua cordiale seguente , in vece dell' acqua di catrame . Si prende un buon manipolo di resina d' abete , che sia ben dura , e ben seccata , si pesta in un mortajo , e le si versa sopra a poco a poco una pinna d' acqua fredda , si agita questa sovente , e in capo a 24. ore , riposata che sia l' acqua , si mette nelle bottiglie , e se ne dà un bicchiere di tre in tre , o di quattro in quattr' ore all' ammalato , dopo averla fatta intiepidire . Quando gli umori saranno sufficientemente attenuati , convien dare all' infermo ogni mattina un lieve purgante , per esempio tanto di rabbarbaro polverizzato e di panacea , quanto può capire sulla punta d' un coltello , o della manna messa in infusione co' tamarindi : e 3. per tutto il tempo che durerà la tosse , vietargli l' uso della carne , del vino , e de' licori forti . Se l' ammalato sarà pletorico , ed avrà la febbre , si potrà principiare dal cavargli sangue dal braccio o dal piede , e gli si darà ogni giorno un serviziale emolliente . Se non ostante la regola testè accennata , la tosse non cede , e s' egli non sputa , io lo consiglio a prendere per quattordici giorni , e più , se bisogna , mattina e sera , una presa della mia
pol-

polvere febrifuga contro le febbri fredde, o la melesima quantità di scorza di china nella sua bevanda, o in alquanto di siroppo di cedro o d'arancio, per fortificar il polmone, e calmare l'irritazione, che preva.

§. 6.

SE la tosse procede da un umor acre, acquoso, e falso, che irriti le membrane del palato, dell' asperarteria, e del polmone, si seguirà il metodo indicato di sopra nel Cap. XVIII. §. 5., all' articolo della tosse, che accompagna le febbri di raffreddore, si daranno all' ammalato dei clisteri, per conservargli il ventre libero, e la sera qualche pozione calda per promuovergli la traspirazione. Per bevanda gli si prescriverà la decozione menzionata nel precedente paragrafo, ovvero dell' acqua di lenicchie, di linseme fresco, mescolata con manna, o brodo d' orzo. Che se si può avere una rapa, si pelerà questa, si farà enocer nell' acqua, se ne spremerà il sugo, e si bevèrà con alquanto di zucchero, o di miele. Se la tosse non cessa in capo ad alcuni giorni, si darà la sera all' ammalato una presa delle mie goccioline anodine, Par. I. Cap. I. n. 7., nella sua bevanda, o due grani di pillole di cinoglossa. Quando poi questi rimedj riuscissero inutili, gli si darà la mattina il latte indicato nella Par. I. Cap. XVIII. §. 5., nel quale si metterà mattina e sera una presa della mia polvere febrifuga contro le febbri fredde, Par. I. Cap. I. n. 13., ovvero della scorza di china.

H

§. 7.

§. 7.

SI terrà lo stesso metodo per la tosse convulsiva de' giovani e de' vecchi, che succede ad una febbre acuta e maligna, e per tutto quel tempo ch' essa durerà, si vieterà all' infermo l' uso delle carni, qualunque possa essere la loro specie.

§. 8.

QUanto alla tosse *serina*, cagionata da vermini alloggiati nello stomaco e negl' intestini, si darà all' ammalato per alquanti giorni, mattina e sera, la mia polvere febrifuga anodina, Par. I. Cap. I. n. 1., o un' egual dose di polvere antispasmodica mescolata con polvere di corallo nel Tè non troppo carico, e poscia una presa della mia polvere purgativa, Par. I. Cap. I. n. 6., o altro tale vermifugo mescolato con qualche droga purgativa. Se i vermini non escono alla prima presa, converrà dargliene una seconda presa nel dì seguente, oppure gli si farà bere per quattordici giorni l' acqua di Schwalbach, o altra somigliante acqua agresta e ferruginea.

§. 9.

SE quest' ultima specie di tosse procede da retrocessione di qualche umore morbifico, del reumatismo per esempio, della podagra, &c., dopo cavato sangue all' infermo dal braccio, gli si metterà un clistere d' acqua, olio, e sale, gli si faran bagnare i piedi nell' acqua tiepida, e bere molta decozione di legno santo mescolata con latte di vacca. Se la tosse continua
con

con la medesima violenza, gli si applicherà un vescicatorio, Par. I. Cap. I. n. 10. sulla nuca, e si lascerà purgare la piaga tanto quanto durerà la tosse. La regola poi ha da essere la stessa, che per le febbri acute.

§. 10.

QUanto alla tosse, a cui soggiacion coloro, che sono esposti al fumo, alla polve, ed al calore, altro non deve farsi, quando sono pletorici, ed hanno la febbre, se non cavar loro sangue, e lavar loro la bocca con pozioni emollienti e dolcificanti fatte coll' acqua e col latte, col legno santo, colla bismalva, colla radice di regolizia, coll' orzo, col tritello di vena, &c.

§. 11.

LA tosse di stomaco è un male assai comune, e facile a conoscersi ai falli, che si sono commessi nel tenor di vivere, ai mali di cuore, ed ai vomiti, ond' è accompagnata. Si può altresì conoscere, ch' ella risiede nello stomaco, e non nel polmone, quando ordinandosi all' infermo di respirare con forza, questi lo fa senza tossire, e quando la tosse cessa per qualche tempo dopo ch' egli ha vomitato. Ecco qual cura si richiede a questa sorta di tosse. 1. L' ammalato prenderà due volte, l' una dietro l' altra, nell' andar a letto, il sugo di un cedro, e tanto di sal d' assenzio, quanto può capirne sulla punta d' un coltello, oppure 20. grani di sal ammoniaco, o una presa della mia polvere febrifuga anodina, Par. I. Cap.

H 2

I. D.

I. n. 1., nel Tè leggero, o nell' acqua, per discioglierle le materie nello stomaco contenute. 2. Fatta questa preparazione, prenderà la mattina a digiuno una presa della mia polvere emetica, Par. I. Cap. I. n. 5. o un' egual porzione di polvere d' ipecacuana nel Tè, o nell' acqua. 3. Per impedire che la tosse non ritorni, si varrà per qualche tempo per fortificarli lo stomaco dei mezzi indicati nel Cap. II. §. 7., senza contravvenire alla regola, che ho prescritta.

§. 12.

PEr curare felicemente ogni qualunque specie di tosse, conviene prima di tutto rivolgersi a guerire la febbre, o la malattia, con cui la tosse è complicata, e non essere meno esatto in curare la malattia principale, che nel curar l' accessoria.

§. 13.

RAgionerò nel Capitolo seguente della pulmonia, della tosse, da cui questa malattia, come altresì le ulcere del polmone sono accompagnate. Quella, che proviene dalla debolezza di questo viscere, è del pari incurabile ne' giovani e ne' vecchi. Rispetto alla tosse isterica ed ipocondriaca, è incurabile dopo i 50. anni; ma può calmarli coll' uso quotidiano della mia essenza corroborante contro le affezioni isteriche, Par. I. Cap. I. n. 8.

CAPITOLO XVII

Della Emoptisia, o sia Sputo di Sangue.

§. 1.

LO sputo di sangue è sempre accompagnato dalla tosse, e preceduto da un' oppressione di petto, da un calor vago, e da un pizzicore nella gola. I segni, che l'annunziano, sono l'inquietudine, la palpitazione di cuore, la difficoltà del respiro, un dolor acuto, ed una tensione nell'uno o nell'altro lato del petto, la roffezza delle guancie, ed un calor divorante in tutto il corpo. Il sangue, ch' esce di bocca all' ammalato, è di un rosso pallido, e spumoso, dove quello, che vien dallo stomaco, è di un rosso carico.

§. 2.

Questa malattia è cagionata dalla lesione de' vasi del polmone, che può procedere da varie cagioni, per esempio da una tosse violenta ed ostinata, da una troppo grande plethora, da una caduta, da un colpo ricevuto nel petto, da sforzi fatti in gridare, in cantare, in leggere, dalla compressione del collo, dalla freddezza o dall' umidità dell' aria, dall' eccessiva agitazione dello spirito, dall' improvvisa cessazione de' menstrui, o del flusso emorroidale, da un flusso di sangue dal naso troppo continuo, dalla cattiva struttura del petto, &c.

§. 3.

PEr quanto egli sia leggiero lo sputo di sangue, sempre però formidabili ne sono le conseguenze, perchè annunzia una pulmonia, ma

H 3

quan-

quando egli è violento, può in un tratto far morir l'ammalato .

§. 4.

QUando alcuno principia a sputar sangue , se gli deono immediatamente cavare da 7 . in 15 . oncie di sangue dal braccio o . dal piede , e se è pletorico , replicare nel dì susseguente il salasso fino a due volte . 2 . Si dee procurare di sgomberare il petto per mezzo di un clistere emolliente composto d' acqua , olio , e sale , e per mezzo de' pediluvj . 3 . Trovandosi d' ordinario questo male unito con febbre , convien dargli ne' primi giorni , finchè dura la medesima , di due in due ore , una presa della mia polvere febrifuga anodina , Par. I. Cap. I. n. 1 . , o un' egual dose di polvere antispasmodica mescolata con polvere di corallo rosso nell' acquacotta d' orzo , Par. I. Cap. VIII. §. 3 . Cessata la febbre , e cessato lo sputo di sangue , convien vedere , se resti ancora del sangue nel polmone , il che si conoscerà dall' oppressione del petto , e dalla difficoltà di respirare , e in questo caso si medicherà l' infermo per qualche tempo , come se fosse affetto di pulmonia .

§. 5.

QUanto alla regola , che deve osservare insin tanto che dura lo sputo di sangue , farà esattamente quella stessa , che ho prescritta nel Cap. II. della prima Parte , e in oltre procurerà che il basso ventre faccia ogni giorno le sue funzioni . Egli dovrà pure tenersi esente

sente delle passioni, ed astenersi dai rimedj, dalle bevande, e dagli alimenti, che potessero riscaldarlo.

o) ————— (o

CAPITOLO XVII.

De' Tumori Cistici del Polmone.

§. 1.

Alla lesione de' vasi del polmone vien dietro qualche volta una congerie di marcia in alcuna delle sue cavità, la quale si trova racchiusa in una membrana, il che le ha fatto dare il nome di Tumor Cistico.

§. 2.

LA grossezza di questo tumore è varia, e contiene talora una marcia acre, e talora una marcia lodevole, talvolta egli è solo, e talvolta si ritrova accompagnato da altri piccoli tumori della natura medesima.

§. 3.

Queste spezie di tumori son d'ordinario accompagnati da una tensione nel petto, dalla difficoltà di respirare, da una tosse asciutta, da un calore, e da un freddo transitorio dopo di avere mangiato, e verso la sera dalla rossezza delle guancie, da un dolore acuto nella cavità del petto, massime nell'ispirazione, e dalla difficoltà di star lungo tempo coricato sull'uno o sull'altro fianco. Si conosce la sede del tumore dalla guancia, che appar rossa, ma meglio ancora dal dolore, che si sente nel lato del petto, in cui è, e dal maggiore o minor incomodo, che si prova nello star cori-

H 4.

eato.

cato fu d' un fianco piuttosto che sull' altro . La guerigion dell' infermo dipende dalla maggiore o minore sollecitudine , con cui il tumore crepa , e si deterge . Ma egli è in istato pericolosissimo , ogniquale volta la febbre , e i sudori notturni , che l' accompagnano , gli tolgono il sonno , e le forze , e lo van consumando a poco a poco .

§. 4.

Questo male per lo più è incurabile , massime quando il tumore è grosso , imperciocchè o crepa e soffoca in fin tratto l' infermo , o lo getta nella pulmonia , o si dilata nella cavità del petto .

§. 5.

Allorchè si conosce la malattia ai sintomi sovraespressi , e quando il tumore non è molto considerabile , convien tosto far prendere all' ammalato il latte vaccino , ed unirvi i brodi d' orzo e di tritello di vena , per farlo venire a maturità , come pure l' esercizio dell' andar a cavallo o in vettura , per farlo crepare , affinchè la materia si evacui per l' asperarteria . Se questi mezzi operano , si prescriverà all' infermo la stessa regola , che per la pulmonia , finchè sia del tutto guerito . Se poi , dopo crepato il tumore , la materia venisse a dilatarsi nella cavità del petto , allora non si può più far altro , se non procurare alla detta materia un uscita , facendo col tre quarti un' apertura verso la spina del dorso tra la nona e la decima costa ,

CA-

CAPITOLO XVIII.

Della Pulmonia.

§. 1.

LA Pulmonia è un' ulcerazione del polmone, la quale a misura che cresce, viene accompagnata da una febbre letta, che in alcuni si manifesta anche fin da principio. Talora quest' ulcerazione succede in un solo dei lobi del polmone, e talora in amendue: nel primo caso l' infermo non può star coricato, e non sopra il lato offeso, nel secondo è costretto, se vuol respirare, starsene a sedere in letto.

§. 2.

Tali sono spesso volte le cagioni di questa malattia, che riesce difficile di conoscere a quando essa principia, mentre l' ammalato si duole soltanto di qualche difficoltà di respirare quando si affretta in camminare, o sale in luogo erto, di una fiacchezza nelle membra, di una voglia di tossire, massime nello svegliarsi la mattina, di un tremito e di un freddo transitorio, a cui succede un leggier calore. Cresce insensibilmente la tosse, più vischiosa, più giallicci divengon gli sputi, più difficile la respirazione, dopo che si è mangiato sopraggiunge la febbre, le guancie divengono più colorite, più inquieto il sonno, s' indeboliscono le forze, e il corpo perde la sua pinguedine. Si conosce che il male è giunto al suo maggior grado, quando gli sputi divengono più

H 5

abbon-

abbondanti e più coloriti, e vanno in fondo dell' acqua, quando la febbre si rende continua, i sudori crescono la mattina, e son seguiti da un flusso di ventre, e dal delirio, quando la voce divien roca, più difficile la respirazione, ed anforte, quando caggiono i capegli, si gonfiano le mani o i piedi, e quando si forma un encorema sopra la superficie dell' orina.

§. 3.

LE cagioni di questa malattia sono quelle medesime, che producono la rottura de' vasi del polmone. Tra queste si può riporre una tosse violenta, gli sforzi fatti in gridare, o in cantare, l' infiammazione di detto viscere, &c. perciocchè gettandosi il sangue nelle di lui cavità, vi marcisce, e forma un' ulcera nel luogo, in cui si ritrova.

§. 4.

LA guerigione di questa malattia riesce al sommo difficile, massime qualora non vi si rimedia assai per tempo. Ecco nondimeno la cura, ch' essa richiede. 1. Una dieta, che non solamente non nuoca all' ammalato, ma che contribuiscia ancora a mondare il polmone, ed a guerir l' ulcera, che vi si è formata. L' astinenza dagli alimenti, e dalle bevande, che riscaldano ed agitano il sangue, e l' uso del latte, dei brodi di riso, d' orzo, e di tritello di vena, delle frutta agrette, e delle erbe, onde si fan le minestre; e ne' giorni, che non prende il latte, della gelatina fatta col corno

corno di cervo, e coll'avorio; per bevanda poi si servirà dell'acqua di selz mescolata col latte di vacca, o collo sciero di latte, o dell'acquacotta fatta con radice di china, anici stellati, e foglie di papavero rosso. E' utile ancora, quando fa bel tempo, che l'ammalato prima di mangiare passeggi ogni giorno alquanto a cavallo, o in vettura, non essendovi cosa migliore di quest'esercizio per detergere, e fortificar il polmone, dove l'esercizio a piedi gli è contrario, massime se è un po' violento. Egli deve scegliere per sua abitazione un luogo asciutto, e che respiri un'aria alquanto crassa, anzichè un luogo elevato, in cui l'aria fosse più sottil e più penetrante.

2. Tostochè l'infermo ha degl'indizj, o delle prove sicure di essere assalito dalla pulmonia, deve osservare ogni mattina a ventre digiuno la dieta prescritta di sopra, e prendere la sera verso le quattr'ore una presa della mia polvere febrifuga contro le febbri fredde, o un'egual dose di polvere di scorza di china nel seguente latte, o nell'acquacotta, e bervi dietro una foglietta, o una pinta del seguente latte. Prendansi di foglie di rosa rossa secche, e di fiori di melograno selvatico quanto se ne può prendere con tre dita, la stessa quantità di scorza di pomo granato secco, e tanto di polvere di canella, quanto può capirne sulla punta d'un coltello, si faccia bollir ogni cosa in una pinta di latte di vacca, e appena principierà a bollire, vi si getti dentro un cucchiara di ac-

qua fredda, e si tolga via la schiuma, finchè più non ne faccia: allora si coli a traverso d'una tela, e si adoperi come dissi testè. Se l'infermo è pletorico, bisogna prima di adoperare questo rimedio, cavarli sangue dal braccio, o applicargli una o due sanguisughe all'ano, massime se fosse soggetto alle emorroidi. Rispetto alle donne maritate, i menstrui delle quali sono cessati innanzi tempo, si può loro cavar sangue dal piede, e far lo stesso nell'ardore della malattia, se la febbre è forte. 3. Per calmare la tosse e la febbre, l'ammalato prenderà di quando in quando la sera nel coricarsi un'oncia, o un'oncia e mezza di siroppo di papavero bianco, e poscia una chicchera d'acquacotta tiepida. Se la febbre non è molto grave, e la tosse è violenta, egli beverà ogni giorno di due in due ore un bicchiere del acquacotta cordiale del Cap. XIV. §. 5. o in vece di questa dell'acqua di catrame. 4. Se si avvede di ricevere nocumento dalla dieta bianca, la interromperà per alcuni giorni, e farà uso del rabbarbaro in polvere, prendendone sulla punta d'un coltello, e mescolandolo nel brodo, e così inghiottendolo innanzi di prender il suo cibo, sì la mattina, che la sera. Può eziandio in vece del rabbarbaro prendere un'oncia di manna, e poi ridursi di nuovo al latte, e in vece di quello, che indicai poc' anzi, attenersi a quello di vacca, o di asina, mescolato con due terze parti d'acqua di selz, 5. Se gli sopraggiunge

una

CAPITOLO XVIII. 181

una diarrea, il che è un pessimo segno, si faran bollire alcuni pugni di pan bianco senza lievito nell'acqua, e converrà dargliela tiepida in vece della solita acquacotta; e se non cessa la diarrea, gli si darà la sera nell'andata a letto una presa delle mie goccioline anodine, Par. I. Cap. I. n. 7., nell'acquacotta. Se poi il male è ancor pertinace, gli si darà il mio balsamo elvetico, di cui si possono veder l'uso e le proprietà in un libretto stampato in Zurich dall'Heidegger, sotto il titolo di scoperta di alcuni rimedj contro la consunzione, e le ulcerazioni de' polmoni.

o)—————(o

CAPITOLO XIX.

Dell' Asma, o sia difficoltà di respirare

§. I.

TRe sole propriamente sono le sorte d' Asma, mentre la difficoltà di respirare procedente dall' infiammazione della gola, del palato, o dai tumori della gola, non merita questo nome. La prima specie d' Asma, di cui qui si tratta, è la *Dispnea*, o sia una difficoltà di respirare minore che nell' asma medesima. La seconda è una grande difficoltà di respirare unita al ruffare ed al soffiare. La terza è una oppressione tanto grande, che non si può respirare salvo stando a sedere o in piedi, avvegnachè si faccia altresì ruffando o soffiando,

La

§. 2.

LA seconda specie è la più frequente, e mena spesso alla terza. Le cagioni di questo male tanto variano, quanto quelle della tosse, ed han fra di loro molte cose comuni.

§. 3.

L'Asma è spesso cagionata dalla plethora, dalla cicatrizzazione immatura di un'ulcera vecchia, dalla retrocessione della traspirazione d'un male cutaneo, della podagra, del reumatismo, &c. Sono molti, ne quali essa viene a poco a poco. Si sente, quando si cammina alquanto in fretta, o si sale un luogo erto, una difficoltà di respirare, delle ansietà, delle palpitazioni di cuore, un acceleramento, un' interruzione, ed una ineguaglianza nel polso. Questi sintomi si manifestano nel tempo stesso, che la malattia, ed insensibilmente crescono a segno, che non respirar può, salvo stando in piedi.

§. 4.

PER ben riuscire nella cura di questa malattia, conviene applicarsi seriamente a conoscere tanto la cagione, quanto la natura. Erattanto ecco ciò, che si dee fare. 1. Si principierà dal dare all'ammalato un clistere d'acqua tiepida, con un poco d'olio e di sale, che si replicherà, ove faccia d'uopo. 2. Passato il primo accesso, se l'ammalato sarà pleutorico, e di vivace colore, gli si trarrà sangue dal braccio, e gli si faranno bagnare i piedi nell'acqua tiepida, dopo avervi messo dentro

al-

CAPITOLO XIX. 183

alcuni pugni di sale e di cenere di bucco, e per isgombrargli più presto il petto, gli si freggheranno i piedi con una salvietta calda finchè sieno affatto rossi. Se proseguirà a respirare con difficoltà, gli si applicherà sulla pianta de' piedi il topico indicato nella Parte I. Cap. VIII. §. 2., o. un vescicatorio sul polpaccio delle gambe. 3. Per inumidirgli il petto, gli si farà bere in copia dell'acquacotta fatta con bismalva, réglizia, e gramigna, e gli si ungerà il petto con unguento di bismalva, di altea, o altro simile, avvertendo di applicarvi sopra una salvietta calda. 4. Quando l'ammalato rende per bocca molto viscidume, conviene dargli di due in due ore una presa di spirito glaciale, Par. I. Cap. I. n. 2., o da §. in 20. goccioline di spirito di sale ammoniacco aromatizzato con anici nella sua acquacotta dolcificante.

§. 5.

SE questa malattia è prodotta da flemma, converrà regolarla come ho detto nel precedente paragrafo, ovvero in vece dello spirito glaciale, si darà all'ammalato di quattro in quattro, o di cinque in cinque ore un cucchiario colmo della seguente pozione, e fargli bere dietro parecchi bicchieri d'acquacotta leggera, fatta con l'agliaria, con l'isopo, e col marrobbio bianco. Si prendano due oncie di sugo fresco di scolopendre, tre oncie di miele, un' oncia di ottimo aceto, e da 80. in 100. goccioline di spirito di sale ammoniacco, e si mes-

184 L'ARTE DI CURARSI DA SÈ:

mescoli ogni cosa insieme. Un altro rimedio buono egualmente si è lo stemperare in un bianco d'uovo un quarto d'oncia di gomma ammoniac, versandovi sopra sei oncie di acqua di melissa, 8 di fior di tiglia, ed un' oncia di siroppo squillitico. Quando la materia è sufficientemente attenuata, ed il respiro è divenuto più libero, convien evacuarla per alcuni giorni consecutivi colla manna, col sabbarbaro, o col mio sal glaciale, Par. I. Cap. I. n. 9., e per prevenire le ricadute, far uso dell'acqua di crescione di fontana seguente, o tutta sola, o mescolata ad eguale quantità di sciero di latte. Si piglia del crescione di fontana la quantità che si vuole, si pesta in un mortaio, si mette nel lambicco, e si distilla a fuoco lento. La prima e second' acqua, che sen'estrae, si conserva, e si getta via la terza. Delle due prime bevete una o due chicchere ogni mattina a digiuno a piccioli sorfi.

§. 6.

SE l'Asma procede da alcuna di quelle cagioni, che producono la tosse, si userà la cura, che ho prescritta per quest'ultima malattia.

§. 7.

Sesso questo male non proviene da altro, se non da una traspirazione interrotta nella primavera, e nel principio dell'autunno, a cagione dell'alternativa subitanea del freddo, e del caldo, e in questo caso non conviene

CAPITOLO XIX. 185

viene altro fare, se non dare di quattro in quattro ore all'ammalato una presa delle mie goccioline febbrifughe anodine, Par. I. Cap. I. n. 4., o la medesima quantità di essenza allessifarmaca di Stahl, mescolata con le goccioline minerali anodine di Hoffman, in una leggier infusione d'agliaria, e la sera, specialmente se vi è febbre, una presa di spirito glaciale. Convien pure fregarli i piedi con una salvietta calda, e dargli un clistere emolliente.

§. 8.

Procedendo l'asma de' vecchi dalla siccità delle fibre de' polmoni, e dalla pituita, di cui sono sovraccarichi, non si può loro dare niente di meglio del rimedio preparato colla gomma ammoniacca, accennato nel precedente §. 5., e l'idromele tiepido.

§. 9.

LE persone, che soggiacciono a questa malattia, deono fuggire tutti i luoghi umidi, valersi di alimenti leggieri e ben conditi di spezie, non andare al passeggio, quando han mangiato, se non dopo fatta la digestione, non cenare la sera; o mangiar pochissimo, e non bere a pasto vino, che non sia mescolato con due terzi d'acqua. I ricchi, che hanno lo stomaco debole, possono ogni anno, avanti la primavera, o nell'autunno, bere ogni mattina a digiuno una mezza bottiglia, o una bottiglia d'acqua di selz per quattordici giorni, e gli altri prendere della limatura di ferro in

un

un elettuario amaro, Cap. III. §. 7., e bervi dietro alcune chicchere d' infusione di agliaria. Quando il soggetto è di temperamento pletorico, deve farsi trar sangue ogni anno nella primavera e nel autunno. Rispetto a coloro, che hanno molta pituita e molto acido nello stomaco, devono purgarsi di due in due, o di tre in tre mesi.

o) ————— (o

C A P I T O L O XX.

Della Palpitazione di Cuore.

§. 1.

LA palpitazione di cuore ha luogo ogniqualvolta questo viscere, contraendosi più presto, e con più forza del solito, prova dalla parte del sangue una resistenza, o riceve una quantità di questo fluido, maggiore di quella, ch' egli possa distribuirne ne' vasi del corpo.

§. 2.

E' Facilmente cagionata da un moto alquanto veloce, da una passione violenta, e da tutto ciò, che mette il sangue in troppo movimento, massime in coloro, che hanno i nervi deboli, da un sangue vischioso e denso, da un polipo nel cuore, dai mucchi, che si formano nello stomaco, dalla troppa ripienezza de' vasi, de' polmoni, o di altro somigliante viscere del basso ventre, dalla cattiva consumazione del petto, da un' idropisia di questa parte, da una congerie d' acqua nel pericardio, &c.

Qua

§. 3.

QUando violenta è la palpitazione, il polso divien disuguale, ed intermittente, l'ammalato soggiace ad ansietà e vertigini, a tremori, a convulsioni, ed a granchj nelle differenti membra del corpo.

§. 4.

SI può vedere, §. 2., il modo, con cui si deve curar questo male, secondo le cagioni, che lo producono, e si deve usar in esso ogni maggior attenzione, perchè d'ordinario non è, se non una conseguenza, ed un effetto di un' anterior malattia. In generale, chi è soggetto a palpitazioni di cuore, deve osservare un' esattissima regola, sia per mantenere il sangue, e gli altri fluidi in un movimento uniforme, sia per mortificare i nervi, e le fibre. Se è pletorico, deve farsi cavar sangue di quando in quando. Se il suo sangue è carico di pituita, il che facilmente si conosce dagli spurghi, deve purgarsi, per esempio con la mia polvere purgativa, o col sale glaciale indicato nella Parte I. Cap. I. n. 6. e 9., o con alcun altro de' soliti purganti, e far uso di bevande attenuanti, come farebbe sciero di latte, decozione di legno santo, &c. a fine di restituire al sangue, ed agli umori quella fluidezza, che han perduta.

CAPITOLO XXI.

*De' Polipi, e delle Concrezioni Polipose,
che si formano nel cuore.*

§. 1.

Chiamansi *Polipi* queste sorte di escrescenze per le filamenti, e le fibre, onde sono ripiene, e si formano o nella sostanza medesima del cuore, o nell' uno, o nell' altro de' suoi ventricoli. Ora formano una massa rotonda, ora una massa lunga irregolare, composta di flemma, e di sangue.

§. 2.

Si hanno prove sicure, che dette escrescenze si formano di flemma, e di sangue, quando questi fluidi vengono a perdere l' acquosa lor parte per un troppo lungo riposo, o per una troppo rapida circolazione. Possono esse anco a esser prodotte dalle cagioni stesse, che producono i detti effetti sulla massa del sangue.

§. 3.

E' Malagevole il conoscere questa malattia, tanto per l' incertezza de' suoi segni, quanto per la similitudine, che hanno con quelli degli altri mali del petto. Quando nonpertanto un uomo diviene a poco a poco soggetto a palpitazioni di cuore, massime di nottetempo, accompagnate da un polso irregolare, ed intermitente, quando i vasi del collo si gonfiano in guisa, che si distingue il loro battimento, quando la notte è inquieto, ed ha delle ansietà nella regione del cuore, se ne può conchiudere, che ha un polipo nel cuore, o ne-
gli

gli orificj dell' aorta . Dieci anni fa in circa mi fu rapito un amico da questa malattia : nello spazio di nove giorni gli si formò nel destro ventricolo del cuore un Polipo grosso come un uovo mezzano di gallina , che tuttavia conservo nello spirito di vino . Morì egli di apoplessia , e per nove giorni fu soggetto ai sintomi sopradetti . Dieci giorni prima che morisse godeva una salute tale , che niuno mai si farebbe dato a credere , che gli dovesse sopravvenire un tale accidente . Fu sorpreso tutto ad un tratto dalla sua malattia dopo un violento esercizio , per cui trovandosi affettato , bevette gran copia di birra annevata .

§. 4.

Non si è trovato ancora un rimedio atto a risolvere i polipi , che si forman nel cuore : questo però non fa , che non si debba procurare di recar sollievo all' infermo col mezzo della regola , e de' soccorsi dell' arte . 1. Convien trargli sangue quattro ; o cinque volte l' anno , dal braccio , o dal piede . 2. Convien vietargli l' uso della carne , e specialmente gli alimenti cotti , e nutrirlo di sole frutta , erbe , e radici da far minestre , proibirgli il vino , e i licori forti , e non dargli per bevanda , se non acqua , in cui sianfi fatte cuocere frutta agrette , oppure una decozione di melissa , di girasole selvatico , di radici , &c. Chiunque ha questo male deve sfuggire ogni esercizio violento , e tutto ciò , che può agitarli lo spirito .

CA-

CAPITOLO XXI.

Della Debolezza, e dello Sconvolgimento di Stomaco.

§. 1.

Dicesi che lo stomaco è debole, quando egli rigetta gli alimenti che riceve, qualunque sia la loro natura, o quando gli lascia evacuar per secesso, o quando non potendogli digerire, si inacidiscono questi, si corrompono, o si convertono in flemma. L' inappetenza proviene similmente dalla debolezza delle tuniche dello stomaco.

§. 2.

Si conosce che lo stomaco è debole, sconcertato, e fuori di stato di digerire gli alimenti, che riceve, ai vapori acidi e spiacevoli, che risalgono alla bocca dell' ammalato, alle flemme, che rende, ed all' aversione, che ha per gli alimenti.

§. 3.

Per restituire allo stomaco le forze, che ha perdute, conviene innanzi a tutto correggere, e sgombrarne le impurità in esso contenute.

§. 4.

Le materie acide e corrosive contenute nello stomaco, producono in generale una salivazione, dei vapori acidi alla bocca, una stitichezza pertinace, un appetito divorante, e fregolato per tutti gli alimenti acidi.

§. 5.

Nulla tanto giova a correggere gli acidumi dello stomaco, ed a fortificar questo viscere,

fcere , quanto il dare per alcuni giorni all' infermo la mattina a digiuno , una presa di spirito glaciale , Par. I. Cap. I. n. 2. ; nell' acqua o nel Tè , e poi l' elettuario amaro preparato colla limatura di ferro , indicato nel Cap. II. §. 7. In vece dello spirito glaciale si può comporre una polvere con eguale quantità di tartaro , d' occhi di gamberi , e di corallo , e dargliene a digiuno per due giorni , quanto può capir sulla punta d' un coltello , nel Tè , o nell' acqua .

§. 6.

QUando lo stomaco è molto carico di flemme , non così tosto ha mangiato l' infermo , che gli prende un vomito , ed una diarrea pituitosa , nella quale rimanda fuori gli alimenti prima di aver avuto il tempo di digerirgli .

§. 7.

QUando questo succede , convien dargli lo spirito glaciale , o venti grani di sale ammoniac nell' acqua , e poscia l' elettuario amaro , o la polvere contro le febbri felde , di cui nella Parte I. Cap. I. num. 13. In queste sorte di malattie si deve altresì far delle passeggiate , mangiar poco , e soltanto cibi asciutti , salati , e facili a digerirsi ; e bere delle limoncelle , ed acqua , in cui si sia stemperato del tartaro , o fatto cuocere delle frutta agrette , ed acidette .

Parte I. Cap. I. n. 6. e 9., o con un'oncia di sale di Sedlitz; e venti grani di rabbarbaro in polvere, massime se si tratta di un adulto. 2. L'ammalato prenderà, finchè sia cessato il suo male, mattina e sera a digiuno una presa delle mie pillole Elvetiche, aperitive e corroboranti, Cap. I. n. 1., o in loro vece, due cucchiarini dell'Elixir di proprietà di Paracelso, un'ora innanzi i suoi pasti, in alquanto d'acqua o di vino. 3. Si asterrà da ogni cibo crudo, freddo, ed indigesto, e da ogni bevanda, che potesse indebolire lo stomaco, non mangerà di diverse sorte di cibi in una volta, e procurerà di difendersi i piedi e il basso ventre dall'umido e dal freddo, e di fare del moto.

§. 12.

Accade spesso, quando è notabile la debolezza dello stomaco, che si perda l'appetito, senza però che vi si risenta verun dolore. Questa inappetenza è generalmente cagionata da un difetto di acido, e da una soverchia abbondanza di pituita. In questo caso l'ammalato deve regolarsi come ho detto nel §. 9., cavalcare, andar per vettura per luoghi sassosi, essendo questo esercizio molto acconcio a forificare lo stomaco, e gli altri visceri, e a sgombrarne gli umori, onde son carichi oltre il dovere. L'esercizio più salubre è quello, che si fa la mattina, e la sera prima di mangiare.

§. 13.

I Mucchj, che si formano nello stomaco, e che sono una conseguenza della sua debolezza.

lezza, cagionano un vomito, che si dee riguardare piuttosto come un beneficio della natura, che come un male. In vece di arrestarlo, devesi anzi provocare con bere del Tè o dell'acqua tiepida, finchè detti mucchj sieno totalmente venuti fuori. Per fortificarlo poi si prenderà di quando in quando prima di cibarsi uno o due cucchiari di Elixir viscerale di Hoffman in alquanto di vino o d'acqua, ovvero dell'elettuario indicato nel Cap. II. §. 7.

§. 14.

Questi medesimi mucchj, uniti alla debolezza dello stomaco, producono spesso dolori e granchj violenti. Questi granchj altro non sono, che una violenta contrazione delle fibre dello stomaco, simile a quella, che si prova quando si piega il corpo all'indietro. Questa contrazione è talor tale, che l'infermo sviene, e non può nè star in piedi, nè camminare.

§. 15.

Non sempre questi granchj di stomaco procedono dai mucchj, ond'è carico, procedono talvolta dalla materia d'un'altra malattia, quale sarebbe per esempio la retrocession della rognia, del flusso emorroidale, de' menstrui, dei fiori bianchi nelle femmine, da un accesso di collera, da vermini stanziati nello stomaco, da stitichezza, dal calcolo delle reni, da una traspirazione intercettata, da un raffreddamento de' piedi, da un'afezione isterica, da una suppressione di orina, da una risipola, da una collica, &c.

§. 16.

QUando detti granchj prodotti sono dai muc-
chj dello stomaco, convien regolarli come
ho detto ne' precedenti paragrafi. Se poi essi
procedono dai mali anzidetti, si adopererà quella
cura, che si prescrive negli articoli, ne' quali
dei medesimi si favella.

§. 17.

Chiunque vuol procurarsi un pronto sollievo
in questa malattia, deve prendere ogni
giorno una o due prese delle mie goccioline an-
dine nell' acqua, o nell' infusione di cammo-
milla, ed usare nel tempo stesso que' rimedj,
che possono fradicare affatto la cagione del
male. Per esempio se il granchio procede dagli
acidi, egli prenderà tosto una presa di dette
goccioline, ed un' ora dopo il rimedio indicato
nel §. 5. In vece di queste goccioline si possono
prendere da 4. infino a 20. goccioline di lauda-
no liquido d' Hoffman nell' acqua.

§. 18.

SI può tra le malattie dello stomaco an-
verare quell' appetito divoratore, a cui si
dà il nome di fame canina, e che non può
calmarsi mangiando, se non per alcuni mi-
nuti.

§. 19.

Questa malattia è per lo più cagionata da
umori acidi, acri, e corrosivi, contenuti
nello stomaco, talvolta da vermini, come ve-
dremo nel Capitolo, in cui se ne parla, tal-
ora pure dalla cessazione de' menstrui, e dall'

I 2.

af-

affezione isterica, o dall' aumento delle materie, che dallo stomaco passano negli intestini.

§. 20.

Richiedevisi, quando è cagionata dai mucchi, la cura indicata nel §. 9. E se procede dai vermini, si adopererà quella, che accennerò in appresso per disfracciarli.

§. 21.

Parlerò nella Parte seguente di quell' appetito depravato, che fa bramare, e mangiar cose incapaci di nutrire, come farebbe della terra, della creta, della calce, del gesso, dei carboni, della cenere, &c. appetito, a cui sono soggette le zitelle Clorotiche, come ancora le donne incinte, e le puerpere.

o) ————— o

CAPITOLO XXIII.

Del Vomito di Sangue.

§. 1.

ISegni, che annunziano il vomito di sangue, son quasi i medesimi, che quelli del vomito ordinario, cioè la nausea, una fiacchezza in tutte le membra, una gravezza di stomaco, delle ansietà nel petto, e la sete. L' infermo principia quindi a vomitare del sangue tutto puro, o mescolato con gli alimenti, o con la pittura, dopo del che i sintomi anzidetti si calmano, o sono seguiti da una sincope.

§. 2.

LE cagioni prossime di questo male sono la rottura di qualche vaso sanguigno dello stomaco, o la troppa ripienezza di essi vasi, che

che obbliga il sangue a rigurgitare nella di lui cavià .

§. 3.

MOlte cose possono contribuire a questa malattia , per esempio una forte pletora , le ostruzioni dei visceri , massime del fegato e della milza , un flusso di sangue dal naso impedito , la cessazione del flusso menstruale , che rende le femmine assai più soggette degli uomini a questo male . Si può altresì aggiugnere la troppa ripienezza di stomaco , l'uso eccessivo de' licori forti , le passioni violenti , i vomitivi e i purganti troppo attivi , gli alimenti acri , e corrosivi , da' quali viene affetta l'interna tunica dello stomaco . Può ancora essere cagionata da una ferita esterna , come pure dalla troppo grande dissoluzione del sangue , come succede nello scorbutto , nella seconda febbre del vaiuolo maligno , &c.

§. 4.

LA cura di questa malattia consiste ne' quattro punti seguenti : 1. nello sviare il sangue dalle parti superiori , e nel trarlo alle inferiori : 2. nel risolvere ed evacuare il sangue rappreso , che può essere rimasto nello stomaco : 3. in consolidare i vasi di detto visceri , o in far cessare la troppo grande loro tensione : e 4. in fortificarlo .

§. 5.

QUanto alla prima indicazione , quando il vomito di sangue è violento , conviene dopo il primo accesso trar sangue all' ammalato

lato dal piede, massime s'egli è pletorico. Se il vomito è cagionato da cessazione del flusso emorroidale, convien applicargli cinque o sette sanguisughe all'ano, fargli bagnar i piedi nell'acqua tiepida, fregarglieli poscia con un caldo pannolino, e dargli ogni giorno un clistere d'olio, sale, ed acqua tiepida. Si soddisferà alla seconda indicazione, facendo bere all'ammalato, dopo il primo accesso, acqua d'orzo tiepida in copia, nella quale si metterà quella quantirà d'aceto, e di miele, che si crederà opportuna. Non avendosi nè aceto, nè miele, si faranno bollire in una sufficiente quantità d'acqua delle ciriege, delle prugne, o dei pomi agretti secchi, e gliene farà bere. Cessato il vomito di sangue, ed attenuato sufficientemente il sangue, che può essere rimasto nello stomaco, si purgherà l'ammalato una, o due volte con un'oncia di manna, altrettanto di tamarindi, e 15. grani di rabbarbaro in polvere, infusa nell'acqua tiepida, o con una presa di sal glaciale, o con la polvere purgativa indicata nella Parte I. Cap. I. n. 6. e 9. 3. Se il vomito ricomincia di bel nuovo, si daranno all'ammalato di tre in tre ore 10. grani di corallo preparato, e di sangue di drago in polvere mescolato con 20. grani di nitro depurato, o una presa della mia polvere febbrifuga anodina, Par. I. Cap. I. n. 1. nel brodo d'orzo, o di tritello di vena, o nell'acqua vulneraria svizzera: vi si aggiungerà ogni giorno un serviziale d'olio, acqua, e sale,

fale, per conservargli il ventre libero, e gli si faranno bagnare ogni sera i piedi nell'acqua tiepida. 4. Dopo, che il vomito sarà cessato totalmente, per prevenire le ricadute, l'ammalato piglierà ogni mattina a digiuno per dieci, o quindici giorni, nello sciero di latte, o nel brodo d'orzo leggiero, una presa della mia polvere contro le febbri fredde, o in vece di essa, un' eguale quantità di scorza di china polverizzata.

§. 6.

GLi accennati rimedj sono egualmente buoni per tutti i vomiti di sangue, massime quando son questi cagionati dalla pletora. Se poi procedono da alcuna delle cagioni indicate nel §. 3., conviene, passato che è il primo accesso, rimediarvi nel modo che dissi. Nulla è più acconcio a toglier via le ostruzioni del fegato, della Panacea Elvetica contro l'idropisia, indicata nel Cap. I. n. 5.

. 7.

Chi è soggetto al vomito di sangue deve servirsi di alimenti fluidi, leggieri, e facili ad essere digeriti, e non vivere per qualche tempo, se non di brodi d'orzo, di riso, o di tritello di vena, &c., o di erbaggi, radici cotte, o di frutta agrette: deve astenersi dai licori forti, e bere soltanto cose atte a calmare, e dolcificare il sangue, come farebbe sciero di latte, acqua di selz, o altra somigliante acqua agretta leggiera, acquacotta fatta con radice di china, gramigna, legno

I 4.

fan-

santo, orzo, cedro, ciriegie, pomi, prugne, &c. Deve in oltre difendersi dal freddo, e dall'umido ai piedi, dalle passioni, in una parola da tutto ciò, che può agitare il sangue.

o)—————(o

CAPITOLO XXIV.

Della Diarrea, e del Flusso di Ventre.

§. 1.

LA Diarrea è un' evacuazione frequente, e copiosa di materia chiara, acquosa, mucosa, viscida, schiumosa, e biliosa degl' intestini, mescolata spesse volte con sangue.

§. 2.

E' Questa malattia per l' ordinario prodotta dal flemma, dagli acidi, e dagli altri mucchi contenuti nello stomaco, e negl' intestini, dai vermini, dalla retrocessione d' un male cutaneo, dal difetto di traspirazione, e dall' uso eccessivo di alimenti grassi, oleosi, ed acidi. Frequente è la Diarrea nella state, nel tempo delle pioggie, come anche nella primavera, perchè influendo i primi caldi sugl' intestini, gli obbligano a scaricarsi da per loro di quelle materie, che vi si sono ammucciate nel corso del verno. I vecchi, e coloro altresì, che soggetti sono all' emorroidi ed alla pittura, vengono spesso colti da una specie di Diarrea, la quale non ha punto che fare con quella, di cui trattiamo.

§. 3.

§. 3.

IN tre punti consiste la cura di questo male :
 1. in distruggere la cagione , che lo produce , ed in calmare la febbre , quando ve ne fosse : 2. in fortificar gl' intestini da esso indeboliti : 3. quando la Diarrea non vuol cessare , in evacuare per mezzo de' sudori l' umore , che la mantiene .

§. 4.

SE dagli escrementi si comprende , che la Diarrea sia cagionata dai mucchi degl' intestini , si daranno all' infermo ne' primi giorni due o tre prese della mia polvere febrifuga anodina , Par. I. Cap. I. n. 1. , oppure 20. grani di sale ammoniaco nell' acqua d' orzo , nell' infusion di melissa , di salvia , di veronica , &c. per discioglierli ed attenuargli , e la mattina seguente a digiuno una presa della mia polvere purgativa , o di sal glaciale , Par. I. Cap. I. n. 6. e 9. nel Tè non molto carico , il che è sufficiente ad uccidere i vermi , quando ve ne sieno : o veramente si piglierà un quarto d' oncia di rabbarbaro ben netto , un cedro tagliato in fette , e mezz' oncia di tartaro preparato , che si metterà in infusione in una mezza pinta d' acqua calda , e poi se ne daranno alcuni bicchieri tiepidi all' ammalato , la mattina a digiuno . Oltre a quanto ho finora prescritto , egli prenderà per alquanti giorni , mattina e sera , mezz' ora innanzi di cibarsi , per fortificare lo stomaco e gl' intestini , un cucchiarino del mio Elixir nervino ,

I 5

Cap.

Cap. I. n. 5., in alquanto d'acqua, o di vino, o in sua vece, un' eguale quantità di Elixir viscerale di Hoffman, o il doppio di effenza d'affenzio. Se la diarrea dura tuttavia, si procurerà, fregandogli spesso il ventre con un pannolino caldo, facendogli bere gran copia di infusione di sambuco, o dandogli una doppia presa delle mie goccioline febbrifughe anodine. Par. I. Cap. I. n. 4., o della polvere di Bezoar nel Tè, quando va a letto, di farlo traspirare, per isgombrar gl'intestini dagli umori acri, che gl'irritano. La regola dev'essere la medesima che quella del Cap. XXI. §. 11.

o) ————— (o)

C A P I T O L O X X V.

Della Dissenteria.

§. 1.

LA Dissenteria: è un flusso di ventre sanguinolento accompagnato da forti premiri, da dolori, e da tormini negl'intestini gracili, o nei grossi, o negli uni, e negli altri insieme.

§. 2.

Pincipia questo male dal tremore, e dal freddo, che vien seguito dal calore; sopraggiungono quindi dei dolori negl'intestini, accompagnati da un flusso di ventre pituitoso, e sanguinolento. Quanto più sanguinosi sono gli escrementi, tanto è più pericoloso il male.

§. 3.

§. 3.

LA dissenteria non è mai disgiunta dalla febbre, ma questa è più o meno forte nelle une, che nelle altre. E' questa febbre alle volte maligna, che toglie in un tratto all'ammalato le forze, e porta seco i sintomi stessi della febbre maligna, di cui parlai nella prima Parte. Talvolta cagiona all'infermo in capo a sei giorni, dolori, e convulsioni tali, che gli danno la morte.

§. 4.

LA dissenteria previen per lo più dalle materie acri, e corrosive, che, come osservammo, si ammucchiano negl'intestini la state, quando dopo i gran caldi tutto ad un tratto la stagione divien fredda, o quando dopo un inverno asciutto, sopraggiunge una primavera fredda ed umida. Oltre queste cagioni, molte altre ve ne sono ancora, che possono produrla. Fra queste si possono annoverare i cibi e le bevande riscaldanti, e soggette a fermentare. In generale, quando questo male è epidemico, come lo fu dieci anni fa, si può asserire senza rischio d'ingannarsi, che proviene o dalla costituzione dell'aria, o dai cibi e dalle bevande, onde si è fatto uso.

§. 5;

ECco come si deve curare la dissenteria ordinaria, quando non porta seco nè febbre acuta, nè febbre maligna. 1. Ad ogni menomo indizio, che appaja di febbre, conviene, se adulto è il soggetto, cavargli sangue dal braccio.

L. 6,

cio,

cio o dal piede, e se la febbre è forte, reiterare una o due volte la stessa operazione l'indomani. 2. Quando i dolori hanno la loro sede nella region superiore del basso ventre, e sono accompagnati da nausea e da vomiti, gli si darà, alcune ore dopo il salasso, una presa della mia polvere emetica, Par. I. Cap. I. n. 5., o da 20. in 30. grani di polvere d'ipocastano nell'acqua tiepida. Se i dolori si fanno sentire nella regione inferiore del basso ventre, e l'infermo non ha nè nausea, nè vomito, gli si darà una presa della mia polvere purgativa, Par. I. Cap. I. n. 6., nell'acqua tiepida, ed una seconda il dì seguente, oppure si metterà in infusione nell'acqua calda un'oncia di tamarindo, e due oncie di manna, e quando l'infusione sarà tiepida, si darà a bere all'infermo. Altri prendono da 20. in 30. grani di rabbarbaro polverizzato, ed una o due oncie di manna nell'acqua. 3. Quattro o cinqu' ore dopo ch'egli avrà preso questo purgante, in caso che i premiti e i tormini crescano, quando vuol andar del corpo, gli si darà una presa delle mie goccioline anodine, Par. I. Cap. I. n. 7., o un'oncia di siroppo di papavero bianco, nel Tè leggiero, o nell'acqua d'orzo, insin tanto che sieno calmati. E' bene anche aggiugnervi ogni giorno uno o due clisteri di tiepido latte. 4. Finchè la febbre e i tormini non sono calmati, non deve l'infermo valersi di altro nutrimento, nè d'altra bevanda, che di brodi di riso, d'orzo, di tritello di vena, di
scie-

fciero di latte dolcificato , o di acquacotta fatta coll'orzo mondato , bismalva , radice d'altea , &c. Si può quindi far cuocere un pane bianco nell'acqua , e quando questa sia raffreddata , mescolarvi un' eguale quantità *di vin rosso , e darne a bere qualche volta il giorno all' ammalato . Gli si applicherà di quando in quando sul basso ventre il cataplasma emolliente indicato nella Parte I. Cap. IV. §. 7. , e quando vorrà andar del corpo , si metterà in sulla seggetta con un bacino sotto pien d'acqua calda , affinchè il vapore calmi i suoi premiti . La camera da esso abitata non dev' essere nè troppo fredda , nè troppo calda ; anzi è bene aprirne ogni dì qualche volta le finestre .

§. 6.

SI può adoperare la stessa cura rispetto ai fanciulli , riducendo però la dose dei rimedj a segno , che sia adattata alla debolezza dell'età loro . Se la dissenteria è complicata con febbre maligna , vi si aggiungerà la cura , che ho indicata per le febbri catarrali maligne nella prima Parte di quest' Opera .

§. 7.

Commendano moltissimo alcuni , per la dissenteria epidemica , che non è accompagnata da febbre violenta il *vitrum antimonii ceratum* , e pretendono che alla terza presa , che per un adulto è di 4. in 5. grani , debba affatto cessare . Io non mi sono mai servito di questo rimedio in questa malattia , ma avendolo

solo dato in altre , osservai , che tanto certo , non n'è lo effetto quanto si dice , e che spesso volte produce un vomito violento . Quando la dissenteria non è molto forte , basta talvolta a fermarla il dare di due in due , o di tre in tre ore all' infermo due cucchiari di siroppo di seme di papavero , mescolato con tre parti d'olio di mandorle dolci , e fargli bere sopra del brodo d' orzo copiosamente , ma conviene prima purgarlo qualche volta col rabbarbaro .

6. 8.

S Pesse volte , dopo cessata la dissenteria , gl' intestini si trovano talmente indeboliti , che si riempiono d'aria , o veramente le tien dietro un flusso celiaco , che insensibilmente spoglia l' infermo delle sue forze . Nell' uno , e nell' altro caso il meglio , ch' ci possa fare , si è il prendere per alcuni giorni , prima di cibarsi , in un poco di brodo tanto di rabbarbaro polverizzato , quanto ne capisce sulla punta d' un coltello , e poi , finchè sia perfettamente guarito , due volte il giorno a digiuno , la mia polvere febrifuga , Par. I. Cap. I. n. 13. , o l' elettuario corroborativo del Cap. VIII. 4. 7. : beverà un po' di vin rosso quando mangierà , farà dell' esercizio , e si asterrà da tutti gli alimenti grassi , oleosi , e freddi . La dissenteria è sovente seguita da un reumatismo , quando non si ha la precauzione di purgar bene l' ammalato , e le materie acri contenute negl' intestini si mescolano nella massa del sangue . Quan-
do

ciò accade, bisogna usar la cura, che indicherò nel Capitolo del reumatismo.

o) ————— o

CAPITOLO XXVI.

Del flusso Celiaco.

§. 1.

Chiamafi passion Celiaca, o flusso Celiaco un flusso di ventre, in cui l'ammalato rende una materia bianca, acquosa, e viscida, o il chilo stesso confuso co' suoi escrementi, e che è accompagnato da tormini, come il flusso di ventre ordinario, e da una febbre lenta o continua..

§. 2.

Questa malattia viene spesso dietro alla dissenteria. . 1. Sopraviene a' fanciulli, che hanno vermini, e molta pituita negl'intestini. 2. Viene anche dopo una febbre quarrana mal curata, dopo un flusso epatico, un' ostruzione delle glandule, del pancreas, e degl'intestini, &c..

§. 3.

Quando proviene da una dissenteria, l'infermo deve prendere per più giorni prima di cibarsi, la punta d'un coltello di rabbarbaro polverizzato nel brodo, e poi per qualche tempo la mattina a digiuno un mezzo sestiere, o una foglietta d'acqua di Sewalbach, di San Maurizio, di Spà, &c.. sola, o mescolata con latte. Se il flusso non cessa, prenderà due volte il giorno, a digiuno, la polvere febrifuga indicata nella Parte I. Cap. I.

n. 13.,

folo dato in altre , osservai , che tanto certo , non n'è lo effetto quanto si dice , e che spesso volte produce un vomito violento . Quando la dissenteria non è molto forte , basta talvolta a fermarla il dare di due in due , o di tre in tre ore all' infermo due cucchiari di siroppo di seme di papavero , mescolato con tre parti d'olio di mandorle dolci , e fargli bere sopra del brodo d'orzo copiosamente , ma conviene prima purgarlo qualche volta col rabbarbaro .

§. 8.

S Pesse volte , dopo cessata la dissenteria , gl' intestini si trovano talmente indeboliti , che si riempiono d'aria , o veramente le tien dietro un flusso celiaco , che insensibilmente spoglia l' infermo delle sue forze . Nell' uno , e nell' altro caso il meglio , ch' ei possa fare , si è il prendere per alcuni giorni , prima di cibarsi , in un poco di brodo tanto di rabbarbaro polverizzato , quanto ne capisce sulla punta d' un coltello , e poi , finchè sia perfettamente guerito , due volte il giorno a digiuno , la mia polvere febrifuga , Par. I. Cap. I. n. 13. , o l' elettuario corroborativo del Cap. VIII. §. 7. : beverà un po' di vin rosso quando mangierà , farà dell' esercizio , e si asterrà da tutti gli alimenti grassi , oleosi , e freddi . La dissenteria è sovente seguita da un reumatismo , quando non si ha la precauzione di purgar bene l' ammalato , e le materie acri contenute negl' intestini si mescolano nella massa del sangue . Quando

ciò accade, bisogna usar la cura, che indicherò nel Capitolo del reumatismo.

o) ————— o

CAPITOLO XXVI.

Del flusso Celiaco.

§. 1.

Chiamafi passion Celiaca, o flusso Celiaco un flusso di ventre, in cui l'ammalato rende una materia bianca, acquosa, e viscida, o il chilo stesso confuso co' suoi escrementi, e che è accompagnato da tormini, come il flusso di ventre ordinario, e da una febbre lenta o continua..

§. 2.

Questa malattia viene spesso dietro alla dissenteria. 1. Sopraviene a' fanciulli, che hanno vermini, e molta pituita negl' intestini. 2. Viene anche dopo una febbre quarrana mal curata, dopo un flusso epatico, un' ostruzione delle glandule, del pancreas, e degl' intestini, &c..

§. 3.

Quando proviene da una dissenteria, l'infermo deve prendere per più giorni prima di cibarsi, la punta d'un coltello di rabbarbaro polverizzato nel brodo, e poi per qualche tempo la mattina a digiuno un mezzo sestiere, o una foglietta d'acqua di Sewalbach, di San Maurizio, di Spà, &c. sola, o mescolata con latte. Se il flusso non cessa, prenderà due volte il giorno, a digiuno, la polvere febbrifuga indicata nella Parte I. Cap. I.

n. 13.

n. 13., o un' eguale quantità di scorza di china . Se procede dai mucchj degl' intestini , si regolerà come ho detto nel Cap. XXIII. §. 4. Se ne son cagione i vermini , farà quanto prescriverò nel cap. XXII. in cui ne parlo . Se poi viene dall' ostruzione degl' intestini , adoprerà i rimedj , che indicherò per le ostruzioni delle glandule .

o)—————(o

CAPITOLO XXVII.

Della Lienteria .

§. 1.

LA Lienteria è un flusso di ventre , in cui si rendono gli alimenti crudi affatto , o mezzo digeriti , poco dopo che si son presi , e spessa volte con pramiti e con tormini . Chi n'è affalito ha un' sete ed un appetito , che lo divorza , talvolta dei granchj di stomaco , ed una febbre , che intensibilmente il consuma .

§. 2.

PARE che questo male provenga dal rilassamento delle fibre dello stomaco , il quale fa che non potendo digerire gli alimenti ricevuti , gli rende crudi , e tali quali si sono inghiottiti . Viene alle volte prodotto dalla infiammazione dello stomaco .

§. 3.

Questo male sopravviene in ogni età , ma più di tutti vi sono soggetti i bambini , che poppano . E' sempre pericoloso , massime negli adulti , quando vien dietro ad una malattia acuta , e degenera o in una consunzione , o in

in una idropisia . Dopo un flusso di sangue è ordinariamente mortale .

§. 4.

QUando proviene dalla debolezza , o dalla troppo grande distensione dello stomaco , altra cura non esige , se non la già indicata per fortificar questo viscere nel Capitolo XXI. §. 11. 13. , o un lungo uso delle acque minerali agrette , come per esempio di Scwalbach , di San Maurizio , o di Spà , delle quali si prendono due bicchieri la mattina a digiuno , e la sera verso le quattr' ore .

§. 5.

QUando questo male è prodotto da un' infiammazione , locchè molto raramente avviene , si curerà l' infermo nel modo , che dissi nella Parte I. nel Capitolo dell' infiammazione dello stomaco .

§. 6.

SE sopraggiunge dopo un flusso di ventre , l' ammalato prenderà per qualche tempo le pillole aperitive e corroboranti indicate nel Cap. I. n. 1. , oppure ogni mattina avanti il pranzo quanto può capir sulla punta d' un coltello di rabbarbaro polverizzato nel brodo , e farà quindi uso , finchè cessi affatto , dell' elettuario del Cap. II. §. 7. La regola deve essere la medesima , che l' indicata in detto Cap. II. §. 7.

CA-

CAPITOLO XXVIII.

Del Male della Collera .

§. 1.

IL male della Collera è una malattia acuta dello stomaco e degl' intestini , in cui si rendono con grandi sforzi e per vomito , e per secesso , degli umori biliosi , acri , acidi , corrosivi , gialli , verdi , e finalmente neri , e che è accompagnata dalla cardialgia , dalla colica , dal calore , da una sete insoffribile , da una insuperabile nausea , da svenimento , e deliquio , e dal freddo alle estremità .

§. 2.

Provien questa malattia dall' acrimonia de' cibi , che si mangiano , o dalle altre acrimonie , che si generano nello stomaco , e negl' intestini , per esempio da un veleno acre , e corrosivo , dall' eccessivo uso delle frutta acide , delle carni grasse , oleaginose .

§. 3.

Ecco la più certa , e più spedita cura , che si può impiegare in questa malattia 1. Convien far cuocere un pollo in tre pinte d' acqua fino alla diminuzione della metà , e quando quest' acqua sia tiepida , darne di quando in quando all' ammalato un bicchiere , e in capo ad alcune ore dargli tre , o quattro serviziali dell' acqua medesima , per isgombrar dallo stomaco , e dagl' intestini le materie acri , che vi si contengono . 2. Bevuta , ch' egli avrà la dett' acqua , gli si darà una presa delle mie gocciole anodine , Par. I. Cap. I. n. 7. ,
o la

o la stessa dose di laudano liquido di fidenham nell' acqua di menta , di finocchio , o di cinnamomo , o in alcuni cucchiari di vin vecchio .

3. Se il vomito non cessa in capo d' una mezz' ora , gli si darà una seconda presa delle goccioline , e se l' indomani sopravvien nuovamente , converrà dargliene una terza , mattina , e sera .

§. 4.

OVe non si potesse avere un pollo , si prenderà una libbra di vitello , che si farà cuocere nella stessa maniera , e non avendosi nè l' un nè l' altro , si farà bere all' infermo copiosamente dell' acqua tiepida , con un po' di zucchero , e gli si daranno pure varj elisteri d' acqua tiepida .

§. 5.

SE il vomito è violento per modo che bi-
sogni assolutamente arrestarlo , e sieno già più ore che dura , si ricorrerà tosto alle mie goccioline anodine , che si daranno nel modo soprad-
detto .

§. 6.

QUand' anche il vomito cessasse alla prima presa di dette goccioline , deve però l' ammalato prendere per qualche tempo , ogni sera , un serviziale emolliente , per evacuare i mucchi , che possono essere rimasti negl' intestini . Il migliore , che possa adoperarsi nel presente caso , è quello , ch' è composto d' acqua tiepida , e d' olio d' olivo , o di mandorle dolci .

CA-

Della Stitichezza.

§. 1.

LA stitichezza, anzichè una malattia primitiva, è un effetto di quelle, che precedettero. Insegnai nella prima Parte il modo di rimediare a quella, che va unita alle febbri acute. Questo male è assai comune nelle persone ippocondriache, ed isteriche, soggette al calcolo, alla podagra, ed ai reumatismi, ed in coloro, che menano una vita oziosa, e sedentaria, e che fanno uso di alimenti asciutti.

§. 2.

Seppe volte chi è soggetto alla stitichezza non lascia perciò di godere una perfetta salute. Nel caso, in cui è accompagnata da mali di costa, da difficoltà di respiro, da colico, da nausea, e da ansietà, convien dare all'ammalato un clistere d'acqua, olio, e sale, o per alcuni giorni consecutivi a digiuno un cucchiarinino di tartaro preparato nell'acqua. Se la prima presa non opera, convien dargliene la sera una seconda, ovvero si farà disciogliere nell'acqua un'oncia di manna, ed altrettanto di tamarindo, e gli si farà bere quest'infusione tiepida. Alcuni si gueriscono dalla loro stitichezza alzandosi di buon mattino. Non v'è cosa migliore per la stitichezza pertinace del bagno d'acqua tiepida, e dell'uso del poc' anzi accennato serviziale. Insegnerò nella terza Parte come si debba rimediare a quella

CAPITOLO XXIX. 215

a quella de' bambini, che poppano, ne' quali è per lo più cagionata dal latte rappreso, che si accumula nello stomaco, e negl' intestini.

o) ————— o

CAPITOLO XXX.

Della Passione Iliaca.

§. 1.

Questo male, a cui danno alcuni il nome di *Miserere mei*, vien cagionato dalla ostruzione di una parte degl' intestini, per cui non potendo le materie evacuarfi per la solita strada, risalgono in alto, e si aprono un passaggio per la bocca. Da principio il vomito è piuttosto leggiero, ma si aumenta poscia, ed è accompagnato da tormini violenti, e da una stitichezza totale. L'infermo finalmente getta via per bocca gli escrementi, tutto il di lui corpo si cuopre d'un sudor freddo, ed egli cade in deliquij, e convulsioni, che li tolgoao la vita.

§. 2.

LA cagion prossima di questa malattia è tutto ciò, che impedisce l'evacuazione degli escrementi, e che contrae le fibre degl' intestini a segno di gettarle in un movimento antiperistaltico e convulsivo. Le cagioni, che vi danno luogo, sono: 1. la stitichezza ostinata, massime in chi non vi è soggetto. 2. La contrazione di una parte degl' intestini prodotta dall'acrimonia delle materie, che contengono, dalle ventosità, dal calor troppo grande del basso

basso ventre, &c. 3. Le fistole, e le ulcere degl' intestini gracili, che si conoscono ai dolori acuti, che vi si sentono, ed alla febbre, che gli accompagna. Gli scirri, o l' ostruzione delle glandule degl' intestini, che spesso procede dalla subitanea cessazione di una dissenteria, o di un flusso emorroidale. 4. I vermi, che negl' intestini si generano, e che gli trafiggono. 5. L' infiammazione degl' intestini medesimi, che si conosce alla febbre acuta, che l' accompagna, ed al dolore acuto, cocente, e lancinante, che vi si sente. 6. L' uso de' purganti caldi ed acri. 7. La strozzatura nelle diverse ernie.

§. 3.

Conviene nel curare questa malattia aver principalmente riguardo alle cagioni, che la producono, e prendere in parte norma da queste: dico in parte, conciossiachè generalmente essa richiede, che si sgombrino gl' intestini, e che si calmi l' infiammazione, e che poi se ne facciano uscire le impurità, che ne formano l' ostruzione. Ecco i mezzi, che si deono perciò adoperare. Si caverà prima di tutto all' infermo da 7. in 14. oncie di sangue dal braccio o dal piede, e poi gli si darà un clistere d' acqua olio e miele. 2. Per arrestare il vomito, gli si farà inghiottire del sugo di cedro, o di limone, mescolato con sale d' asfenzio, e di quando in quando un cucchiario d' acqua di pura menta. 3. Gli si applicherà sul basso ventre un cagnolino, in guisa che il

ven-

ventre di questo vi si adatti sopra, oppure un cataplasma emolliente. 4. Cessati che faranno alquanto il vomito e i dolori, gli si darà in una chicchera d'acqua di menta, o di cinnamomo una presa e mezza della mia polvere purgativa, Parte I. Cap. I. n. 6., ovvero 60. grani di pillole Elveriche, starà per tutto quel tempo in letto, e non farà uso, se non d'alimenti liquidi e leggieri.

§. 4.

SE il vomito è troppo violento per poter usare i purganti, e se l'ammalato gli rende prima che abbiano il tempo di giungere negl'intestini, si praticherà quanto segue. 1. Si trarrà sangue. 2. Si farà uso de' clisteri emollienti, che si deono dare in principio della malattia di due in due ore. 3. Gli si ungerà di quando in quando il basso ventre con unguento di bismalva fuso, o semplicemente con olio di cammomilla, applicandovi poi sopra un pezzo di lana caldo, quanto più spesso sarà possibile gli si farà inghiottire un cucchiaro, e più ancora, d'olio di mandorle dolci mescolato con altrettanto di manna, e se dura tuttavia la stitichezza, gli si darà una doppia presa di sal glaciale, Par. I. Cap. I. n. 9., o un'egual quantità di sale di sedlitz nell'acqua, ed alcuni clisteri emollienti. In caso ch'egli renda il sale, gli si darà in capo di due ore e un quarto una presa delle mie goccioline anodine, Par. I. Cap. I. n. 7., o del laudano liquido di Sidnham in alcuni cucchiari d'acqua di

di menta , o di vin vecchio per fermare il vomito , finchè il sale giunto sia negl' intestini , ed abbia prodotto il suo effetto . Se questo rimedio non opera , gli s' introdurrà per l' ano negl' intestini del fumo di tabacco .

§. 5.

SE questo secondo rimedio non opera , si ricorrerà all' argento vivo , il quale pel suo peso , e per la sua qualità aperitiva produce spesso effetti maravigliosi nelle più pertinaci stitichezze . Si può fargliene inghiottire una libbra , ed anche più in caso di bisogno , ma bisogna farlo sedere in un bagno d' acqua tiepida fino all' umbilico .

§. 6.

SE la malattia proviene dai vermini , l' ultima indicazione da me fatta è la migliore , che si possa praticare . Se è cagionata da infiammazione degl' intestini , si ricorrerà a quella del §. 4. , e si principierà dal cavar sangue all' ammalato una , o due volte , come dissi nella prima Parte nell' Articolo dell' infiammazione degl' intestini . Se è prodotta da strozzatura , il che agevolmente si comprende dalla gonfiezza , e dai dolori , che si sentono nella parte , gli si caveranno , s' è adulto , da 12. in 17. oncie di sangue dal braccio , finchè cada quasi in deliquio , gli si darà un clistere emolliente , si farà coricare sul dorso colle ginocchia ripiegate verso il ventre , e si procurerà di rimettere nel loro sito gl' intestini . Se poi questa riduzione riuscisse impossibile , si
farà

farà bollire un pugno di linseme nel latte finchè si riduca in poltiglia, e si applicherà sul tumore. Si può, in vece del linseme, adoperare il cataplasma emolliente indicato nella Parte I. Cap. IV. §. 7.

o—————(o

CAPITOLO XXXI.

Della Colica.

§. 1.

SI dà in generale il nome di Colica a que' dolori, che si sentono negl' intestini, ma particolarmente però a quelli, che hanno la loro sede nella regione umbilicale. Questo male è bene spesso l'effetto di un altro, del calcolo delle reni per esempio, della cessazione de' mestrui nelle femmine, del flusso emorroidale, della retrocessione di un male cutaneo, d'un reumatismo, della infiammazione degl' intestini, spesso ancora è cagionato dalle ventosità, o dalle materie acri, biliose, oleose, ed acide, rinchiuse negl' intestini, dai vermini, o da una traspirazione intercettata.

§. 2.

Nella colica ventosa il basso ventre è duro e teso. Per dissiparla, conviene 1. dare all'ammalato un clistere emolliente composto d'un' infusione di cammomilla, d'olio, e d'un po' di sale: 2. applicargli sul basso ventre il cataplasma emolliente indicato nella Parte I. Cap. IV. §. 7., e fargli bere del Tè di cammomilla, e di fiori di sambuco, per farlo traspirare: 3. l'indomani, calmati che faranno al-

K

quan-

quanto i dolori , se la gonfiezza persiste , egli prenderà ogni mattina a digiuno , e dopo il mezzogiorno , una presa delle mie pillole aperitive e corroboranti , Cap. I. n. 1. , e vi bevverà dietro alcune chicchere d' infusione di centaurea , di meliloto , o altra equivalente . In vece di queste pillole può darglisi cinque prese di pillole d' acciaio di Sthal , ma convien prima purgarlo con la manna e col rabbarbaro .

§. 3.

SE la colica è cagionata da cessazione del flusso menstruale o emorroidale , bisogna , dopo aver tratto sangue dal piede all' infermo , dargli nel giorno stesso alcuni serviziali emollienti , ed unirvi le pillole suddette aperitive e corroboranti , e fregarli il basso ventre e le reni con un pezzo di flanella calda .

§. 4.

SE procede da retrocessione di un male cutaneo , o di un reumatismo , conviene , dopo il salasso , dargli tre o quattro volte il giorno , e più , una presa della mia polvere febbrifuga anodina , Par. I. Cap. I. n. 1. , o la stessa quantità di polvere antispasmodica , con due grani di canfora nell' infusione di fiori di sambuco , o nel Tè , unirvi alcuni clisteri emollienti , ed ove non operino questi rimedj , applicargli un vescicatorio sui polpacci delle gambe , Par. I. Cap. I. n. 10.

§. 5.

Nella colica prodotta dalla rena , o dal calcolo delle reni , e che è accompagnata da forte

forte vomito , si trarrà sangue all' infermo dal piede , gli si darà il clistere emolliente del §. 2. , e di due in due ore una presa della mia polvere febrifuga anodina , Par. I. Cap. I. n. 1. , o la stessa dose di nitro depurato , ed alternativamente alcuni cucchiari d' olio di mandorle dolci , del Tè , o del brodo d' orzo .

§. 6.

LA colica proveniente dai vermini non esige altro , se non l' uso della polvere purgativa accennata nella Parte I. Cap. I. n. 6.

§. 7.

PArlerò nella Parte seguente della colica de' bambini che poppano , e di quella delle donne soggette a' vapori isterici

§. 8.

HAvvi un' altra specie di colica , a cui si dà il nome di colica del Poetù , o de' Pittori , la quale è sommamente dolorosa . Da principio non si sente , che in un luogo solo del basso ventre , si dilata quindi a poco a poco , e dura dieci o quattordici giorni , ed anche più , ed è accompagnata da una stitichezza totale , e dalla soppressione delle orine . E' tanto violenta , che l' infermo cade in angoscie ed inquietudini terribili , in isvenimenti , in delirj , in sudori freddi , e muore nelle convulsioni . Talvolta , dopo essersi alquanto calmata , vien seguita dalla paralisi delle braccia , delle coscie , e de' piedi .

§. 9.

Procedendo questa colica da un'umor acre, che consuma e porta via la mucosità della tunica interiore degl' intestini, convien adoperare la seguente cura. 1. Si darà all' infermo due o tre volte il giorno, e più, il clistere emolliente composto d' acqua e d' olio, o semplicemente dell' infusione di linseme, o della mucilagine d' orzo. 2. Gli si faranno prendere per bocca cose proprie a riparare la mucosità, che gl' intestini hanno perduta, brodi d' orzo per esempio di tritello di vena, o di riso, dell' acquacotta fatta con la radice di bismalva, col tasso barbasso, col fioraliso, &c., e vi si uniranno alcune volte il giorno due cucchiarini della seguente composizione: prendansi 2. oncie d' olio di mandorle dolci, 40. grani di zafferano mondato, un quarto d' oncia di balsamo del Perù nero, 10. gocciole d' olio d' anici distillato, e due oncie e mezza di siroppo di bismalva. 3. Gli si ungerà di quando in quando il ventre con unguento di bismalva, o con olio di cammomilla tiepido, applicandovi sopra una salvietta calda, e se violenti sono i dolori, gli si darà la sera nell' acquacotta, o in altra solita bevanda una presa delle mie gocciole anodine. Par I. Cap. I. n. 7.

§. 10.

I Piombaj, gli stagnatori, e tutti quegli operaj, che adoperano materie arsenicali ne' loro lavori, soggiacciono spesso a coliche, che hanno la lor sede nella regione media del basso ventre,

ventre, ed alle quali tien dietro la confunzione, e la paralizia. Questo male richiede la stessa cura, che indicai nel precedente paragrafo, cioè clisteri emollienti, unzioni frequenti, brodi d'orzo e di tritello di vena, ed il siroppo ancora ivi accennato, ma senza però mettervi il balsamo del Perù, e tostochè i dolori sono alquanto calmati, si deve purgar l'ammalato per più giorni consecutivi, o col mio sat glaciale, o colla mia polvere purgativa, o con altro purgante ordinario. Tutti gli anodini in generale non vaglion nulla in questa spezie di colica.

§. 11.

Queste due ultime spezie di coliche hanno questo di comune, che vanno spesso a finire nella paralizia di qualche parte del corpo, e massime de' piedi o delle coscie. Calmanfi talora col solo uso del balsamo nero del Perù, di cui convien dare all'infermo ogni giorno da 30. in 40. goccioline nello zucchero. Ove non operi questo rimedio, non rimane altra speranza, se non nei bagni naturali d'acque calde, che contengano molto ferro e molto zolfo, delle quali si trovano parecchie nel paese degli Svizzeri. E rimedj, che operano nella paralizia, che accompagna l'apoplessia, riescono inutili nel caso presente.

§. 12.

La più dolorosa di tutte le coliche è quella, che si chiama Passione Iliaca: pare in essa che gl'intestini sieno strettamente legati

con una corda , e quando pure si giunga a calmarla per qualche momento , ritorna nondimeno poco dopo . In principio della malattia i dolori non sono tanto acuti , nè la stitichezza tanto ostinata , nè tanto frequente il vomito , quanto dopo che è durata qualche tempo , imperciocchè allora il dolore si fissa , il vomito cresce , e la stitichezza divien così forte , che non cede a purgante alcuno . La materia , che l'ammalato rende per bocca , ora è gialla , ora verdiccia , ed ora di altro colore . Talora la stitichezza ed il vomito accompagnati sono da un moto convulsivo ed antiperistaltico degl' intestini , il quale fa che si rendano per bocca gli escrementi . Ecco in che sia questa colica diversa dalla colica nefretica , che è accompagnata da vomiti . 1. La colica nefretica ha la sua sede nella region delle reni , e il dolore corrisponde nella vescica e nella coscia . 2. La nefretica si calma mangiando , dove l'altra si aumenta . 3. Nella prima l' infermo si trova assai più sollevato dopo aver vomitato , che nella colica nefretica . 4. In questa l' orina è da principio chiara e limpida , depone poscia una materia sabbiosa , in vece che nella malattia , di cui parlo , essa è spessa , e carica di colore .

§. 13.

LA cura , che questa malattia richiede , è la seguente . 1. Si caveranno da 8. in 16. oncie di sangue all' infermo dal braccio . 2. Due o tre ore dopo il salasso gli si darà una

presa

presa delle mie gocciole anodine , Par. I. Cap. I. n. 7. , o un' egual dose di laudano liquido di Sidenham , in alcuni cucchiari d' acqua di cinnamomo , di menta , o di altra simile acqua cordiale , che si replicherà fino a due volte nel medesimo giorno , ove la colica ricominci . 3. L' indomani , e ne' giorni seguenti l' ammalato prenderà la mattina a digiuno una presa del mio sale glaciale , Par. I. Cap. I. n. 9. , o due oncie di manna e di ramarindo nell' acqua tiepida , ed alcune ore dopo le gocciole , in caso che il purgante ecciti di nuovo la colica . 4. Per ristabilire le sue forze , e fradicare affatto il male , conviene che ogni mattina a ventre digiuno cavalchi . Rispetto al nutrimento , e alle bevande , egli si asterrà nel corso della malattia , ed anche per qualche tempo dopo cessata la medesima , da ogni qualunque alimento grasso , oleoso , acre , ed indigesto , e non bevèrà , se non vino vecchio mescolato con un terzo d' acqua .

o)-----o

CAPITOLO XXXII.

Dei Vermini .

§. I.

L' Esperienza c' insegna , che nello stomaco , e negl' intestini delle persone dell' uno , e dell' altro sesso si generano dei vermini di diversa specie , e di grandezza diversa . I sintomi , che gli annunziano , sono la nausea , il vomito , un flusso di bocca , la mattina massime a digiuno , la colica , l' enfiagione del

K 4

basso

basso ventre, la pallidezza del volto, il prurito del naso, la sete, e spesse volte una fame intollerabile, i dolori di stomaco, i deliquj, il pizzicore all' ano, le lagrime, che cadono dagli occhi, e i frequenti sternuti.

§. 2.

Molto vi soggiacciono i fanciulli, e le femmine, ed oltre i detti sintomi, cagionano loro delle convulsioni, l'epilessia, delle alienazioni di mente, che per buona sorte non durano molto. Le donne soggette ai vapori, cadon sovente in una specie di mania. E' pessimo segno, quando nelle febbri acute l'infermo rende dei vermini, massime se questi son morti.

§. 3.

HAvvi una specie di vermini, che furon chiamati solitarj, e che son lunghi talvolta 60. o 70. braccia: questi sono lunghi, sottili, composti di parecchi anelli, ed hanno il collo lungo, e sottile quanto un capello. Difficilissimo è il poter cavargli via interi, distaccandosi spesso nelle loro articolazioni: ma si possono però scacciare col soccorso de' vermifughi, e de' purganti. Madama Nufern di Murat è la sola, che io sappia, che possieda il segreto di cavare il verme solitario nello spazio di poche ore, senza dolore, e senza pericolo. Pretende altresì averlo uno speciale di Lofanna detto per nome *Schwachbeim*; ma io non consiglio alcuno di fidarvisi, essendo morti parecchi nelle di lui mani.

§. 4.

Molti sono i rimedj contro i vermini ordinarij dello stomaco, e degl'intestini: ma il più sicuro di tutti è il mercurio, e le diverse sue preparazioni. Se si tratta di fanciulli, convien far bollire una libbra d'argento vivo in due pinte d'acqua, e darne loro di quando in quando un bicchiere, oppure dar loro di tre in tre, o di quattro in quattro giorni, la mattina a digiuno, da 8. in 15. grani di rabbarbaro polverizzato, e da 3. in 5. grani di mercurio dolce nel brodo, per far morire i vermini, ed evacuarli per mezzo del rabbarbaro: ma si deve continuare questo rimedio per qualche tempo, a fine di discioglierli, e di evacuare il flemma degl'intestini, in cui i vermini depongono i loro uovi, e nascono. Ecco il rimedio, di cui io mi servo per discacciarli, qualunque sia e la loro grossezza, e la loro natura. 1. Tostochè mi accorgo dai sintomi indicati nel §. 1. che alcuno ha dei vermini, io gli do per alquanti giorni nel coricarsi una presa della mia polvere febrifuga anodina, Par. I. Cap. I. n. 1., o la stessa quantità di sale ammoniaco ben depurato, nel Tè leggiero, o nell'acqua. 2. Disciolta così, quanto mi è possibile, la pituita, gli do per alcuni giorni, o almeno da un giorno all'altro, non a digiuno, una presa della mia polvere purgativa, Par. I. Cap. I. n. 6., nel brodo leggiero, o nel Tè. Per mezzo di questo rimedio replicato due o tre volte nello spa-

zio di un anno, ho fatto rendere ad alcuno de' miei ammalati, a pezzi a pezzi, dei vermini solitari lunghi 30., e più braccia. Ove non vi sieno vermini nello stomaco, nè negli intestini, questo rimedio non produce altro effetto, se non quello di un leggier purgante, che è di evacuar le flemme, e le pituite degli intestini.

§. 5.

IL Dottor Mead ha ritrovato contro la Tenia (che così chiamasi il suddetto verme solitario) un rimedio, usando il quale si consuma essa a poco a poco, e si riduce in pasta. Consiste questo rimedio in limatura di piombo, o di stagno, che si mescola con eguale quantità di corallo polverizzato, e che s'incorpora con qualche elettuario, o col siroppo d'affenzio, dandosene poi grosso quanto una noce, mattina e sera all'ammalato. Si può ottenere lo stesso intento colla limatura di ferro incorporata in qualche elettuario amaro; ma conviene, quando uno se n'è servito, massime se è stitico, purgarsi di quando in quando. Il miglior purgante, che possano usare gli adulti, si è il prendere da 20. in 30. grani d'aloè in forma di pillole.

o ————— o
CAPITOLO XXXIII.

Della Timpanitide.

§. 1.

LA Timpanitide è una gonfiezza del basso ventre, di cui la grossezza è varia, accom-

compagnata da durezza, e da una tensione tanto grande, che rifuona come un tamburro quando vi si batte sopra, come ancora dalla enfiagione, o dal dimagramento delle gambe, e delle coscie. Questa malattia, cui molti danno il nome d'idropisia asciutta, è molto lenta ne' suoi progressi, gonfiandosi da principio le gambe, e le coscie, e poscia il basso ventre, che divien duro e teso, l'infermo rende per bocca molte ventosità, l'uscita delle quali reca sollievo, dove se rimanessero dentro, gli produrrebbero delle inquietudini, delle ansietà, e la febbre perfino. Coloro, che sono assaliti da questo male, hanno per la maggior parte il fegato e la milza gonfi e scirrofi, e molt'acqua nella cavità dello stomaco. Principia talvolta con una ritenzione di orina, accompagnata da tiramenti e dolori acutissimi nella vescica.

§. 2.

Provienne questa malattia dalla debolezza, e dal rilassamento delle fibre degl'intestini, ond'è ch'essi non possono nè contraersi, nè espellere i venti che racchiudono, nè opporre una sufficiente resistenza all'aria, che gli distende a un segno straordinario. Le cagioni, che vi contribuiscono, sono gli alimenti indigesti, flatuosi, e soggetti a fermentare, i licori spiritosi, &c. Procede qualche fiate dalla precipitata guerigione d'una febbre fredda, in cui non si è estratta sufficientemente la materia morbifica, da una dissenteria troppo presto

fermata, e dalla retrocessione di un male curaneo.

6. 3.

LA guerigione di questa malattia è difficilissima, massime quando ha fatti progressi notabili, ed è pervenuta ad un certo grado. Si può da principio rimediarvi coll'uso de' purganti, de' corroborativi, e de' carminativi mescolati insieme, per esempio un'infusione di rabbarbaro, d'anici stellati, e di scorza d'arancio nel vino, quando non vi è febbre, di cui si danno all'infermo alcuni bicchieri a digiuno, per purgarlo un pajo di volte. Se ha febbre, gli si traranno alcune oncie di sangue dal braccio, e si unirà la sera al suddetto purgante qualche presa della mia polvere febrifuga anodina, Par. I. Cap. I. n. 1., o un'egual dose di polvere antispasmodica, che gli si darà nel Tè non molto carico. Si possono sostituire alla decozione di rabbarbaro le mie pillole aperitive e corroboranti del Cap. I. n. 1., e dargli ogni giorno uno o due clisteri di ruta e di camomilla per disgomberar gli intestini, ed evacuare le ventosità, che racchiudono. Gli si freggerà il basso ventre con una salvietta calda, vi si applicherà sopra il cataplasma emolliente, Par. I. Cap. IV. §. 7., e in capo ad alcuni giorni si farà disciogliere due oncie di nitro, od altrettanto di sale ammoniaco in una foglietta d'acqua, vi si aggiugnerà un'egual dose di acquavita, e calda che farà l'infusione, vi si bagnerà dentro un pezzo di flanella, e gli si

ap-

applicherà sul basso ventre tre o quattro volte il giorno, e più ancora, se si crede conveniente. Se questa cura opera, e l'ammalato guerisce, gli si faranno bere per qualche tempo le acque di Schwalbach, di San Maurizio, di Pyrmont, di Spà, o altr'acqua somigliante.

§. 4.

IL miglior nutrimento, onde si possa far uso in questa malattia, finchè dura la febbre, è la carne bianca arrostita, come è quella di vitello, di pollo, e le erbe da minestre cotte. In caso di febbre, l'infermo deve astenersi dalla carne per qualche tempo. Gli alimenti grassi, oleosi, , acri, indigesti gli sono sommamente contrarj. Si servirà per bere d'un'acquacotta fatta coll'anice stellato, col finocchio, colla scorza d'arancio, colla radice di china, col legno santo, &c. a cui potrà aggiugnere, se non ha febbre, alcuni cucchiari di vino di Spagna.

o)—————(o

CAPITOLO XXXIV.

Delle Ostruzioni del Fegato, e della Milza.

§. 1.

IL fegato e la milza si rassomigliano esattamente, tanto per la natura loro, quanto pel modo, con cui vi circola il sangue; e quindi è che soggiacciono alle ostruzioni medesime. Le ultime son d'ordinario prodotte da un sangue spesso e viscido, e da una materia biliosa e crassa, che rallentano la circolazione del sangue in dette parti, come pure in tutte le al-

tre,

tre, che composte sono di glandule, o del tutto la interrompono, ed allora l'ostruzione è la più forte, che dar si possa, comechè non venga accompagnata da febbre.

6. 2.

LE cagioni di queste forte di ostruzioni sono gli alimenti tutti, che generano molta piruita nel sangue, la vita troppo sedentaria, l'applicazion troppo forte dello spirito, la malinconia, la dissipazion troppo grande del sangue e degli spiriti vitali, la cessazione de' mestrui, del flusso emorroidale, la cattiva cura d'una febbre fredda, &c.

6. 3.

I Segni, che le indicano, sono: 1. una tensione ed un dolore nel destro, o manco lato al di sopra delle coste false, che si estende verso la spina del dorso. 2. Formata che si è intieramente l'ostruzione, si sente toccando, nell'uno o nell'altro fianco, una gonfiezza, o una grossezza dura, e renitente, il respiro divien difficile, duro il basso ventre e teso, e risale verso il petto. 3. Il volto si muta a poco a poco di colore, e diventa piombato, giallo, e finalmente livido. 4. Per sapere da qual parte è l'ostruzione, conviene por mente al modo, con cui si corica l'ammalato: se con minor disagio egli sta coricato sul destro fianco, che non sul sinistro, questo è segno che l'ostruzione ha la sua sede nel fegato, cioè nel destro lato, come l'ha per l'opposto nella milza, quando egli

egli sta più commodamente coricato sul fianco sinistro, che non sul destro.

§. 4.

QUando queste ostruzioni non sono nè inveterate, nè molto notabili, possono esse risolversi, e si dissipano talvolta da una malattia che sopraggiunga, da una febbre fredda per esempio, da un flusso di ventre, da una dissenteria, da un vomito di sangue, da un flusso emorroidale, ma spesse volte degenerano in idropisia, e quando son cagionate dalla bile, in affezioni ipocondriache ed isteriche, in melancolia, ed in confunzione.

§. 5.

QUando si sa di certo che vi ha 'un' ostruzione nel fegato o nella milza, convien dare all' infermo per qualche tempo tre o quattro volte il giorno, tanto di sale ammoniaco, quanto ne capisce sulla punta d' un coltello, o una presa del mio spirito glaciale, Par. I. Cap. F. n. 2., in una leggier infusione di centaurea, di trifoglio fibrino, 2. per disciogliere la bile e la pituita contenute nello stomaco e negli intestini, purgarlo poscia per alcuni giorni con manna disciolta nello sciero di latte, o con le mie pillole Elveriche aperitive, e corroboranti, Cap. I. n. 1. Ciò fatto, gli si darà ogni mattina a digiuno una libbra e più di sugo di crescione, e di piccoli gamberi, cioè mezza libbra di sugo di detta pianta, ed altra mezza libbra di gamberi mescolati insieme, o nel brodo chiaro, che si farà intiepidire, e se gliene farà

farà bere per due ore almeno : gli si daranno due volte nel dopo pranzo , semprechè sia adulto , due cucchiarini di licore di terra fogliata di tartaro nell'infusione amara . E quando non si abbia in pronto questa droga , si farà semplicemente uso della mia Panacea antidropica , Cap. I. n. 5. , che gli si darà nella stessa infusione , ordinandogli di salire di quando in quando a cavallo , o in vettura , e di fregarli mattina e sera la parte ostruita con una fiamma ben calda . Se i sintomi dell'ostruzione (§. 3.) diminuiscono fra qualche tempo coll'uso de' sopraccennati rimedj , l'ammalato si contenterà di fare molto esercizio , di star in regola , di bere per qualche tempo qualche acidetto , o di prendere mattina e sera quanto può capire sulla punta d'un coltello di limatura di ferro ben netta nell'elettuario d'arancio , bevendovi dietro alcune chicchere d'infusione di centaurea . Se l'ostruzione è cagionata da cessazione del flusso menstruale o emorroidale , si principierà dal dargli per qualche tempo le mie pillole aperitive , gli si applicheranno le sanguiughe all'ano , e gli si faranno sovente bagnar i piedi nell'acqua tiepida . La regola ha da essere quella medesima , che ho indicata nel Capitolo IV. Se l'ostruzione è affatto confermata , se la parte è diventata sciroso , e i rimedj suddetti non operano , si daranno all'ammalato per qualche tempo , mattina e sera , 5. grani di mercurio dolce , e 2. grani di zolfo dorato , d'antimonio , mescolati

con:

CAPITOLO XXXIV. 233

con 10. grani di rabbarbaro, o veramente una presa delle mie pillole mercuriali nel brodo leggiero, o nel Tè.

)o-----o

CAPITOLO XXXV.

Dell' Itterizia.

§. 1.

QUando la bile si spande su tutta l'abitudine del corpo, e si mescola col sangue e cogli umori, tinge la pelle e il bianco dell'occhio d'un color giallo, e si dà a questo male il nome d' Itterizia. A misura che cresce il male, il colore si fa più carico, tutti gli alimenti hanno un gusto amaro, l'orina diventa di un giallo carico, e se vi si bagna dentro un pannolino, questo rimane tinto dello stesso colore, le escrezioni parimente sono giallicie, e vischiose al pari della colla.

§. 2.

DUrata che la malattia è qualche tempo, l'ammalato perde l'appetito, e divien soggetto a' mali di cuore, ed al vomito, si sente alterato estremamente, massime se all'itterizia si aggiunge la febbre, ha dei dolori, dei granchi di stomaco, dei tormini, dei dolori acuti nel fianco destro al di sotto delle coste false, degli ardori e dei pruriti nella pelle, respira con difficoltà, e cade spesso in sudori, che gli tingono la camiscia di color giallo.

§. 3.

§. 3.

Possuno annoverarsi tra le cagioni dell'itterizia tutte le passioni violente, e specialmente la collera, l'infiammazione, e l'ostruzione del fegato, della milza, e delle glandule degli altri visceri, i granchj dei nervi di esse parti prodotti da sostanze acrimoniose, come farebbero a cagion d'esempio un purgante, o un emetico violento, il calcolo della vescichetta del fiele, e fra le cagioni esterne una caduta, un colpo ricevuto nel destro fianco, dove sta situato il fegato, la gravidanza, l'ostruzione de' superiori intestini, che si oppone al corso della bile, finalmente i veleni diversi, e particolarmente quello della vipera.

§. 4.

L'itterizia talvolta è una conseguenza di qualche febbre o acuta, o fredda, che fu mal curata, ed esige una cura diversa, secondochè si trova essa unita a febbre, o no. Ecco qual cura si richiede nel secondo caso. 1. Si darà per qualche tempo, tre o quattro volte il giorno, e più ancora se bisogna, all'infermo una presa del mio spirito glaciale, Par. I. Cap. I. n. 2., in una infusione amara di meliloto, di centaurea, o di marrobio bianco, e gli se ne faranno bere alcune chichere sopra. In vece del mio spirito glaciale può darglisi da 30. fino ad 80. goccioline della seguente composizione nella detta infusione. Prendansi 30. grani di fiori di sale ammoniaco preparato coll'acciajo, si facciano sciogliere in mezz' oncia di

CAPITOLO XXXV. 235

di tintura di rabbarbaro , ed in un quarto d'oncia di spirito di tartaro rettificato . 2. Usato che avrà per qualche tempo di questo rimedio , si purghi prima di proceder più oltre col rabbarbaro e col cedro nel seguente modo : si prendano due dramme di rabbarbaro ben netto , e il sugo d'un cedro , vi si versi sopra un quarto di pinta d'acqua bollente , si lasci raffreddare , e se ne dia la metà all'infermo la mattina a digiuno , e l'altra il dopopranzo , e per tutto il tempo , che se ne servirà , diafegli mezz'ora innanzi che pigli il suo cibo , un cucchiaino dell'Elixir viscerale di Paracelfo , in alquanto di vino o d'acqua . In cambio di questo rimedio , potrà darfegli mattina e sera una presa delle mie pillole Elvetiche aperitive e corroboranti , Cap. I. n. 1. Dopo gli anzidetti pochi rimedj , altro non rimane all'infermo da fare la mattina prima di alzarfi , e dopo aver prese le dette pillole , che purgano la bile per secesso , se non bere un brodo di crescione , o l'infusione amara , di cui ho parlato , per sudare , dopo del che potrà alzarfi , avvertendo soprattutto di far del moto , e di cavalcare , o camminar per vettura quanto più spesso egli potrà .

§. 5.

IN quanto alla dieta , o alla regola , che deve osservare rispetto al bere , ed al mangiare , egli deve a parer mio antiporre l'arrosto allo allessò , e valersi per suo nutrimento di carne di vitello , di pollo , &c. d'erbe , e radici dome-

sti-

stiche, e di frutta agrette, e cotte, essendo tutte queste cose eccellenti contro la bile. Userà per bevanda d'un'acquacotta fatta colla gramigna, col legno santo, o colla radice di china, e se ha lo stomaco debole, gli si potrà permettere di prendere quando mangia alcuni cucchiari di vino.

§. 6.

SE l'itterizia, come talvolta succede quando l'ostruzione del fegato è notabile, e unita a febbre continua, si darà all'ammalato, in principio della cura, per alcuni giorni, lo spirito glaciale, ed in progresso quando si sarà diminuita la febbre si replicherà la dose ogni sera, quando egli andrà a letto, e per tenergli il ventre libero gli si darà ogni giorno un clistere emolliente, composto d'acqua tiepida, olio, e sale. Se la febbre è un restante di febbre acuta, o maligna, complicata con l'itterizia, si curerà come dissi nella prima Parte, e vi si unirà per evacuar le acrimonie la pozione di rabbarbaro indicata nel §. 4.

§. 7.

SE è cagionata da morsicatura di qualche animal velenoso, prima d'ogni altra cosa si laverà la piaga con aceto, o vino caldo, e si darà all'ammalato di tre in tre, o di quattro in quattr'ore, una presa del mio spirito glaciale, Par. I. Cap. I. n. 2., nel Tè fatto con fior di sambuco, di cui gli si faranno bere dietro alcune chicchere. In vece dello spirito glaciale gli si possono dare 30. gocciolo
fu-

fudorifiche di stahl, e 20. goccioline anodine d' Hoffman nel suo Tè, e cessata che sarà la febbre, si purgherà per qualche tempo colla pozione di rabbarbaro del §. 4.

§. 8.

SE è prodotta dai calcoli nella vescichetta del fiele, il che si riconosce alla contrazione spasmodica, ed al dolor fisso, che l'infermo sente nel fianco destro al di sotto delle coste false, al vomito a cui soggiace, ed alla qualità delle materie, che rende per secesso, si farà uso degli emollienti tanto interni, quanto esterni. Annovero tra i primi il cataplasma emolliente indicato nella Par. I. Cap. IV. §. 7., che si avvertirà di rinovar sovente, e fra i secondi lo sciero di latte sciorato, di cui si varrà per bere ordinariamente. Gli si conserverà il ventre libero o per mezzo del clistere indicato nel §. 6., o per via della manna, di cui giornalmente, o se bisogna, la mattina a digiuno, gli si faranno prendere una o due oncie nello sciero di latte tiepido.

§. 9.

L'Itterizia è talvolta cagionata da una colica ventosa, e in questo caso non si adopereranno altri rimedj, se non i purganti: per esempio il rabbarbaro polverizzato, di cui si prenderà quanto ne capisce la punta d'un coltello, prima di cibarsi, nel brodo, o in forma di pozione, come dissi nel Capitolo della Colica. Al rabbarbaro possono sostituirsi le pillole Elettriche del Cap. I. n. 1. Purgato che si farà suffi-

trova sollevato, dove in questa malattia egli va di male in peggio.

§. 4.

QUando questa malattia è congiunta colla febbre, o quando proviene da cessazione del flusso menstruale, o emmorroidale, convien tosto applicare quattro, ed anche più mignatte all' ano dell' infermo, replicar per due volte la stessa operazione nello spazio di quindici giorni, e dargli ogni mattina, per sei o otto consecutivi giorni, un clistere emolliente composto con decozione di cammomilla, olio, e alquanto di sale, e mattina, e sera, mezz' ora prima che pigli il suo cibo, quanto può capite sulla punta di un coltello di rabbarbaro polverizzato nel brodo leggiero. La sera quando anderà a letto, abbia egli, o non abbia la febbre, gli si darà una presa di spirito glaciale, Par. I. Cap. I. n. 2. in alquanto di Te non molto carico, o in acqua di gramigna, di legno santo, o di scorzonera de' prati, o sia tragopogono, di cui deve valersi unicamente per bevanda ne' primi giorni. Dopo averlo in tal guisa purgato per dieci o dodici giorni consecutivi, ed avergli applicate almen due volte le sanguisughe, si passerà ai rimedj corroboranti, i più energici de' quali sono la mia polvere febrifuga contro le febbri fredde, Par. I. Cap. I. n. 13., o l' elettuario amaro, di cui parlai nel Capitolo II. §. 7. Se il male è radicato, e duri già da lungo tempo, l' infermo potrà prendere ogni mattina, oltre la polvere febrifuga,

le

le acque di schwalbach , o di spà , o altr' acqua acidetta in dose di una mezza pinta .

§. 5.

QUanto alla dieta , egli si asterrà cautamente da ogni cibo grasso , oleoso , grossolano , indigesto , e salato , e bevèrà l' acqua poc' anzi accennata , a cui potrà aggiugnere qualche cucchiajo di buon vino . Sarà utile altresì , se gliel permettono le sue forze , ch' egli più che potrà , faccia del moto , sia a piedi , sia a cavallo , sia in vettura .

o) ————— o

CAPITOLO XXXVII.

*Del Calcolo , e della Renella delle Reni ,
e della Vescica .*

§. 1.

OGnun sa , che si generano dei calcoli e della sabbia nelle differenti parti del corpo , e che quando questo è pervenuto ad un' estrema vecchiaja , la pelle , e le fibre s' impietriscono . Egli è certo per lo meno , che se ne formano nelle reni , nella vescica urinaria , nel fegato , e nella vescichetta del fiele . Quando si esaminano i calcoli attentamente , facilmente si comprende esser essi formati d' una materia terrestre , le cui parti sono unite fra loro per mezzo di una sostanza grassa , ed infiammabile . Sono essi di diversa grandezza , e di color diverso , essendovene dei bigi , dei bianchicci , dei neri , e dei gialli , massime nella vescichetta del fiele . Quei delle reni son per lo più di un bigio gialliccio , più piccoli ,
e più

e più frangibili di quelli della vescica orinaria. Io medesimo ho ritrovati nelle reni calcoli , che tutta ne riempivano la cavità , e turavano talmente gli ureteri , che non potea passare nella vescica neppur una goccia d'orina . Morì alcuni anni sono nella prigione di questa Città una donna , nel destro rene della quale si rinvenne un calcolo , che riempiva tutta la di lui cavità , e nella vescica si ritrovarono tredici altri calcoli grossi quasi tutti come una noce . Pel corso di sei mesi ella non visse d'altro , come mi venne accertato , che di un bicchiere d'acqua fredda , a cui di quando in quando aggiugneva un cucchiajo di spirito di coclearia , che mi chiedeva , quando io andava a visitarla . In tutto il detto tempo non si alzò mai una volta di letto , non ebbe quasi mai le sue regole , non sudava , nè andava del corpo , cosicchè in capo a due anni il suo letto non era più sporco di quel che fosse il primo giorno . Non sentiva nè dolore , nè altro incommodo di alcuna sorta , e morì di debolezza . I Signori, Ich , Roffelet , e varj altri Cerusici di questa Città furono presenti quando feci far l'apertura del di lei cadavere .

§. 2.

N On è cosa rara il ritrovare dei calcoli ne' fanciulli , anche poco dopo che son nati . Si argomenta che ne abbiano , 1. quando nascono di genitori , i quali vi sono soggetti , 2. quando sono inquieti , gridano , e piangono , non orinano , soggiacciono a convulsioni ,

L

ed

ed all' epilepsia , e vomitano frequentemente , senza che si possano attribuire tali accidenti nè ai mucchj degl' intestini , nè ai vermini , nè al far de' denti . Gli adulti e i vecchi sono egualmente soggetti a questo male .

§. 3.

Ecco i sintomi , dai quali si ricava , che vi sia della renella , o qualche calcolo nelle reni , che non può discendere nella vescica urinaria . 1. L' ammalato sente alquanto al di sotto , nel mezzo della spina del dorso , nel rene affetto , un dolore acuto e spesso intollerabile , massime quando cala nell' uretere . 2. Prova delle coliche violente per la corrispondenza , che hanno i nervi delle reni con quelli dello stomaco , e degl' intestini , e appunto dalla medesima ragione provengono i vomiti violenti , ond' è accompagnato questo male . 3. Molti hanno una ritenzione di urina , o non possono urinare che a goccia a goccia , senza molti sforzi , ed un ardore insopportabile ; altri cadono in moti convulsivi , che hanno dell' epilettico . 4. Quando il calcolo è grosso , ruvido , ed ha varj angoli , e squarcia nel passare l' interna tunica degli ureteri , allora esce del sangue dalla verga . 5. La coscia da quella parte , in cui è il calcolo , è quasi insensibile , e sembra come addormentata , e la parte delle borse , che si trova da quel lato medesimo , si gonfia . 6. Quando l' urina depone una sabbia rossiccia , è segno che vi è della renella o della sabbia nelle reni , massime quando si sente ne' lombi

Hombr una forte tensione . Quando il calcolo , dopo essersi introdotto nell' utero , è troppo grosso per poter scendere nella vescica , egli produce spesso e nell' uno e nell' altra un' infiammazione , che tosto si manifesta per via della febbre , della gonfiezza accompagnata d' acuti dolori , e finalmente dell' etisia , che conduce l' infermo al sepolcro .

§. 4.

I Calcoli della vescica sono per la maggior parte bianchicci , scagliosi , e fatti a guisa di cipolla , se non che non sono affatto rotondi , ed hanno un nocciuolo nel mezzo più dure infinitamente di tutto il restante della loro sostanza . Generalmente più duri sono e di maggior mole , che quelli delle reni , e indistintamente si ritrovano nelle persone d' ogni età e d' ogni sesso . Talvolta sono attaccati alla tunica interna della vescica . Vi sono alcuni , che non ne hanno più d' uno , ed altri ne hanno parecchi , i quali sono coperti di mucchi , di sabbia , e d' altre materie acri , che distendono ed infiammano la vescica , la ulcerano , e cagionano una ritenzione d' urina , e dolori al sommo acuti .

§. 5.

I Segni indicanti il calcolo dalla vescica sono i seguenti . 1. Le persone dell' uno e dell' altro sesso , che lo hanno , sentono un certo peso fra l' ano e le parti naturali , come altresì al di sopra , e spesso ancora un movimento cagionato dal corpo estraneo , che vi

si ritrova . 2. Introducendosi il dito nell' ano dell' ammalato , e comprimendosi l' intestino al di fuori , dalla parte della vescica , vi si sente della durezza . 3. L' ammalato ha frequenti ritenzioni d' orina , e quella che rende , è piena di sabbia e di mucchi , che tosto depone in fondo del vaso . 4. La verga s' irrigidisce sovente , e si sente nel capo della medesima , come pure fra essa e l' ano , una spezie di pizzicore , e di prurito , a cui tien dietro una perdita di sangue per l' ano . Questo prurito è talora tale , che è accompagnato da uno scollamento involontario di seme , massime la notte , cagionato dalla irritazione de' vasi spermatici . S' interrogherà l' ammalato , se i suoi genitori sono stati , o no , soggetti al calcolo , o all' epilepsia , mentre queste due malattie producono dei calcoli tanto nelle reni , quanto nella vescica urinaria . Il miglior mezzo però di accertarsene è il porvi la tenta , conciossiachè per poco che un Chirurgo sappia maneggiarlo , egli incontrerà sempre il calcolo . Ma questo spediente non può aver luogo , se il calcolo è coperto da qualche invoglio , essendo allora difficilissimo il sentirlo .

§. 6.

Tutti gli uomini hanno nel loro sangue , o ne' loro umori il germe delle renelle e de' calcoli , che si generano nelle reni , ma oltre la disposizione che vi si ha , conviene altresì che concorrano certe cagioni ad unire le parti della materia , onde sono formati . Ge-

ne-

neralmente si osserva , che tutti i vini dolci , quali son quelli di Spagna , di Francia &c. molto contribuiscono alla generazione del calcolo : e questo è tanto vero , che non si fa cosa sia calcolo , massime fra la plebe , in quelle parti , che producono vini agretti . Questo male è assai comune in Francia , in Inghilterra , ed in Ispagna , tanto fra i poveri , quanto fra i ricchi , ed io lo attribuisco non solamente ai licori forti , ma ancora al poco uso , che vi si fa delle frutta e dell'erbe domestiche , delle quali si nutrono principalmente gli Svizzeri , e gli Olandesi . Può ancora essere cagionato il calcolo dal troppo lungo soggiorno dell'orina nella vescica , e dalla feccia , ch'essa vi depone ; e la ragione , per cui più degli altri vi soggiaccion coloro , che fan vita sedentaria , è appunto , che non circolando con bastante rapidità il sangue ne' vasi , non può purificarsi per mezzo delle secrezioni .

§. 7.

SI osserva che chi ha renelle , o calcoli nelle reni , o nella vescica è d'ordinario soggetto alle convulsioni ed alla podagra , il che procede , secondo ogni apparenza , dalla conformità della materia di questi mali con quella , da cui si genera il calcolo .

§. 8.

PER buona sorte questo male doloroso lascia di tempo in tempo qualche respiro a chi vi è soggetto , il che avviene quando non fa

L. 3.

trop-

tr'oppo moto, o quando si astiene dagli alimenti e dalle bevande, che possono riscaldarlo.

§. 9.

LA cura di questa malattia si riduce a due punti, cioè a calmare i dolori e gli accidenti, che ne sono inseparabili, ed a guerirla radicalmente.

§. 10.

QUando la renella, o il calcolo, che si formarono nelle reni, o nella vescica urinaria scendono giù negli ureteri, e vi s' intricano per modo che vi producono sensazioni dolorose, e gli squarciano, e quando a ciò si uniscono i sintomi, de' quali dissi di sopra, convien tostamente adoperare rimedi atti ad ammolliare e dilatare il varco, a disciogliere la mucosità, che lo chiude, ed a facilitarne l'uscita. I migliori, onde si possa far uso in simil caso, sono l'olio di mandorle dolci, o di olivo, il sugo di cedro, il nitro, lo sciero di latte sfiorato, o il sapone di Venezia disciolto in infusione di Tè verde, o di latte caldo. L'ammalato prenderà ancora di due in due ore due cucchiari della seguente composizione, bevendosi dietro alcune chicchere di decozione pettorale, o di Tè, o di sciero di latte. Prendansi tre oncie d'olio di mandorle dolci, un'oncia di sugo di cedro, un quarto d'oncia di nitro ben depurato, due oncie di miele, e si mescoli insieme il tutto. In vece di esse, si può usare il seguente rimedio: si fa liquefare mezz'oncia di sapon di Venezia ed un.

un quarto d' oncia di nitro in un bicchier d' acqua tiepida , vi si aggiungono alcune oncie di miele , ed ogniqualvoltage se ne vuol dare all' ammalato , bisogna avvertire di agitar ben bene la caraffa , che se anche l' ammalato il rigertasse , non però conviene lasciare di continuarlo finchè sieno calmati i dolori . Se fosse nondimeno violento il vomito , come lo è per lo più nel calcolo delle reni , e l' ammalato non potesse ritenere nello stomaco il detto rimedio , allora bisognerebbe dargli una presa delle mie goccioline anodine , Par. I. Cap. I. n. 7. , ovvero da 10. in 15. goccioline di laudano liquido di Sidenham , nel brodo d' orzo , o nel Tè , oppure mescolate insieme amendue questi rimedj , che poi farebbe il meglio .

§. II.

IN caso di febbre , e di pletora , ed anche prima che questa si manifesti , conviene trar sangue all' ammalato dal braccio , ed anche copiosamente , sia per rilassare le fibre , sia per calmare la febbre . 2. Se la febbre sopraggiunge , si aumenterà la dose di nitro , per diminuire la tensione troppo grande delle fibre , si applicherà sulla parte inferma nel luogo , in cui si sente il dolore , il cataplasma indicato nella Parte I. Cap. IV. §. 7. , o una vescica piena la metà di latte , o d' acqua calda , si darà di quando in quando all' infermo il clistere della Parte I. Cap. V. §. 4. , e si ungerà il sito , su cui si applica la vescica , con unguento di bismalva , o con olio di tassa-

L. 4.

so.

fo barbasso. Spesse fiate basta, per liberare dal calcolo, bagnar l' ammalato in acqua, in cui siasi fatto bollire della cammomilla, del tasso barbasso, o altre simili erbe emollienti, senza però interrompere l' uso de' suddetti rimedj.

§. 12.

DOpo che il calcolo è steso nella vescica, il che si riconosce alla cessazion del dolore, si scemerà la dose degli accennati rimedj, ma si proseguiranno però ancora per qualche tempo, e vi si unirà la decozione fatta col Tè pettorale, colla radice d' altea, col nitro, &c., come pure lo sciero di latte, e le acque agrette. Il meglio, che possan fare coloro, che soggetti sono al calcolo, e che vogliono renderne, si è l' andarsene alle acque di wallis negli Svizzeri, e berne per qualche tempo, a fine di espellere la renella, che può essere rimasta nelle reni, e nella vescica. Quando però non potessero approfittarsi di questo rimedio, procureranno almeno d' impedire per via della regola, e dei rimedj, che son per indicare, che il calcolo non si riproduca nelle reni. Devono essi astenersi da tutti i vini dolci, come pure da ogni alimento pesante, pituitoso, e difficile a digerirsi, ed usare per ordinaria loro bevanda un' acqua cotta fatta colla radice d' altea, e col nitro, oppure, se così vogliono, qualche acidetta pura, o mescolata con latte. Possono ancora in vece dell' acqua di wallis bere ogni mattina a digiuno dell' acqua di calce ben preparata. Devono ogni giorno, almeno

meno

meno una volta, andar del corpo, e a questa fine prendere ogni mattina a digiuno un pizzico di nitro nel Tè, o nell'acquacotta, o un clistere. Possono altresì valersi alternativamente per bevanda dello sciero di latte dolcificato col miele. Benchè il nitro sia in questa malattia efficacissimo, convien però avvertire, che se non si prende in qualche pozione tiepida, può talor cagionare delle coliche di stomaco.

§. 13.

DEvesi adoperare la stessa cura quando il calcolo s'intrica nell'uretra, e dar tosto all'ammalato il rimedio dolcificante sopradetto: unirvi i serviziali, applicargli un cataplasma emolliente sulle parti, ed ungergli il basso ventre, ed il perineo con unguento di bismalva, o con olio, e quando sarà uscito il calcolo, o se si dubita che ne rimanga qualche altro tuttavia nella vescica, gli si ordinerà per qualche tempo l'acqua di calce, o di wallis. La dieta dev'essere quella medesima, che prescrissi nel precedente paragrafo.

○ ————— ○
CAPITOLO XXXVIII.

Del Calcolo della Vescichetta del Fiele.

§. 1.

GENERANSI alle volte nella vescichetta del fiele calcoli, i quali rimanendo intricati nel duodeno, producono dolori acerbissimi nel destro fianco al di sotto delle false coste, e talvolta pure una febbre accompagnata da in-

L. §.

fiam-

fiammazione. Chi soggiace a questo male ha d'ordinario un color pallido, e rende un'orina gialliccia. E' molto comune in diverse parti dell'Allemagna, dove fin dalla più tenera età si fa uso della birra. Questi calcoli son ordinariamente di minor mole di quel che sieno quelli delle reni, e della vescica, non essendo più grossi di un pisello, sono tondi, scabri, e d'un giallo carico. Se ne ritrova spesso una dozzina, e più nella vescichetta del fiele.

§. 2.

QUando cotesti calcoli s'intricano nel collo della vescichetta del fiele, e cagionano tormini violenti, bisogna applicare sulla parte inferma il cataplasma emolliente della Parte I. Cap. IV. §. 7., e rinnovarlo spesso: unirvi i clisteri, e dare di due in due ore all'ammalato, nell'infusione tiepida di cammomilla, un cucchiarino di tartaro preparato, e 10. grani di tartaro vitriolato, o una presa della mia panacea Elvetica contro l'idropisia, accennata nel Cap. I. n. 5. Egli userà poi per bevanda ordinaria un'acqua fatta con 2. oncie di tartaro, e 4. oncie di zucchero bianco disciolto in una pinta d'acqua bollente. Se cresce il dolore, gli si caverà sangue dal braccio, e gli si farà prendere il bagno, ove il cataplasma non produca il desiderato effetto.

§. 3.

A Fine di prevenire la generazione di queste sorte di calcoli, l'ammalato farà uso del
ri-

CAPITOLO XXXVIII. 151

rimedio e della regola seguente . 1. Prendasi mezza libra di gamberi d'acqua corrente, altrettanto di crescione di fontana, si pesti ogni cosa in un mortajo, se ne sprema il sugo, e diasene la metà all'infermo la mattina a digiuno, e l'altra metà verso le quattr' ore della sera, nel brodo leggiero, per un mese, ed anche più, se bisogna. 2. Si asterrà dalla carne, dalle uova, e dai licori forti, e in vece della birra si servirà dell'acquacotta suddetta. 3. Farà ogni giorno delle passeggiate a cavallo, o in calesse, per agevolare la circolazione del sangue nel fegato ..

o) ————— o)

CAPITOLO XXXIX.

Delle Emorroidi cieche..

§ 1..

CHiamansi Emorroidi cieche certe escrescenze, certi tumori, o nodi, che vengono talvolta all'ano. Dividonsi in vere ed in false. Le prime sono accompagnate da un dolore acuto e cocente, da infiammazione, da febbre, e da forti premiti, ogniqua volta si va del corpo. Le seconde non consistono, se non se in certi tumoretti bianchi all'ano, e non recano alcun dolore, se non quando escon fuori per gli sforzi, che si fanno nell'andar del corpo.

§ 2..

LE Emorroidi vere richieggono la cura seguente . 1. Se violento è il dolore, si trarrà sangue una o due volte all'ammalato dal braccio, o in vece del secondo salasso, gli

L 6

fi

si applicheranno quattro o cinque mignatte all'ano. 2. Si farà cuocere nel latte del tasso barbasso, della cammomilla, o semplicemente del linfeme ben mondato, con mollica di pane bianco, finchè il tutto si riduca in poltiglia, e gli si applicherà sul culo quanto più calda potrà egli soffrirla, rinovandola di quando in quando, finchè interamente si calmi il dolore. Per questo stesso fine dovrà l'ammalato ungersi la parte addolorata con unguento di altea e di linaria, o con olio d'uovo, se può averne, per diminuir la tensione, e calmare il dolore. 3. Farà uso de' clisteri per conservarsi il ventre libero. 4. Se ha la febbre, prenderà di due in due ore una presa della mia polvere febrifuga anodina, Par. I. Cap. I. n. 1., o un'egual dose di polvere antispasmodica, nell'infusione di cammomilla, o in altra pozione dolcificante, avvertendo soprattutto di non servirsi nè di alimenti, nè di bevande, che possano agitare il sangue..

o. ————— (o.

CAPITOLO XI.

Del Flusso Emorroidale eccessivo..

§. 1.

IL Flusso emorroidale è talora tanto copioso, che toglie affatto le forze all'ammalato, e lo getta nella confusione. In questo caso, ed anche prima che sopravenga la emorragia, egli sente degli acerbissimi dolori nelle coscie e nel dorso, delle coliche acute, ha dei premiti violenti, quando vuol andar del corpo, e ca-

e cade spesso in una spezie di febbre quotidiana. Da principio molti mandano fuori materie pituitose e sanguinolente, altri per tutto il tempo che dura l'emorragia, sono soggetti a bruciori, pruriti, ed a sudori nella regione dell'ano, nelle borse, e nella parte superiore delle coscie.

§. 2.

Nella cura di questa malattia convien maneggiarsi in guisa, che non si arresti troppo presto l'emorragia, perchè il sangue concorrerebbe altrove, il che tosto ucciderebbe l'ammalato, o gli cagionerebbe un qualche altro male pericoloso. Ed ecco come fa d'uopo regolarsi. 1. Se non è affatto esaurito di forze l'infermo, si deve, secondo le medesime e la di lui età, trargli da 5. in 14. oncie di sangue dal braccio. 2. Essendo queste sorte di emorragie accompagnate sempre dalla febbre, l'ammalato deve, finchè essa dura, far uso di rimedj sedativi, anodini, e rinfrescanti, per non trarre il sangue alle estremità inferiori, massime ne' vasi emorroidali, ed unirvi quelli, che hanno la virtù di condensare e di legare il sangue. A questo fine egli prenderà di due in due ore una presa della mia polvere febrifuga sedativa, Par. I. Cap. I. n. 1., nel brodo d'orzo, o di tritello di vena, o in vece di essa il seguente rimedio. Prendasi mezz'oncia di polvere antispasmodica, altrettanto di nitro ben depurato, un quarto d'oncia di corallo preparato, ed una dramma di rabbarba-

ro,

ro, e si mescoli il tutto insieme. 3. L'amalato starà in letto, si asterrà dalla collera, e da tutte le altre passioni violenti, come anche da tutto ciò, ch'è capace di far fermentare il sangue. 4. Gli si darà ogni giorno un clistere d'acqua d'orzo tiepida, e di miele rosato, per conservargli il ventre libero, e se ha dei tormini, gli si applicherà il cataplasma del Capitolo XXVII. §. 2. 5. Dopo cessata l'emorragia, egli prenderà per qualche tempo, ogni sera nell'andar a letto, una presa della polvere sedativa poc'anzi indicata, e nel corso della giornata o l'acqua di Selz, o lo sciero di latte sfiorato, in cui si farà gettato un pezzo di ferro rovente, e di quando in quando nel corso dell'anno si farà cavar sangue. Deve in oltre conservarsi il ventre libero o per mezzo de' clisteri, o aggiugnendo una quarta parte di rabbarbaro alla polvere, di cui fa uso.

o)—————o

CAPITOLO XLI.

Del ritardo, e della cessazione del Flusso Emorroidale, e delle malattie, che ne provengono.

§. I.

IL flusso emorroidale, come pure il flusso mensile, può rimaner soppresso, e cessare in occasione di una malattia, per la cattiva regola, o per l'uso de' rimedj ripercussivi, dal che ne nascono infiniti altri mali, fra i quali si possono annoverare il catarro soffocante, l'apoplessia, l'asma, i dolori nelle coscie

cofeie , e nel dorfo , le coliche , e i granchj di ftomaco , e del baffo ventre , i tumori nell'anguinaja , l'ardore , la ritenzione di orina , i premiri nell'andar del corpo , i bruciori e le cotture nell'ano , le emorroidi cieche , le ulcere all'ano e nelle parti genitali , il pifciafanguè , lo fcoglimento di marcia per uretra , il vomiro di fanguè , i mali di capo , e le vertigini per tinaci , le palpitazioni e gli ftringimenti di cuore , gli fcirri del fegato e della milza , le malattie ippocondriache ed ifteriche , &c.

§. 2.

MOlte fon le perfone dell'uno e dell'altro feffo , che in tutto 'l corfo dell'anno , ed in certi giorni fiffi , foggiacono al fluffo emorroidale , fenza che percid ne rimanga alterata la loro falute , ma non così tofto cefla quefto fluffo , ch' effe vengono affalite dall'uno o dall'altro degli anzidetti mali . Quando ciò fuccede , io vorrei che , fe fono pletoriche , fi faceffero trar fanguè dal piede , ufaifero fòvente i pediluvj , e prendefferò ogni giorno un cliftere d'acqua di cammomilla , d'olio , e di fale , abbiano o non abbiano il ventre libero . Poifono ancora , per diffipare l'ofteruzione de' vafi , prendere ogni giorno prima de' loro paffi uno o due cucchiarini dell'Elixir di proprietà di Paracelfo , nell'acqua fchietta , o mefcolata con un po' di vino , e la mattina a digiuno da 5. in 8. pillòle di Becher del peso di 2. grani ciafcuno , e bervi fopra alcune chicchere d'acqua di centaurea calda . Se quefti mezzi

non

non bastano a promuovere di nuovo il flusso emorroidale, esse prenderanno ogni mattina a digiuno, il dopopranzo verso le quattr'ore, e la sera due ore innanzi cena da 3. in 5. delle mie pillole Elvetiche aperitive e corroboranti, Cap. I. n. 1., bevendovi dietro alcune chichere d'infusione di centaurea, senza omettere nè i pediluvj, nè i serviziali emollienti.

§. 3.

CEssando il flusso emorroidale, qualunque ne sia la cagione, e venendo questa cessazione accompagnata dai sintomi accennati nel §. 1., si trarrà tosto sangue all'infermo dal piede, gli si daranno ogni giorno alcuni clisteri emollienti, §. 2., si replicherà il salasso, indi ad alcuni giorni, se così esigono le circostanze, e gli si darà ogni mattina a digiuno, come pure il dopopranzo, una presa delle mie pillole Elvetiche aperitive e corroboranti, e dietro queste alcune chichere d'infusione di centaurea, e la sera nell'andar a letto una presa di spirito glaciale, Par. I, Cap. I. n. 2.. Se poi vi fosse febbre, potrà darsegliene due prese in uno stesso giorno, principalmente la sera.

§. 4.

QUanto alla regola, che si deve osservare in questa malattia, converrà astenersi da tutti gli alimenti crudi, indigesti, salati, e in generale da tutto ciò, che riscalda, o rinfresca troppo, e per ordinaria bevanda si adoprerà qualche acqua acidetta, come sarebbe quella di

di Selz, di Schwalbach, &c., o una bevanda fatta coll'anice, col finocchio, col legno santo, o lo sciero di latte, Cap. XXVIII. §. 2. Chi soggiace a questa malattia deve in oltre tenerli caldi i piedi, e fuggire tutte le occasioni, che possono ridestare le sue passioni.

o) ————— (o)

CAPITOLO XLII.

Del Flusso Emorroidale scieroso.

§. 1.

QUando dai vasi emorroidali, in vece di sangue, esce una materia bianca, o gialliccia, si dà a questo scolamento il nome di flusso emorroidale scieroso. Questa materia è qualche volta sanguinolenta, e questo scolamento, non altrimenti che il vero flusso emorroidale, porta seco dei tormini, e dei dolori nelle reni, dei forti premiti, e in alcuni dei tubercoli, dei pizzicori, e dei bruciori all'ano.

§. 2.

Questo male procede per lo più dalla debolezza de' vasi linfatici, e dei rami esteriori delle vene emorroidali, ed anche delle tuniche degl'intestini. Non esige altro, se non che si dia mattina e sera a chi vi soggiace la seguente polvere, per evacuare l'umore, che lo produce, e fortificar gl'intestini. Prendasi mezz'oncia di rabbarbaro polverizzato, un quarto d'oncia di corallo preparato, altrettanto di limatura di ferro, e si mescoli il tutto insieme. Gli adulti ne prenderanno mattina e sera a digiuno quanto può capirne la punta d'un col-

coltello, e più, nel brodo, e se ne hanno il mezzo, bevanno per qualche tempo la mattina a digiuno qualche acqua minerale corroborativa. Ove poi non piacesse loro questo rimedio, potranno prendere ogni mattina una presa delle mie pillole Elvetiche aperitive e corroboranti in una chicchera d'infusione di centaurea, di meliloto, o di altra infusione amara, astenendosi da ogni alimento grasso, oleoso, crudo, e difficile a digerirsi.

e) ————— (o)

CAPITOLO XLIII.

Del Pisciafanguie.

§. 1.

Molto frequente è questo male. Il fanguie viene talor dalle reni, e talora dalla vescica urinaria. Nel primo caso si sentono nella region delle reni dolori acuti, e l'orina è molto tinta di fanguie: nel secondo questa è meno sanguinolenta, ma si rendono talvolta per la verga grumi di fanguie, e i dolori si fanno sentire nella parte media della regione ipogastrica. A questo male si uniscono spesso la ritenzion d'orina, e premii violenti, massime quando ha la sua sede nelle reni. Sono alcuni, i quali insieme coll'orina lasciano colar del fanguie, senza sentir dolore, o accorgersene, e questo procede dalla debolezza de' vasi sanguigni, i rami de' quali vengono a terminarsi nella vescica. E' cosa molto pericolosa, se questo accidente succede frequentemente.

§. 2.

§. 2.

QUando questo male è cagionato da cessazione del flusso menstruale, o emorroidale, o da una emorragia di naso, non richiede altri rimedj, se non se gl' indicati nel Cap. XXIX. §. 3. e 4. Se proviene da un umore reumaticale fissatosi in detta parte, si useranno per guerirlo quelli, che già prescissi pel reumatismo. Se procede dal calcolo nella vescica, non può farsi cessare, se non si cava fuori il calcolo medesimo. Se viene da una caduta, o da colpo ricevuto nella regione del basso ventre, si trarrà incontanente sangue all' infermo, una, o due volte, e gli si darà di due in due ore una presa della mia polvere febrifuga, Par. I. Cap. I. n. 1., o la stessa quantità di polvere antispasmodica, con altrettanto di polvere di corallo nell'acqua vulneraria, o nel Tè ordinario. Se poi procede dal rilassamento, e dalla debolezza de' vasi sanguigni, il che è molto ordinario nelle persone lubriche, è cosa rara, che si possa guerire, si può nondimeno far uso de' seguenti rimedj, che sono i più efficaci. 1. L' infermo prenderà ogni mattina tre prese della mia polvere contro le febbri fredde, Par. I. Cap. I. n. 13., o un' egual dose di polvere di scorza di china ben fresca, e ben scelta, nell'acqua di schwalbach, di spà, o altra tale acidetta, e due altre prese il dopopranzo, e si varrà della stessa acqua per sua ordinaria bevanda, astenendosi dal commercio delle donne, dalle passioni, e da quanto può riscaldargli il san-

sangue, come pure dagli alimenti grassi, oleosi, ed indigesti, e dai licori forti.

o) ————— o

CAPITOLO XLIV.

De' sudori, che accompagnano il Flusso Emorroidale.

§. 1.

Dissi di sopra, che per la maggior parte coloro, che soggetti sono al flusso emorroidale, sudano molto al perineo, e nelle parti naturali, massime la notte, e quando fanno dell'esercizio, il che riesco loro di un grave incommodo. Questi sudori sono talvolta cotanto acri, che scorticano la pelle, ed ulcerano le parti.

§. 2.

Benchè questo incommodo sembri poca cosa, merita nondimeno qualche attenzione, perchè molti si sono procacciate malattie pericolose per avergli male a proposito impediti.

§. 3.

Pervenendo esso dall'acrimonia del sangue, che concorre nelle glandulette di dette parti, e che va trapelando per la pelle, conviene prima di tutto coreggerla. Si prenderanno perciò le acque di schwalbach, o di Selz, lo sciero di latte ferrato, Cap. XXVIII. §. 2., in dose d'una mezza pinta per ogni mattina a digiuno, per qualche tempo, dopo averlo fatto intiepidire, e il dopopranzo verso le quattr'ore una presa delle mie pillole Elvetiche aperitive.

CAPITOLO XLIV. 261

tive, e corroboranti. Si può frattanto bagnare pure un pajo di volte la parte con acqua tiepida ed alcune goccioline d'aceto, e dopo averla rasciugata, ungerla con unguento di canfora bianca. Servonsi alcuni per questo dell'olio di mirra, o dell'unguento populeon, altri dell'olio di mandorle dolci, e tutti questi rimedj sono buoni egualmente. Chi è soggetto a questo incommodo deve astenersi dagli alimenti, e dalle bevande, che riscaldano il sangue.

o)—————(o)

CAPITOLO XLV.

Della Ritenzione d'Orina.

§. 1.

HAnvi tre sorte di ritenzione d'orina, cioè la disuria, in cui si orina con difficoltà, e con dolore, la stranguria, in cui si orina a goccia a goccia con bruciore, dolore, e sforzi grandi, e la iscuria, che consiste in una soppressione totale d'orina.

§. 2.

POtendo le cagioni di questi mali, che riescono gravosi sommamente, e dolorosi, avere la lor sede non solo nella vescica, ma nelle reni ancora, e nelle vicine regioni, o nell'uretra, conviene conoscerle prima di accignerli a guerirgli, conciossiachè procedono spesso volte dalla ostruzione delle reni, la quale impedisce il corso dell'orina nella vescica, dalle renelle, o dai calcoli, che spesso vi si ritrovano, o dalla loro infiammazione, come osservai nella prima Parte. Spesso son cagionati da un calcolo,

lo, che tura l'orifizio della vescica urinaria, e talora, ma non mai in così alto grado, come per le altre cagioni, dalla contrazione spasmodica della vescica, in coloro, che sono soggetti alle malattie ippocondriache, ed isteriche. In parecchi, e massime ne' fanciulli, provengono da un raffreddamento, dall'uso delle frutta immature, dei vini nuovi, della birra non abbastanza fermentata, dei rimedj ripercussivi, dall'uso interno o esterno delle cantaridi, dal rilassamento, e dalla debolezza de' muscoli, che spingono l'orina dalla vescica nell'uretra, cosa ordinaria ne' vecchj, dall'uso prematuro, e frequente del coito. Procedono sovente dalle ulcere, e dalle carnosità, che si formano nell'uretra nelle malattie veneree, come vedremo nella Parte seguente. Accade talvolta, che il sangue emorroidale si spande nella vescica, e produce una ritenzion d'orina, ma può essa provenire ancora dalla scabbia, e dalle croste, che vi si formano,

§. 3.

Trovandosi generalmente ogni ritenzion d'orina accompagnata dalla contrazione spasmodica della vescica, o degli uretri, conviene dare, per farla cessare, due o tre volte il giorno all'ammalato il clistere emolliente del Cap. XXIX. §. 2., a fine di vuotare gl'intestini, massime quando la ritenzione vien prodotta da alimenti, e bevande, che riscaldano il sangue. Se gli applicherà pure sulla regione del basso ventre, presso la vescica, il cataplasma emolliente

liente indicato nella Parte I. Cap. IV. §. 7., dopo di aver unta la parte coll' unguento di bismalva, o coll' olio di mandorle dolci tiepido. Gli si darà sovente del brodo d' orzo, o di tritello di vena, o dell' acquacotta fatta con gramigna, regolizia, e cammomilla, o dello sciero di latte tiepido, e negl' intervalli un cucchiaro d' olio di mandorle dolci mescolato con eguale quantità di sugo di cedro.

§. 4.

SE la ritenzione d' orina è prodotta dal ingorgamento delle reni, il che si conosce alla tensione, ed al dolore, che sente l' infermo nella parte, in cui sono situate, come pure ne' lombi, ed ai mucchi, che si trovano mescolati coll' orina, gli si darà di due in due ore, e poscia per alcun tempo mattina e sera, una presa del mio spirito glaciale, Par. I. Cap. I. n. 2., nel Tè leggiero, o in vece il siroppo d' Harris, che si prepara nella maniera seguente: Prendansi due oncie d' olio di mandorle dolci, mezz' oncia di fior di zolfo, un quarto d' oncia di sal di tartaro, ed altrettanto di nitro, tre oncie di manna, e due di siroppo di bismalva, si mescoli il tutto insieme, e diansene di quando in quando alcuni cucchiarinini all' ammalato, facendogli bere dietro alcune chiecchere d' infusione di radice di bismalva, di pimpinella, o d' acqua di Selz. Rispetto al clistere, ed al cataplasma, che si deve applicare dove è maggiore la tensione, con-

converrà regolarli nel modo indicato nel precedente paragrafo.

§. 5.

SE essa procede dalla sabbia, o dalla renella, che si ritrovano nelle reni, il che si conosce ai dolori, che l'infermo sente nei lombi, che si estendono fino alla coscia, ai vomiti, e ai tormini, a' quali soggiace, ed alla sabbia, che l'orina depone, gli si darà 1. un clistere composto con decozione di camomilla, olio, e sale, che si replicherà tre o quattro volte il giorno: 2. gli si applicherà sul basso ventre, e sui lombi il cataplasma della Parte I. Cap. IV. §. 7., e gli si faranno prendere alcuni bagni d'acqua, e di latte: 3. gli si darà spesso un cucchiajo d'olio di mandorle dolci col sugo di cedro, e gli si farà bere sopra una chicchera di decozione d'orzo radolcita con miele, ed aguzzata con qualche cucchiajo d'aceto. L'acqua di Selz è ottima in simil caso. 4. Quando il dolore, il vomito, e la ritenzione d'orina pervenuti sono a grado tale di violenza, che può temersi d'una infiammazione, o delle convulsioni, allora conviene cavargli sangue dal braccio a proporzione dell'età sua, e delle sue forze, e dargli dopo, come pure in capo ad alcune ore, una presa delle mie goccioline anodine, Par. I. Cap. I. n. 7., o 15. goccioline anodine di Hoffman mescolate con eguale quantità di laudano liquido di Sidenham nella sua pozione. Nulla tanto giova ad estirpare questa malattia, quan-
to

to l'uso interno ed esterno dell' acqua di wallis , di cui ho parlato nel Capitolo XXXVII. , mentre essa è pregna di molta calce , ed è peccato che le strade , che vi conducono , sieno tanto disastrose , e tanto ne sia orrido il soggiorno .

§. 6.

SE la ritenzione proviene da qualche malattia isterica , ed è accompagnata da convulsioni , si darà incontanente all' ammalato il clistere sopraccennato , gli si applicherà sul basso ventre un cataplasma emolliente , e gli si darà una presa dell' essenza corroborativa contro i vapori isterici , Par. I. Cap. I. n. 8. , in acqua calda di cammomilla , ovvero si piglierà un quarto d' oncia di spirito di corno di cervo , 60. goccioline anodine di Hoffman , e 30. goccioline di laudano liquido di Sidenham , si mescolerà insieme il tutto , e se gliene daranno due o tre volte il giorno da 30. in 35. goccioline nella stessa acqua . Per prevenire le ricadute , conviene che faccia uso per qualche tempo de' rimedj da me indicati nella terza Parte contro le malattie isteriche .

§. 7.

SE è cagionata da raffreddamento , basterà applicare sul basso ventre dell' infermo , il cataplasma indicato nella Parte I. Cap. IV. §. 7. , dargli il clistere del §. 5. , l' acqua d' orzo del §. 5. , ed una presa delle mie goccioline anodine contro le convulsioni , Par. I. Cap. I. n. 7. , in vece dell' acqua d' orzo col miele e coll'

M

aceto ,

aceto, e di quando in quando alcune chicchere d'acqua di petrosellino calda.

§. 8.

SE è cagionata dall'acrimonia de' medicinali usati, converrà regolarsi come ho detto nel §. 3. Indicherò nella Parte seguente qual cura le si convenga, quando procede da una cagione venerea. Se è prodotta dal sangue, che si è sparso nella vescica, gli si applicherà sul basso ventre un cataplasma emolliente, a cui si unirà il clistere, di cui ho tanto spesso parlato in questo Capitolo, e l'acqua d'orzo del §. 5. Si arguisce, che la ritenzione d'urina proceda da questa cagione, quando l'ammalato manda spesso del sangue fuori per la verga, e sente dei dolori ne' lombi, e nella vescica.

§. 9.

FOrmasi alle volte una spezie di scabbia nella vescica, accompagnata da un bruciore intollerabile, e da dolori acuti, che producono la contrazione delle fibre della vescica, ed una totale soppressione di urina. Se ciò succede, l'ammalato deve prendere di due in due ore due cucchiari del seguente rimedio, bevendovi dietro del brodo d'orzo, o di tritello di vena. Prendansi due oncie di terebintina, tre gialli d'uovo, si incorporino queste due cose ben insieme, aggiungavisi un'oncia d'olio di mandorle dolci, quattr'oncie d'acqua d'orzo, due oncie di siroppo di bismalva, e mezz'oncia di fior di zolfo. Non si ometta nè il ca-

ta-

raplasma, nè il clistere, di cui parlai di sopra. L'ammalato non prenderà altro nutrimento, che brodo d'orzo, di riso, e di tritello di vena.

o) ————— (o)

CAPITOLO XLVI.

Del Piscialatte.

§. 1.

Questa malattia è una specie di confunzione, conciossiachè quel licor bianco, che vien fuori per la verga insieme coll'orina, altro non è, se non il succo nutrizio. Da principio l'orina è nel suo stato naturale, diviene poscia ardente e rossiccia, e finalmente di color di latte. Dimagrasì il corpo a occhio veggente, sopravviene una febbre continua, a cui va unita una totale soppressione di orina. L'ammalato è alterato in sommo grado, ha la pelle asciutta e scabra, non suda, non isputa, e non si soffia il naso.

§. 2.

Questo male tiene spesso dietro ad una febbre infiammatoria, la quale abbia indebolito considerabilmente il corpo, e liquefatto il sangue e gli umori. Procede talora da un mal cronico, in cui si siano adoperati rimedj resolutivi, e particolarmente preparazioni mercuriali. Quando proviene da queste cagioni, può guerirsi per mezzo de' corroborativi e della regola, ma è quasi incurabile, se procede dalla eccessiva debolezza de' visceri e degli ureteri, e se è inveterato.

M 2

§. 3.

§. 3.

E Cco qual cura vi si richiede . 1. Si principierà dal purgar l'ammalato col rabbarbaro , di cui piglierà egli due volte il giorno quanto capisce sulla punta d'un coltello nel brodo leggiero , ovvero prenderà la mattina a digiuno , e il dopopranzo verso le quattr' ore da 5. in 8. delle mie pillole Elveriche aperitive e corroboranti , Cap. I. n. 1. 2. Dopo averlo così purgato per cinque o otto giorni , si procurerà di fortificargli i nervi coll' uso de' seguenti rimedj . Si prendano 4. oncie d' elettuario d' arancio , 2. oncie d' elettuario d' asenzio , mezz' oncia di scorza di granato in polvere , e tanto di siroppo d' arancio quanto basta , e compongasene un elettuario di buona consistenza , di cui l' infermo piglierà ogni mattina a digiuno , e intorno alle quattr' ore dopo il meriggio , grosso quanto una noce , bevendovi dietro alcune chicchere d' infusione di centaurea . S' egli avrà febbre , si contenterà di prendere la mattina a digiuno un cucchiarino di detto elettuario , e alcune ore dopo alcune chicchere d' acqua di Scwalbach , o di Selz , di cui pure potrà valersi nel corso della giornata , secondo gli detterà la sua sete . Non potendo avere questo rimedio , egli prenderà la mattina a digiuno , e la sera , una presa della mia polvere contro le febbri fredde , Par. I. Cap. I. n. 13. , nel Tè , o nell' acqua , e vi beverà dietro alcune chicchere d' acqua di centaurea , o di germandrea , essendo questo il più efficace rimedio ,

dio, che usar si possa per calmare la febbre, ond'è per lo più accompagnata questa malattia. 3. Gli si applicherà sulla regione de' lombi il seguente sacchettino, dopo averlo fatto bollire nel vin rosso, ed averlo spremuto bene, e lasciato raffreddare. Si pigliano da 4. in 5. manipoli, e più, di foglie di rose rosse, (dette da' Francesi *roses de Provins*) secche, o la stessa quantità d'erba vulneraria, e si chiudono in un sacchetto di tela. Quando la malattia è accompagnata dalla febbre, molto più efficaci sono i bagni d'acqua fredda: e l'ammalato potrà prendergli per alquanti minuti, e fregarli poscia le reni e il basso ventre con un pezzo di flanella.

§. 4.

LA regola non poco contribuisce alla guarigione di questo male, e tale dev'essere, che nutrisca il corpo, e fortifichi i nervi. L'infermo deve prendere poco nutrimento per volta, affinchè lo stomaco possa digerirlo a dovere, anzi il nutrimento dev'essere asciutto, nulla essendo a lui più contrario degli alimenti acquosi, grassi, oleosi, e che possono risvegliare la febbre e caricare più del bisogno lo stomaco. Il miglior cibo, di cui possa valersi, è la carne bianca arrostita, e il pan bianco, di cui deve toglier via la mollica, egli potrà unirvi i brodi di carne cotti con riso o con farina di vena, purchè ne pigli poco per volta, ed avverta di toglierne via il grasso. Se non ha febbre, userà per sua bevanda ordinaria, l'acqua di fontana mescolata con alquanto di vin rosso. Le persone agiate possono valersi degli aci-

M 3

detti

detti , e bere un po' di vin rosso , quand' hanno mangiato , ma in generale conviene astenersi quanto è possibile dal bere , comechè uno si sentisse alterato estremamente . Dopo ancora , che sarà cessata la malattia , si deve osservare per qualche tempo la regola fin qui prescritta , e fare soprattutto dell' esercizio , potendo questo ultimo contribuire a fortificare il corpo quanto i più efficaci corroborativi . Il miglior esercizio che far si possa , è quello del cavalcare , o dell' andar in calesse per luoghi salusti . Convien principiare a farlo dal momento , in cui cessa la febbre , la mattina un' ora dopo aver fatta colezione , e la state intorno alle cinque o alle sei ore della sera .

o)-----o

CAPITOLO XLVII.

Della Incontinenza di Urina .

Questo è un male assai comune specialmente ne' fanciulli , e nelle donne negli ultimi mesi della loro gravidanza , o dopo un parto laborioso , come vedremo nella terza Parte , ma egli assale altresì i vecchi , e gli adulti , essendo spesso volte una conseguenza dell' apoplessia in chi è soggetto alle convulsioni ed al mal caduco , del prematuro uso delle donne , del morbo venereo , delle emorroidi , della tosse nelle donne isteriche , del calcolo , e delle ulcere della vescica urinaria .

§. 2.

PEr potere guerir questa malattia , convien procurare di scoprirne la cagione , mentre distrutta questa , cesserà tosto quella . Per esempio , se essa proviene da un'apoplessia , o dalla paralisa delle inferiori estremità , si principierà dal rimediare a queste due malattie , nel modo che dissi di sopra nel Capitolo VI. , e l'incontinenza sarà tosto guerita .

§. 3.

SE è cagionata , come talvolta succede , da un brucior d'orina , e dalla contrazione della vescica , si adopreranno i rimedj dolcificanti , ed attenuanti , come farebbe l'acquacotta fatta con la gramigna , la regolizia , la radice d'altea , o il legno santo : l'ammalato prenderà sovente due cucchiarini di siroppo di bismalva mescolato con olio di mandorle dolci , oppure mattina e sera una presa della mia polvere febrifuga anodina , Par. I. Cap. I. n. 1. , nell'acquacotta medesima .

§. 4.

SE procede dalla debolezza e dal rilassamento delle parti , si prenderanno delle foglie di rose rosse , di marrobio bianco , di salvia , e di maggiorana , si faran bollire nel vin nero , e poste tra due pannolini si applicheranno sulla regione inferiore del basso ventre , e si darà per qualche tempo all'ammalato o l'elettuario , o la mia polvere contro le febbri fredde , Cap. XLIV. §. 3. Le donne terranno per qualche tempo questo facciettrino fra le loro coscie ,

M 4.

e il

e il loro basso ventre . Alcuni ammalati ricevono un gran sollievo dai bagni caldi , l'acqua de' quali contenga molte particelle ferruginee , quali son quelli di wallis , di Schinznacht , e di Niederbaaden nel paese degli Svizzeri . Il fumo dello storace , del laudano , o della gomma animata , basta assai sovente per guerir le donne dall' incontinenza d' orina . Si mettono queste droghe in uno scaldino , questo si ripone dentro una seggetta , e l' ammalata vi si mette a sedere per riceverne il vapore .

o) ————— o

CAPITOLO XLVIII.

Di alcune Malattie della Verga .

§. 1.

I Giovani lussuriosi e datti al peccato della mollezza soggiacciono spesse volte a' rizzamenti dolorosi , a' quali non molto dopo succedono contrazioni spasmodiche , convulsioni , e perfino l' epilepsia .

§. 2.

QUando il male è leggiero , esige piuttosto una buona regola , che rimedj . Se l' ammalato è pletorico , si farà trar sangue qualche volta nel corso dell' anno , e prenderà di due in due mesi una presa del mio spirito glaciale , Par. I. Cap. I. n. 9. , o di sale di Sedlitz , la mattina a digiuno nell' acqua tiepida . Procurerà di schivare ogni occasione di ricaduta , e si sceglierà una qualche occupazione , che distolga l' immaginazion sua dalle idee lascive : deve mangiar poca carne , non bere che acqua , o licori rinfrescanti , far molto esercizio , dor-

mir

mir poco , e non mai su piumacci , ma sibbene sopra un matterazzo di crini , o sopra un pagliariccio . §. 3.

Questo male è talvolta violentissimo , e proviene spesso non tanto dalla suddetta cagione , quanto dalla eccedente debolezza de' nervi , che soggetti gli rende a contrazioni spasmodiche , dal calcolo della vescica , e da altre somiglianti malattie . Per l' ordinario vi soggiacciono le persone , che hanno un temperamento cattivo , o che a forza di aver commercio con donne , hanno resti i nervi di dette parti tanto sensibili , che diventano soggetti a tali spezie di contrazioni . In questo caso si applicherà sulla verga il cataplasma emolliente indicato nel Cap. IV. §. 7. della prima Parte , o si farà bagnare l' infermo nell' acqua e nel latte , in cui si siano fatte bollire dell' erbe emollienti , e vi si lascerà dentro insinattanto che cessi la contrazione . Se poi questa è cagionata dalla debolezza de' nervi , si userà il rimedio , e la regola , che indicai nel Capitolo XLIV. §. 3. e 4.

§. 4.

Un altro accidente , a cui è soggetto il viril membro , si è una sciolazione di serosità e di seme per l' uretra unita a bruciore e dolore , che si aumenta quando si fa dell' esercizio . Questa sciolazione è difficile ad essere arrestata massime ne' vecchi , ch' ebbero il vizio delle donne , e quando dura lungo tempo , cagiona delle malattie croniche , come sono la consunzione , la

sterilità, le debolezze de' nervi, l'idropisia, ed il mal caduco. Quando questa scolazione di seme interviene in persone robuste, pletoriche, e caste, massime la notte, per aver mangiato o bevuto più del solito a cena, non ha nulla di pericoloso, purchè non sia troppo frequente, che se lo fosse, converrebbe cavar loro sangue dal braccio, proibir loro per qualche tempo la carne, il vino, e i licori forti, e dar loro di quando in quando la sera, quando vanno a letto, una presa della mia polvere febbrifuga anodina, Par. I. Cap. I. n. 11., o 15. grani di polvere antispasmodica mescolata con altrettanto di nitro nell'acqua, o nell' Tè, e farle coricare sopra un pezzo di cuojo di Prussia.

§. 5.

SE la scolazione proviene dal rilassamento e dalla debolezza delle parti, l'ammalato prenderà per qualche tempo quanto ne capisce sulla punta di un coltello di rabbarbaro in polvere, nel brodo leggiero, o dopo essersi per alcuni giorni purgato con un' acquacotta di rabbarbaro, prenderà per otto o dieci giorni le mie pillole Elvetiche, aperitive, e corroboranti, Cap. I. n. 1., oppure ogni mattina a digiuno da 8. in 10. delle pillole seguenti. Si prenda un quarto d'oncia di pillole di Becker, e 25. grani di mercurio dolce, e se ne formino delle pillole del peso di grani due ciascuna. Se questi rimedj non fermano la scolazione, gli si darà per qualche tempo mattina e sera la mia polvere contro le febbri fredde, Par. I. Cap. I. n. 13., e dietro di essa alcune chicchere di centaurea. Egli può, in vece della detta polvere, pren-

prendere mattina e sera un cucchiarino del seguente elettuario, bevendovi dietro della infusione di centaurea. Si pigliano 2. oncie di polvere di scorza di china scelta, un quarto d'oncia di corallo preparato, altrettanto di polvere di scorza di granato, 2. oncie di conserva, e 4. oncie di siroppo d'arancio. Se questo rimedio non opera, si schizzerà nell'uretra dell'ammalato, finchè si arresti la scollazione, l'acqua seguente, e gli si darà il rimedio sopraccennato. Si prendano due oncie di calce viva, vi si versi sopra una pinta d'acqua fredda, e in capo a 24. ore si trasfonda questa in altro vaso, vi si aggiunga un'altra pinta d'acqua, e si travasi di nuovo in capo a 24. ore, e vi si faccia bollir dentro un'oncia d'aloe in polvere, ed un quarto d'oncia di mercurio dolce, si lasci quindi riposare, si riponga in una caraffa, e se ne schizzi mattina e sera una mezza chicchera tiepida nell'uretra.



PEr accelerare l'effetto di questo rimedio, conviene non solo, che l'infermo stia in regola, mentre se ne serve, ma che vi si sottoponga altresì per alcuni anni. Egli deve antiporre gli alimenti asciutti ai liquidi, non bere se non acqua, o decozione fatta con radice di china, e quando sia avvezzo al vino, potrà darglisene alquanto di nero dopo i suoi pasti. Deve soprattutto astenersi dalle donne, e far ogni giorno dell'esercizio. Se la scollazione è prodotta da ulcere veneree fermatesi nell'uretra, si userà la cura, che indicherò nella Parte seguente nel Capitolo delle malattie veneree.

§. 7.

Accade talvolta , dopo una caduta , o un colpo ricevuto , o una malattia preceduta , ovvero per un cumulo , che si fa ne' gran caldi , dell'umor acre sotto il prepuzio , che questo si gonfia , s' infiamma , e non può più ripiegarsi dietro la ghianda , onde ne provengono acuti dolori , e spesso ancora una ritenzione di orina . Quando questo accade , e quando vi è infiammazione , deesi cavar sangue all' ammalato dal braccio , e fargli bagnar la verga nel latte caldo , in cui siasi fatto bollire della cammomilla , del zafferano , o del fior di taffo barbasso , e di bisnava , finchè si dissipi l' enfiagione , e poi applicarvi sopra per alcuni giorni l' impiastro indicato nella Parte I. Cap. I. n. 11. , o altro , che si reputi conveniente . Talvolta è tanto forte l' infiammazione , e tanto ristretta si trova la ghianda , che convien ricorrere alla lancetta per cavarla d' impaccio . Fatta l' operazione , si medicherà ogni giorno la piaga , applicandovi sopra un poco di filaccia bagnata nel balsamo vulnerario indicato nella Parte I. Cap. I. n. 12. , finchè sia interamente guerita .

§. 8.

LE febbri infiammatorie maligne sono spesso seguite da un tumore acquoso al prepuzio , come è succeduto a tutti gli ammalati , e massime ai fanciulli , che furono assaliti dalla febbre catarrale maligna , che affisse l' inverno scorso il paese degli Svizzeri . In questo caso convien applicare più volte il giorno sulla parte un sacchettino pieno di foglie di ruta , di salvia , di maggiorana , e di

fi-

simili altre piante aromatiche , alle quali si aggiungerà un poco di spirito di canfora caldo , e purgarlo ogni giorno con la magnesia bianca , mescolata con una quinta parte di rabbarbaro , di cui prenderà , se è adulto , un cucchiarino tre o quattro volte il giorno nel brodo o nell'acqua . Può darsegli ancora la mia panacea Elvetica contro l'idropisia , Cap. I. n. 4. , la quale evacuerà in poco tempo l'umore per le orine , cioè una presa di due in due , o di tre in tre ore nell'acqua , o nel Tè .

§. 9.

A Vvien qualche volta per la medesima cagione , che si raggrinza il prepuzio , e si ripiega dietro la corona della ghianda , e tanto la stringe , che non può più in verun modo ritornare al suo luogo e ricoprire la ghianda , dal che ne risultano , quando l'enfiagione è grande , e vi è un' infiammazione , dolori acerbi , e una ritenzione d'orina . Questo male richiede la cura indicata poc' anzi al §. 7. ed 8.

o) ————— (o

CAPITOLO XLIX.

Delle Malattie Nervose, o Ippocondriache .

§. 1.

O Gnun sa , che la quarta parte degli abitanti delle Città , che per obbligo del loro stato , o per un effetto della naturale loro pigrizia menano una vita sedentaria , soggiace alle malattie nervose . Se questa è cosa costante , egli non è men vero , che per la maggior parte si rovinano a forza di rimedj , perciocchè prendono i sintomi della
ma-

malattia per la cagione primitiva de' loro mali , e mutano tanto spesso di rimedj , ch' essa produce nelle differenti parti del corpo nuovi accidenti. Mi estenderò alquanto più su questa malattia , che non ho fatto sulle altre , per impedire , che chi vi soggiace non s'immagini di essere in uno stato peggiore di quel , che è in verità , ed affinchè si tralascino i rimedj , che potrebbero esser nocivi. Molti sono gl' ippocondriaci , che riguardano ogni menomo mal di capo , che loro venga , come un foriere dell' apoplezia , altri ad ogni menoma colica , e ad ogni mal di stomaco si credono minacciati d' un' infiammazione in dette parti , perchè non fanno , che tali accidenti sono un effetto della primitiva malattia , e che cesserebbero , quando questa si guerisse una volta . Tratterò dunque di questa malattia , a cui si dà comunemente il nome d' ippocondriaca , facendomi fino dalla sua origine , e seguitandola poscia in tutti i suoi progressi , affinchè chiunque vi soggiace , conosca il suo stato , non disperì mai della sua guerigione , e si serva dei rimedj , che le sono adattati , finchè ne sia del tutto liberato .

§. 2.

POchissimi sono coloro , che non sappiano , che la circolazione del sangue , e degli umori , l' elasticità delle carni e delle fibre , il movimento del cuore , e in una parola la nostra salute e conservazione dipendono principalmente dalla libera circolazione degli spiriti , che passano dal cervello per la midolla spinale in tutte le parti del corpo , e che i nervi sono i canali , che servono alla di-

stri-

ffribuzione di detti spiriti impercettibili. Tale si è la natura di questi spiriti, che alla menoma irritazione, che soffrano, questa si comunica immediatamente al cervello, il che lo costringe a tramandare una maggiore quantità di spiriti animali in quel luogo, in cui è l'irritazione. Se l'irritazione non è grande, produce un semplice brulichio nella parte, se poi è forte, ne nasce una contrazione, ed una sensazione incomoda, e se cresce a segno, che gli spiriti concorrano in molta quantità alla parte, produce dolori, granchj, moti convulsivi, e tumori. Di ciò è facile convincersi con ferire la pelle, o con irritarla in qualunque altro modo, e non essendovi quasi parte alcuna nel nostro corpo, la quale non sia provveduta di nervi, si può render ragione degli accidenti, che nelle malattie ippocondriache sopraggiungono nelle diverse parti, ond'è composto.

§. 3.

LA cagion prossima di questa malattia consiste in una maggiore, o minore irritazione di certi nervi del corpo, la quale può procedere da parecchie cagioni, da un cumulo talvolta di materia acre, acida, biliosa, o fredda, e pituitosa nello stomaco, o dall'aria, che vi è rinchiusa, e che lo distende, dal che ne provengono granchj di stomaco, tensioni nel petto, mali di cuore, dolori di capo, vomiti violenti, affanni, ed inquietudini d'animo, e in chi ha i nervi deboli, convulsioni, e moti convulsivi. Se l'irritazione giunge agl'intestini, è seguita da coliche, da flatuosità, da una tensione nel basso ventre, che si estende fi-

no

no al petto , da stitichezza , cosa ordinaria nelle malattie ippocondriache , o da diarrea . Se sono irritati i nervi del petto , o gli altri , che con questi simpatizzano , ne risulta una tosse , e delle ansietà . Se l' irritazione è nelle reni , ne nascono dolori , e ritenzioni d' orina , che per lo più è chiara , e limpida . Se è nei nervi del fegato , o della milza , si manifesta con angosce , ed inquietudini di spirito , ora con un' allegrezza , ora con una malinconia straordinaria , che traggono agli ammalati , loro mal grado sovente , e senza il meno- mo motivo , e le lagrime , ed il riso , con difficoltà di dormire , e con agitazioni nel sonno , con un' abbondante salivazione , con una soffocazione , col freddo a' piedi , ed alle mani , e con sudori freddi . In breve , quando il sistema nervoso si ritrova indebolito , bastano non solamente le passioni violenti , ma anche tutto ciò , che agisce immediatamente sui nervi del cerebro , ad irritarlo , ed a produrre moti convulsivi in tutte le parti del corpo . Siccome le donne sono assai più soggette a questa malattia , di quel che vi sieno gli uomini , così tratterò in un articolo separato di quanto le concerne .

§. 4.

Questa malattia si manifesta nella maggior parte degli uomini , che vi soggiacciono , nella milza , nel fegato , nello stomaco , e negl' intestini . Il fegato , e la milza sono due visceri , ne quali il sangue circola lentamente per avere il tempo di convertirsi in bile , e possono patire un' irritazione , quando i loro vasi , o per un effetto dell'

dell' eccessiva lor debolezza , o per la copia grande del sangue , che vi si accumula , e vi si condensa , si dilatano a segno di cagionare nei nervi una tensione violenta . Questa stessa debolezza può altresì produrre irritazioni nello stomaco , e negl' intestini , quando le fibre di queste parti non hanno forza bastante per digerire i cibi , e il succo gastrico non è abbondante , quanto è necessario per discioglierli : in questo caso lo stomaco si riempie di pituita , di acrimonie , e di venti , che producono poscia gli anzidetti accidenti .

§. 5.

DA varie cagioni può procedere questa debolezza : può essere ereditaria , come lo insegna l' esperienza , o cagionata dalla dissipazion troppo grande degli spiriti animali , da perdite notabili di sangue , o dallo smoderato uso degli amorosi diletti , e da una vita troppo sedentaria ; imperciocchè il difetto d' esercizio indebolisce il corpo , e specialmente i visceri , il fegato per esempio , e la milza , ne' quali rallenta la circolazione . Basta per convincersene osservare la differenza , che passa tra un contadino , ed una monaca . Il primo , che ogni giorno fa del moto , è svelto , ben disposto di sua persona , e non fa che siano le malattie ippocondriache , dove la seconda menando una vita sedentaria s' infiacchisce , mena una vita languente , e non gode neppur un giorno di buona salute . Si può dire con certezza , esser questa per l' appunto quella malattia , che pretende indicare il Boerhaave co' nomi di fibra tesa , e di fibra molle . E' senza dubbio questa diversità di cagioni

ni

ni quella , che richiede ogni giorno metodi curativi tanto diversi contro un male , che gl' ignoranti sogliono curare , in tutti i casi , con un solo e medesimo rimedio .

§. 6.

QUando la malattia non fa che principiare , e non ha fatti ancora notabili progressi , si può spesso guerire per mezzo de' rimedj , e della regola : ma quando è inveterata , quando certi vasi de' visceri hanno patita una dilatazione , per cui han perduto il loro tuono , e quando gl' intestini , per le contrazioni spasmodiche che soffrono , si sono in certi siti dilatati , e ristretti in certi altri , cosicchè l' aria più non può circolarvi , essa è per l' ordinario incurabile , massime nelle persone attemperate . Accade sovente , che si guerisce da questa malattia , o se ne prova almeno un gran sollievo per via di un' altra , che sopraggiunga , come farebbe a cagion d' esempio una febbre quartana , un flusso emorroidale , una risipola , una soccorrenza , un vomito .

§. 7.

BENCHÈ la cagione di questa malattia sia la medesima nella maggior parte de' soggetti , esige nondimeno una diversa cura , ed ecco come d' ordinario io mi regolo , a riserva di alcune piccole variazioni . 1. Quando l' ammalato è pleorico , e di temperamento magro , gli fo cavare da 10. in 12. oncie di sangue dal braccio . 2. Avendo per l' ordinario questi tali soggetti molta bile esaltata ed infiammabile , do loro per otto , dieci , o quattordici giorni , la mattina a digiuno , o la sera quando.

quando vanno a letto, una presa di spirito glaciale, Par. I. Cap. I. n. 2., nel Tè di melissa, o in altra tale infusione amara. In vece dello spirito glaciale può darfi all' ammalato mattina e sera intorno a 25. grani di sale ammoniaco con un' eguale quantità di nitro nel detto Tè. 3. Usato che ha l' infermo questo rimedio del tempo prescritto, gli do per tre o quattro giorni consecutivi, ogni mattina a digiuno, una presa di spirito glaciale, o un' oncia di sale di Sedlitz, con 20. grani di rabbarbaro in polvere, nell' acqua tiepida. 4. Purgatolo in tal guisa, principio a dargli le mie pillole Elvetiche aperitive e corroboranti, Cap. I. n. 1., la mattina a digiuno, il dopopranzo verso le quattr' ore, e la sera verso le sette, facendogli ber dietro ogni volta alcune chicchere di Tè di centaurea o di germandrea. Può in vece di dette pillole valersi del seguente eletruario: si prendono di conserva d' arancio e di cedro, di ciascuna 3. oncie, un quarto d' oncia di cannella infranta, un' oncia è mezza di zafferano, o croco di Marte, da due oncie in tre e mezza di siroppo di arancio, si mescola ogni cosa insieme, e se ne prende la mattina a digiuno, e la sera quando è grossa una noce, bevendovi sopra alcune chicchere di Tè amaro. Se questo rimedio facesse diventare stitico l' ammalato, conviene che lo lasci per alcuni giorni, e intanto prenderà la mattina a digiuno una presa di sale purgativo, o la sera nel coricarsi cinque pillole di Becker, del peso di due grani ciascuna, e la mattina nello alzarsi, da 8. in 10. altre nel brodo leggero. 5. Mentre l' in-

l'infermo praticherà questi rimedj, cavalcherà sovente, e procurerà di evitare tutto ciò, che può debolirgli i nervi, si asterrà da ogni cibo grasso, oleoso, e difficile a digerirsi, e si varrà per bere di acque minerali acidette, nelle quali metterà ne' suoi pasti la metà di vino.

6. 8.

Ecco la cura, che adopero per le persone replete e cariche di pituita. 1. Se l'ammalato ha nausea e vomiti frequenti, gli do ogni mattina a digiuno una presa di spirito glaciale, Par. I. Cap. I. n. 5., oppure da 28. in 30. grani di polvere d'ipecacuana, e 10. grani di sale d'asenzio nel brodo leggero, e la sera una presa di spirito glaciale, o 25. grani di sale ammoniaco nell'acqua, o nel Tè, per istemperare ed attenuare i mucchi contenuti nello stomaco. Se poi per certi suoi incomodi non potesse far uso dell'emetico, gli do per più giorni consecutivi, ogni mattina a digiuno, una presa della mia polvere purgativa, Par. I. Cap. I. n. 6., nel brodo o nel Tè, ovvero un'oncia di sale di Sedlitz, e 20. grani di rabbarbaro. 2. Dopo gli Emetici e i purganti, gli fo bere ogni mattina a digiuno le acque minerali acidette, come sono quelle di Spà, di Scwalbach, o di S. Maurizio ne' Grigioni, in dose di una pinta, nello spazio di tre o quattr'ore, per non caricargli lo stomaco troppo in una volta. Mentre egli fa uso di queste acque, non deve mangiar nulla prima del mezzogiorno, e quando nol possa fare, egli prenderà un'ora dopo bevuto l'ultimo bicchiere un leggier brodo con una fetta di pane den-

dentro , e il dopo pranzo verso le quattr' ore una presa delle mie pillole Elveriche , Cap. I. n. 1. , e vi beverà dietro alcune chicchere di centaurea , o un cucchiarinno dell' elettuario del §. 7. Se poi non fosse in situazione da procurarsi delle acque minerali , egli si atterrà mattina e sera alle mie pillole , ed al Tè di centaurea , usandone quanto più spesso e più lungamente gli sarà possibile . 3. Finchè adoprerà questi rimedj , ed anche per qualche tempo dopo , egli osserverà la regola prescritta nel §. 7. Per prevenire le ricadute , le quali sono molto ordinarie , quando è inveterata la malattia , e si contravviene alla regola indicata , bisogna ritornare all' uso dei rimedj ogni primavera per alcuni anni .

§. 9.

Dissi di sopra , che non tutti i rimedj producono uno stesso effetto in tutti i soggetti , e per conseguenza sta al Medico lo scieglier quelli , che convengonfi alla malattia , che prende a curare . Indicherò in poche parole quelli , che sono i più adattati ad estirpare il male . Sono degli ammalati , che provano del giovamento nell' uso delle acque sulfuree , di quella per esempio di Gurnigel , massime quando tiene loro il ventre libero . Altri si servono utilmente delle seguenti pillole. Si prende un quarto d' oncia di mirra , altrettanto di galbano , altrettanto d' assa fetida , grani 60. di castorio , e tanto di balsamo del Perù , quanto basta per formare co' detti ingredienti una massa di pillole del peso di 3. grani ciascuna , delle quali l' ammalato prenderà sei o dieci la sera nel coricarsi ,
been

beendovi dietro quattro o cinque cucchiari d' acqua di brionia distillata col vino. Accade talvolta, che queste pillole cagionano una diarrea , la quale riesce molto pericolosa, perchè indebolisce li nervi dello stomaco , e degl' intestini . Ciò succedendo , conviene sostituir loro le seguenti altre pillole . Prendasi un quarto d' oncia di castorio , da 60. in 70. grani di sal volatile di succino , e tanto di estratto di ruta , quanto bisogna per formare una massa di pillole del peso di 3. grani ciascuna : di queste l' ammalato ne piglierà 5. o 6. nell' andar a letto . Quando il male ha la sua sede nello stomaco , e proviene dalla debolezza delle fibre di esso , basta spesso a guerirlo il prendere ogni giorno prima di cibarsi un paio di cucchiarini dell' Elixir viscerale di Hoffman , secondandone l' effetto con l' esercizio del cavalcare , o della vettura ,

§. 10.

R Ichiedendo per l' ordinario questa malattia rimedj aperitivi e corroboranti , e non essendovene de' migliori del ferro, e delle sue differenti preparazioni , conviene quì dirne alcuna cosa . Quando lo stomaco è ripieno d' impurità acrimoniose o acide , conviene prima di prendere il ferro in sostanza , cavarle via , oppure (e questo vale anche più) mescolarlo con qualche estratto amaro , e con un purgante dolce , affinchè non si fermi troppo nello stomaco . Tale si è la proprietà delle mie pillole Elvetiche aperitive e corroboranti , Cap. I. n. 1. Il ferro calibe , o in sostanza riscalda sovente troppo , e quando ciò succede , deve
l' in-

l' infermo interromperne l' uso , per quattro o cinque giorni , e prendere ogni mattina a digiuno una presa di sal glaciale , o di Sedlitz . Produce talora nelle persone di temperamento gracile dei granchj , e delle inquietudini , ma potendo queste nondimeno farne di meno , deono in tal caso prendere per qualche tempo , la sera prima di andar a letto , 15. o 16. goccioline di laudano liquido di Sidenham , oppure una presa delle mie goccioline anodine , Par. I. Cap. I. n. 7. nel Tè di camomilla . Se l' uso del calibe , e degli altri corroboranti rendesse stitico l' ammalato , e la stitichezza durasse più di due giorni , converrebbe dargli del sale di Sedlitz , o del sale glaciale , ovvero un serviziale composto d' acqua tiepida , olio , miele , e sale , per estrarre i venti , e le impurità contenute negl' intestini , che spesso ragionano alle persone deboli ansietà , vertigini , deliquii , e palpitazioni violente di cuore .

§. II.

A Vvien talora che le malattie ippocondriache complicate sono di spasimi , e ritornano in tempi determinati regolarmente , e nel minuto stesso in cui principiarono , come ho io stesso veduto più volte . In questi casi non ho trovato nulla di più efficace della scorza di china mescolata con limatura di ferro , ed incorporata nella conserva amara , o della mia polvere contro le febbri fredde , Par. I. Cap. I. n. 13. Ed ecco come si prepara l' elettuario . Si prendono due oncie di scorza di china ben netta , e bene scelta in polvere , un' oncia di limatura di ferro preparata , due oncie

cie di conserva d'arancio, ed un' oncia di fi-
 roppo di granato, si mescola insieme ogni cosa,
 e se ne dà ogni mattina a digiuno, e verso le ore
 quattro della sera, grosso quanto una noce, e
 poi vi si fanno bere sopra due chicchere di Tè
 di centaurea. A questo unirà l' infermo mat-
 tina e sera una presa della mia polvere, e vi
 bevèrà dietro alcuni cucchiari di vino di Spa-
 gna, o d' infusione amara.



Fine del Tomo primo.



